

DYNA CLOXACILLIN DS 125

Cloxacillin Sodium (125mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dyna Cloxacillin DS
2. Bagaimana Dyna Cloxacillin DS
3. Sebelum menggunakan Dyna Cloxacillin DS
4. Cara menggunakan Dyna Cloxacillin DS
5. Semasa menggunakan Dyna Cloxacillin DS
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dyna Cloxacillin DS
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Dyna Cloxacillin DS

Digunakan untuk rawatan pelbagai jangkitan-jangkitan seperti:

1. Kulit dan tisu lembut, tulang dan sendi.
2. Saluran pernafasan dan saluran kencing.
3. Jangkitan tengah telinga.
4. Keradangan pada lapisan dinding ruangan jantung.
5. Keracunan darah.
6. Keradangan pada membran (meninges) sekeliling otak dan saraf tunjang.
7. Semasa pembedahan major.

Bagaimana Dyna Cloxacillin DS berfungsi

Ia berfungsi dengan menghentikan pertumbuhan bakteria.

Sebelum menggunakan Dyna Cloxacillin DS

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Dyna Cloxacillin DS jika anda;

1. Hipersensitif kepada cloxacillin atau dengan sejarah alergi kepada kumpulan ubat penicillin.
2. Hipersensitif kepada lain-lain penicillin atau cephalosporin atau penicillamine yang mungkin hipersensitif kepada cloxacillin.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil apa-apa ubat.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan mengambil Dyna Cloxacillin DS jika anda mengandung, merancang untuk hamil atau fikir anda mungkin mengandung.

Jangan mengambil Dyna Cloxacillin DS jika anda sedang menyusukan bayi.

Penggunaan Cloxacillin oleh ibu menyusukan mungkin boleh menyebabkan rangsangan tindak balas, cirit-birit, jangkitan kulat, dan ruam kulit kepada bayi.

- Sebelum mula menggunakan Dyna Cloxacillin DS

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai masalah buah pinggang yang terjejas atau kegagalan jantung.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda sedang menggunakan aminoglycosides, tetracyclines dan lain-lain antimikrobia agen termasuk erythromycin dan polymyxin B sulphate dan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Dyna Cloxacillin DS

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: 250-500 mg setiap 6 jam setiap hari.

Bayi & kanak-kanak berat badan sehingga 20 kg: Oral, 6.25-12.5 mg (asas) per kg berat badan setiap 6 jam.

Kanak-kanak 20 kg berat badan & lebih: Dos dewasa biasa.

Goncang untuk melembutkan serbuk. Tambah air mendidih sekurang-kurangnya setengah isipadu akhir (30 ml hingga 50 ml) dan sejukkan air dan goncang dengan perlahan-lahan. Tambah air hingga isipadu akhir (60 ml hingga 100 ml) dicapai dan goncang dengan sempurna. Simpan dalam peti ais (2-8°C) selepas pembancuhan.

Untuk digunakan dalam masa 7 hari selepas pembancuhan

*Cloxacillin tidak boleh digunakan secara oral untuk permulaan rawatan untuk jangkitan teruk yang boleh mengancam nyawa, tetapi boleh digunakan sebagai terapi susulan selepas terapi parenteral penicillinase-resistant penicillin.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda. Ambil ubat dengan perut kosong.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan Dyna Cloxacillin DS untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda. Pesakit perlu meneruskan ubat untuk rawatan penuh.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Risiko keracunan saraf boleh berlaku jika dos yang besar diberikan. Sistem buah pinggang dan darah perlu dipantau semasa penggunaan yang lama dan terapi dos yang tinggi.

Semasa menggunakan Dyna Cloxacillin DS

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor. Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Dyna Cloxacillin DS.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor dan ahli farmasi anda.

Jangan beri Dyna Cloxacillin DS kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ia harus digunakan dengan berhati-hati pada individu dengan sejarah alergi terutama kepada ubat-ubat lain. Perhatian juga perlu jika dos yang besar seperti Potassium atau Sodium salts diberi kepada individu dengan fungsi buah pinggang yang terjejas atau kegagalan jantung. Sentuhan dengan penicillin perlu

DYNA CLOXACILLIN DS 125

Cloxacillin Sodium (125mg/5ml)

dielakkan kerana rangsangan tindak balas mungkin berlaku.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Dyna Cloxacillin DS boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan-kesan sampingan Dyna Cloxacillin DS termasuklah:

- Reaksi gastrousus seperti cirit-birit, loya atau muntah-muntah.
- Jangkitan mulut: Sakit mulut atau lidah.
- Keradangan usus besar.
- Reaksi alergi: Ruam-ruam kulit; tindak balas alergi yang teruk beserta pengsan & kadang-kadang kematian berlaku dalam beberapa minit; pengumpulan cecair di bawah kulit atau penyempitan bronchi; ruam kulit kemerah-merahan dan kegatalan, demam, sakit sendi dan sel darah putih tertentu yang lebih tinggi daripada paras normal.
- Keradangan buah pinggang: Demam, ruam, kemungkinan pengeluaran air kencing yang kurang, kehadiran protein yang lebih tinggi daripada paras normal dalam air kencing, kehadiran darah dalam air kencing.
- Gejala darah: Kekurangan jumlah sel darah putih
- Sakit tekak & demam.
- Penggunaan Cloxacillin oleh ibu yang menyusukan mungkin membawa kepada rangsangan tindak balas, cirit-birit, jangkitan kulat dan ruam kulit pada bayi.

Dyna Cloxacillin DS boleh menyebabkan alahan teruk dan reaksi kulit yang serius.

Berhenti menggunakan Dyna Cloxacillin DS dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang gejala berikut:

- kulit merah, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my (Consumers → Reporting → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Dyna Cloxacillin DS

- Penyimpanan

Jauhi ubat daripada kanak-kanak
Pastikan bekas ditutup rapat
Jangan simpan melebihi 30°C
Lindungi daripada cahaya.

- Penyimpanan (selepas pembancuhan)

Simpan dalam peti ais (2-8°C) selepas pembancuhan.
Untuk digunakan dalam masa 7 hari selepas pembancuhan

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Serbuk berwarna putih (ampaian oren apabila ditambah air) dengan perisa strawberi.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Cloxacillin Sodium

- Bahan-bahan tidak aktif
Sugar, Rhodigel (Xanthan Gum), Aerosil 200, Sodium Benzoate, Propyl Paraben, Methyl Paraben, Sodium Saccharin, Strawberry Flavour, Sunset Yellow, Sodium Chloride, Simethicone

- Nombor MAL

MAL19962517AZ

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

Dynapharm (M) Sdn. Bhd.
2497, Mk 1, Lorong Perusahaan Baru 5,
Kawasan Perusahaan Perai 3, 13600
Perai, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

19/07/2024

Nombor Siri:

NPRA(R2/1)240718/1306