

DYNIDAZOL TABLET

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Metronidazole (200mg, 400mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan DYNIDAZOL TABLET
2. Bagaimana DYNIDAZOL TABLET berfungsi
3. Sebelum menggunakan DYNIDAZOL TABLET
4. Cara menggunakan DYNIDAZOL TABLET
5. Semasa menggunakan DYNIDAZOL TABLET
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan DYNIDAZOL TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan DYNIDAZOL TABLET

Metronidazole digunakan dalam rawatan dan pencegahan jangkitan bakteria tertentu.

Bagaimana DYNIDAZOL TABLET berfungsi

Ubat ini berfungsi dengan membunuh atau menghentikan pertumbuhan protozoa dan bakteria. Ia juga mempunyai kesan *radiosensitising* pada sel-sel tumor yang menerima kandungan oxygen yang kurang

Sebelum menggunakan DYNIDAZOL TABLET

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil DYNIDAZOL TABLET jika anda mempunyai hipersensitiviti kepada Metronidazole.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil DYNIDAZOL TABLET jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil DYNIDAZOL TABLET jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum mula menggunakan DYNIDAZOL TABLET

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami:

- Ketidakstabilan komposisi darah
- Penyakit aktif pada sistem saraf berpusat
- Fungsi hati yang terjejas teruk

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda berada di bawah:

- Penggunaan alkohol
- Rawatan jenis antikoagulan oral Warfarin
- Rawatan Litium (untuk masalah kemurungan)
- Rawatan Phenobarbitone (untuk mengawal sawan)
- Rawatan Phenytoin (untuk mengawal sawan)
- Rawatan Cimetidine (melegakan pedih ulu hati)

Beritahu doktor anda jika anda terjejas oleh sindrom Cockayne.

Kes-kes keracunan hati yang teruk atau kegagalan hati akut pada pesakit dengan sindrom Cockayne telah dilaporkan dengan produk yang mengandungi Metronidazole.

Berhenti mengambil Dynidazol Tablet dan beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami: sakit perut, kurang selera makan, loya, muntah, demam, keletihan yang luar biasa, kulit kekuningan & putih mata, air kencing berwarna gelap, najis berwarna cerah atau seperti tanah liat, atau gatal-gatal.

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan DYNIDAZOL TABLET

- Berapa banyak harus digunakan
Semua yang perlu diambil semasa atau selepas makan.

Untuk merawat jangkitan bakteria:

Dewasa: 400 hingga 800 mg tiga kali sehari melalui mulut selama 5 hingga 10 hari.

Kanak-kanak:

1 hingga 3 tahun: Boleh diberi satu perempat,
3 hingga 7 tahun: Satu pertiga,
7 hingga 10 tahun: Satu setengah dos dewasa; Sebaliknya 35 hingga 50 mg per kg berat badan setiap hari dalam dos dibahagikan telah dicadangkan.

Doktor anda akan membuat keputusan berapa banyak anak anda perlu bergantung kepada berat badan mereka.

Untuk mencegah jangkitan berlaku selepas pembedahan:

Dewasa: 400 mg setiap 8 jam selama 3 hingga 4 hari, diikuti selepas pembedahan melalui intravena atau rektum, sehingga boleh melalui terapi oral.

Kanak-kanak: Doktor anda akan membuat keputusan berapa banyak anak anda perlu bergantung kepada berat badan mereka.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan DYNIDAZOL TABLET untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan pening, sakit kepala dan gangguan gastrousus seperti loya, muntah-muntah, cirit-birit, sakit perut atau kekejangan.

DYNIDAZOL TABLET

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Metronidazole (200mg, 400mg)

Semasa menggunakan DYNIDAZOL TABLET

- Perkara yang perlu dilakukan Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan DYNIDAZOL TABLET.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi DYNIDAZOL TABLET dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda tidak sihat, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, DYNIDAZOL TABLET boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan-kesan sampingan berikut telah dilaporkan:

Rasa yang tidak menyenangkan di dalam mulut, lidah tidak selesa, loya, muntah – muntah, gangguan gastrousus, ruam dan bengkak, mengantuk, pening, sakit kepala, hilang kawalan untuk bergerak, ruam kulit, gatal-gatal, air kencing menjadi gelap (disebabkan oleh metabolisme Metronidazole). Semasa intensif dan / atau terapi Metronidazole berpanjangan, beberapa contoh kerosakan saraf atau sawan telah dilaporkan dan penurunan bilangan sel darah putih yang sederhana.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web npra.moh.gov.my (*Public* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan DYNIDAZOL TABLET

- Penyimpanan

Jauhi dari kanak-kanak.
Simpan di tempat yang kering di bawah 30 °C.
Lindungi daripada cahaya

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

DYNIDAZOL TABLET 200MG
Tablet tidak bersalut berwarna putih, bulat dan dwi-cembung

DYNIDAZOL TABLET 400MG
Tablet tidak bersalut berwarna putih, bulat, rata dan *scored*.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif Metronidazole

- Bahan tidak aktif

Corn Starch, Lactose Powder 200 Mesh, Sodium Starch Glycolate, Microcrystalline Cellulose, PVP K90, Magnesium Stearate, Aerosil 200, Croscarmellose Sodium, Chloroform Spirit.

- Nombor MAL

DYNIDAZOL TABLET 200MG
MAL19987009AZ

DYNIDAZOL TABLET 400MG
MAL19973017AZ

Pengilang & Pemegang

Pendaftaran

Dynapharm (M) Sdn. Bhd.
2497, Mk 1, Lorong Perusahaan Baru 5, Kawasan Perusahaan Perai 3, 13600 Perai, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

26/10/2018

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)261018/00311