

DYNA RINGWORM LOTION

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Salicylic Acid / Benzoic Acid (5% w/v / 6% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dyna Ringworm Lotion
2. Bagaimana Dyna Ringworm Lotion berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dyna Ringworm Lotion
4. Cara menggunakan Dyna Ringworm Lotion
5. Semasa menggunakan Dyna Ringworm Lotion
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dyna Ringworm Lotion
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Dyna Ringworm Lotion

Digunakan untuk rawatan jangkitan kurap.

Bagaimana Dyna Ringworm Lotion berfungsi

Salicylic acid menggalakkan pengelupasan kulit. Ia memberi tindakan anti-kulat disebabkan oleh pembuangan lapisan luar kulit yang menyekat pertumbuhan kulat pada kulit. Ia juga membantu penembusan agen anti-kulat yang lain. Benzoic acid mempunyai kesan anti-bakteria dan anti-kulat. Ia digunakan dalam rawatan jangkitan kulat pada kulit.

Sebelum menggunakan Dyna Ringworm Lotion

- Bila tidak boleh menggunakan
Mengandung dan menyusukan anak
Tiada kesan berbahaya dilaporkan.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum menggunakan Dyna Ringworm Lotion.

- Sebelum mula menggunakan Dyna Ringworm Lotion
- Beritahu doktor jika anda mempunyai masalah hipersensitiviti pada kandungan ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain
Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Dyna Ringworm Lotion

- Berapa banyak harus digunakan
Larutan mestilah disapu dengan sedikit kepada kawasan yang dijangkiti 2 hingga 3 kali sehari.

Arahan yang diberikan mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan
Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan
Teruskan penggunaan Dyna Ringworm Lotion untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan
Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)
Simptom-simptom keracunan salicylate telah dilaporkan selepas penggunaan salicylate acid ke kawasan yang besar pada badan.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Dyna Ringworm Lotion

- Perkara yang perlu dilakukan
Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Dyna Ringworm Lotion.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan beri Dyna Ringworm Lotion kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Penyediaan ubat tidak disyorkan untuk penggunaan jangka panjang untuk rawatan ke kawasan badan yang luas, luka yang besar, pada bahagian yang pecah atau inflamasi pada kawasan badan.

Kesan-kesan sampingan

Salicylic acid menyebabkan iritasi ringan dan penggunaan penyediaan Salicylic acid pada kulit boleh menyebabkan keradangan.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web npra.gov.my (Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Dyna Ringworm Lotion

- Penyimpanan
Jauhi ubat daripada kanak-kanak
Elakkan dari terkena mata
Simpan di tempat kering di bawah 30°C
Pastikan bekas ditutup rapat
Lindungi daripada cahaya
Untuk kegunaan luar sahaja

- Pelupusan
Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Losyen berwarna merah dengan wangian semulajadi.

DYNA RINGWORM LOTION

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Salicylic Acid / Benzoic Acid (5% w/v / 6% w/v)

- *Bahan-bahan kandungan*

- Bahan aktif

Salicylic Acid, Benzoic Acid

- Bahan-bahan tidak aktif

Carmoisine, Menthol, Glycerin,

Camphor & Denatured Alcohol

- *Nombor MAL*

MAL19910650X

Pengilang & Pemegang Pendaftaran

Produk

Dynapharm (M) Sdn. Bhd.

2497, Mk 1, Lorong Perusahaan Baru 5,

Kawasan Perusahaan Perai 3, 13600

Perai, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

25/10/2018

Nombor siri:

NPRA(R4/1)241018/00297