

VITBION FORTE TABLET

Thiamine HCl / Pyridoxine HCl / Cyanocobalamin (100 mg / 200 mg / 200 mcg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan VITBION FORTE TABLET
2. Bagaimana VITBION FORTE TABLET berfungsi
3. Sebelum menggunakan VITBION FORTE TABLET
4. Cara menggunakan VITBION FORTE TABLET
5. Semasa menggunakan VITBION FORTE TABLET
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan VITBION FORTE TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan VITBION FORTE TABLET

Digunakan sebagai suplemen dalam rawatan keradangan melibatkan saraf, iritasi atau kerosakan saraf, penyakit kencing manis dan ubat-ubatan menyebabkan kerosakan saraf.

Bagaimana VITBION FORTE TABLET berfungsi

- Thiamine adalah penting berkaitan dengan metabolisme karbohidrat.
- Pyridoxine adalah koenzim untuk pelbagai fungsi metabolik yang mengakibatkan penggunaan protein, karbohidrat dan lemak.
- Cyanocobalamin digunakan dalam rawatan anemia, dan komplikasi saraf dan juga berkaitan dengan kekurangan nutrisi.

Sebelum menggunakan VITBION FORTE TABLET

- Bila tidak boleh menggunakan

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil VITBION FORTE TABLET.

- Sebelum mula menggunakan VITBION FORTE TABLET

Beritahu doktor jika anda mempunyai masalah hipersensitiviti kepada bahan kandungan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan VITBION FORTE TABLET

- Berapa banyak harus digunakan

Untuk kegunaan terapeutic: 1 tablet 3 kali sehari.

Arahan yang diberikan mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan VITBION FORTE TABLET untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Dos berlebihan jarang sekali berlaku. Vitamin B berlebihan akan disingkirkan di dalam air kencing.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan VITBION FORTE TABLET

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan VITBION FORTE TABLET.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan beri VITBION FORTE TABLET kepada sesiapa, walaupun mereka

mempunyai simptom-simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

Kesan-kesan sampingan

Kumpulan Vitamin B adalah vitamin larut air dan tidak menyebabkan apa-apa kesan sampingan apabila diambil mengikut dos yang disyorkan.

Amaran:

Produk ini mengandungi Vitamin B6.

Hentikan pengambilan produk ini jika anda mengalami rasa semut-semut, rasa terbakar atau kebas, dan dapatkan nasihat doktor dengan segera.

Reaksi hipersensitiviti kepada Vitamin B1, seperti berpeluh, takikardia (degupan jantung yang cepat), dan tindak balas kulit dengan gatal-gatal dan urtikaria sangat jarang berlaku.

Chromaturia ("air kencing kemerahan", muncul dalam 8 jam pertama selepas penggunaan dan biasanya hilang dalam masa 48 jam) mungkin berlaku.

Aduan gastrousus, seperti loya, muntah, cirit-birit atau sakit perut mungkin berlaku.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan VITBION FORTE TABLET

- Penyimpanan

Jauhkan ubat daripada kanak-kanak Lindungi daripada cahaya Jangan simpan melebihi 30°C

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

VITBION FORTE TABLET

Thiamine HCl / Pyridoxine HCl / Cyanocobalamin (100 mg / 200 mg / 200 mcg)

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet berwarna oren berbentuk bulat,
dwi cembung dan bersalut lapisan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Thiamine HCl, Pyridoxine HCl,
Cyanocobalamin

- Bahan-bahan tidak aktif

Colorcon Orange, Magnesium Stearate,
Corn Starch, Lactose Powder 200 Mesh,
PVP K90 & Aerosil 200.

Nombor MAL

MAL19920011XZ

Pengilang & Pemegang Pendaftaran

Produk

Dynapharm (M) Sdn. Bhd.
2497, Mk. 1, Lorong Perusahaan Baru 5,
Kawasan Perusahaan Perai 3,
13600 Perai, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

02/07/2026

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)170518/00156