

PARADEINE TABLET

Paracetamol / Codeine Phosphate (500mg / 8mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Paradeine Tablet
2. Bagaimana Paradeine Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Paradeine Tablet
4. Cara menggunakan Paradeine Tablet
5. Semasa menggunakan Paradeine Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Paradeine Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Paradeine Tablet

Untuk melegakan kesakitan ringan hingga sederhana teruk.

Bagaimana Paradeine Tablet berfungsi

Paracetamol dan codeine fosfat adalah ubat penghilang rasa sakit yang bertindak bersama dalam cara berlainan untuk melegakan kesakitan.

Sebelum menggunakan Paradeine Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan
- Hipersensitiviti kepada Paracetamol atau Codeine.
- Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun untuk rawatan simptomatik terhadap selsema kerana peningkatan risiko menghadapi reaksi buruk yang serius dan mengancam nyawa.
- Semua pesakit kanak-kanak (0-18 tahun) yang menjalani tonsillectomy dan / atau adenoidectomy untuk sindrom tidur apnea yang obstruktif disebabkan oleh peningkatan risiko menghadapi reaksi buruk yang serius dan mengancam nyawa.
- Wanita yang sedang menyusui.
- Individu yang diketahui mempunyai metabolik ultra-cepat CYP2D6.

Penyediaan ini mengandungi Paracetamol.

Jangan mengambil ubat yang mengandungi Paracetamol lain pada masa yang sama.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil Paradeine Tablet jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil Paradeine Tablet jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum mula menggunakan Paradeine Tablet

Beritahu doktor anda jika:

- Anda adalah seorang dengan buah pinggang atau fungsi hati terjejas.
- Anda mengambil ubat-ubatan lain yang memberi kesan kepada hati.
- Anda mempunyai tiroid yang kurang aktif, penyakit Addison's dan pembesaran kelenjar prostat atau penyempitan urethra.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Paradeine Tablet

Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: 1-2 tablet 3-4 kali sehari.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan Codeine Phosphate yang terlalu banyak boleh menyebabkan tekanan pernafasan, koma, anak mata mengecil, kebiruan tangan atau kaki,

nadi lemah, tekanan darah rendah, kekejangan saluran gastro-usus dan saluran biliari. Kematian akibat kegagalan pernafasan boleh berlaku.

Pengambilan Paracetamol terlalu banyak boleh menyebabkan muntah-muntah, hilang selera makan, loya, sakit epigastrik. Kerosakan hati, kulit kekuningan boleh terjadi tidak lama kemudian.

Semasa menggunakan Paradeine Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Paradeine Tablet.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil ubat-ubatan lain yang mengandungi Paracetamol pada masa yang sama.

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Paradeine Tablet dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Tidak disyorkan untuk kanak-kanak di bawah 12 tahun.

Amaran alergi: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini mungkin tanda-tanda keadaan yang serius. Sekiranya tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Jangan mengambil melebihi dos yang disyorkan atau dengan nasihat doktor. Codeine boleh menyebabkan mengantuk dan menyebabkan ketagihan.

PARADEINE TABLET

Paracetamol / Codeine Phosphate (500mg / 8mg)

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Paradeine Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan sampingan yang biasa adalah pening, loya dan muntah-muntah, ketidakselesaan gastrousus, tindakan melulu, lali, sesak nafas, reaksi alergi, keghairahan, sembelit, kegatalan dan tekanan pernafasan.

Reaksi hipersensitiviti kulit termasuk ruam kulit, bengkak di bawah kulit, Steven Johnsons Syndrome / Toksik Epidermal Necrolysis telah dilaporkan.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npra.moh.gov.my (*Consumers → Reporting → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Paradeine Tablet

- Penyimpanan

Jauhi ubat daripada kanak-kanak
Simpan di tempat yang kering di bawah 30°C
Lindungi daripada cahaya

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet tidak bersalut berwarna putih, rata, bulat, bergaris dan bertanda "P".

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Paracetamol & Codeine Phosphate

- Bahan tidak aktif
Corn Starch, Lactose Powder 200 Mesh, PVP K90, Magnesium Stearate

- Nombor MAL

MAL19913256AZ

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

Dynapharm (M) Sdn. Bhd.
2497, Mk. 1 , Lorong Perusahaan Baru 5,
Kawasan Perusahaan Perai 3, 13600
Perai , Pulau Pinang , Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

28/02/2019

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)280219/00060