

DYNAMIZOLE CREAM 2% W/W

Miconazole Nitrate 20mg/g

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dynamizole Cream 2% w/w
2. Bagaimana Dynamizole Cream 2% w/w berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dynamizole Cream 2% w/w
4. Cara menggunakan Dynamizole Cream 2% w/w
5. Semasa menggunakan Dynamizole Cream 2% w/w
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dynamizole Cream 2% w/w
8. Maklumat Produk
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Dynamizole Cream 2% w/w

Dynamizole Cream 2% w/w digunakan untuk merawat jangkitan kulat pada kulit, termasuk jangkitan yis.

Dynamizole Cream 2% w/w digunakan untuk:

- Jangkitan pada kulit kepala, janggut, badan, kaki dan tangan serta bahagian pangkal paha;
- Ruam lampin pada bayi

Bagaimana Dynamizole Cream 2% w/w berfungsi

Miconazole Nitrate - bahan antikulat yang bertindak dengan memusnahkan kulat yang menyebabkan jangkitan dan juga sesetengah bakteria yang mungkin ada pada kawasan tersebut.

Sebelum menggunakan Dynamizole Cream 2% w/w

- Bila tidak boleh menggunakannya

Jangan gunakan Dynamizole Cream 2% w/w jika anda tahu anda hipersensitif kepadanya atau kepada ubat antikulat yang lain.

Mengandung dan menyusukan anak Mengandung

Dynamizole Cream 2% w/w diserap secara minimum ke dalam kulit/kuku. Jika anda mengandung atau merancang untuk mengandung, bertanya dengan doktor anda jika perlu menggunakan Dynamizole Cream 2% w/w.

Menyusukan anak

Bahan aktif ini tidak diketahui sama ada boleh dirembeskan ke dalam susu manusia. Jika anda sedang menyusukan

anak, bertanya dengan doktor anda jika anda patut menggunakan Dynamizole Cream 2% w/w.

- Sebelum menggunakan Dynamizole Cream 2% w/w

Antikoagulan oral (ubat pencair darah): Sebelum menggunakan ubat ini, beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat pencair darah oral, seperti warfarin.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Lain-lain ubat: Kesan dan kesan sampingan sesetengah ubat preskripsi, apabila diambil bersama Miconazole, boleh meningkat. Bertanya dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum anda menggunakannya jika anda sedang mengambil mana-mana ubat lain.

Cara menggunakan Dynamizole Cream 2% w/w

Untuk rawatan yang berkesan, sapukan Dynamizole Cream 2% w/w setiap hari.

- Sapukan Dynamizole Cream 2% w/w pada kulit dua kali sehari.
- Untuk membuka tiub, putar penutupnya. Cucuk penutup tiub dengan menggunakan pin pada bahagian atas penutup.

Bersihkan kulit yang dijangkiti dan lapkan sehingga kering. Sapu Dynamizole Cream 2% w/w pada bahagian kulit dan gosokkannya dengan perlahan menggunakan hujung jari anda. Jangan hanya sapu pada bahagian yang dijangkiti. Anda juga perlu menyapu krim tersebut pada kawasan sekitarnya.

Bersihkan tangan anda dengan sempurna selepas menyapu krim. Langkah ini adalah amat penting untuk mengelakkan anda daripada menyebarkan kuman pada bahagian yang dijangkiti ke bahagian tubuh yang lain atau kepada orang lain.

- Berapa banyak harus digunakan

Jika anda menggunakan Dynamizole Cream 2% w/w: Gunakan dua kali sehari

- Bila perlu digunakan

Sentiasa gunakan ubat ini dengan teliti mengikut arahan doktor anda.

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

- Berapa lama perlu menggunakannya

Jangan hentikan penggunaan ubat sehingga sekurang-kurangnya seminggu selepas semua simptom hilang. Bergantung kepada jenis dan keterukan jangkitan, rawatan mungkin berterusan selama 2 hingga 6 minggu.

Patuhi nasihat doktor anda mengenai tempoh rawatan. Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

- Jika terlupa menggunakannya

- Abaikan dos yang tertinggal.
- Sapu dos yang berikutnya seperti biasa dan teruskan penggunaan ubat mengikut arahan doktor anda
- Jangan gunakan dos berganda ubat untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Apabila Dynamizole Cream 2% w/w disapu dengan lebih kerap daripada diarahkan, ia boleh menyebabkan kemerahan, kebengkakan atau rasa pedih pada kulit. Jika ini berlaku, anda hanya perlu melankau satu atau dua aplikasi dan mulakan semula mengikut aturan biasa.

Menelan Dynamizole Cream 2% w/w secara tidak sengaja dalam kuantiti yang kecil lazimnya tidak memudaratkan.

Jika ini terjadi, dapatkan rawatan perubatan dengan segera. Hubungi doktor anda untuk memastikan tiada masalah yang timbul.

Semasa menggunakan Dynamizole Cream 2% w/w

- Pekara yang perlu dilakukan

Bersihkan tangan dengan sempurna selepas menggunakan Dynamizole Cream 2% w/w melainkan jika bahagian yang dirawat ialah tangan anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan sapukan Dynamizole Cream 2% w/w pada mata.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Dynamizole Cream 2% w/w boleh menyebabkan tindakbalas alahan yang teruk. Anda hendaklah sedar akan tanda-tanda tindakbalas alahan semasa anda sedang menggunakan

DYNAMIZOLE CREAM 2% W/W

Miconazole Nitrate 20mg/g

Dynamizole Cream 2% w/w. Lihat “Kesan sampingan”.

Memandu dan menggunakan jentera

Dynamizole Cream 2% w/w tidak berkemungkinan mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan apa-apa alatan atau mesin.

Kesan-kesan sampingan.

Seperti ubat-ubatan lain, Dynamizole Cream 2% w/w boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Dynamizole Cream 2% w/w lazimnya dapat diterima dengan baik.

- Sansasi membakar pada kulit
- Keradangan kulit
- Masalah di mana Dynamizole Cream 2% w/w telah digunakan pada kulit
- Perasaan membakar di bahagian Dynamizole Cream 2% w/w disapu pada kulit
- Perasaan hangat di bahagian Dynamizole Cream 2% w/w disapu pada kulit
- Kemerahan kulit
- Gatal-gatal
- Ruam kulit alergi disebabkan oleh sentuhan dengan sesuatu di kulit
- Ruam
- Hives

Jangan teragak-agak untuk melaporkan kesan sampingan yang lain kepada doktor dan ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Dynamizole Cream 2% w/w

- Penyimpanan

Jauhi ubat daripada kanak-kanak

Lindungi daripada cahaya

Jangan simpan melebihi suhu 30°C

Pastikan bekas tertutup ketat

UNTUK KEGUNAAN LUAR SAHAJA

Ubat ini hanya boleh disimpan untuk tempoh yang terhad. Jangan gunakan Dynamizole Cream 2% w/w selepas tarikh (bulan dan tahun) yang dicetak

selepas “EXP”, walaupun ia telah disimpan dengan baik.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air Bungan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat produk

- Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih serta berbau semulajadi, yang diisi dalam tiub aluminium 15g.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Miconazole Nitrate

Bahan tidak aktif

Chlorocresol, White Soft Paraffin/ White Petroleum Jelly, Liquid Paraffin/ White Oil, Cetomacrogol Emulsifying Wax (Emulgade 1000NI), Glycerin.

- Nombor MAL

MAL22046017AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

DYNAPHARM (M) SDN. BHD.

2497, Mk. 1, Lorong Perusahaan Baru

5, Kawasan Perusahaan Perai 3,

13600 Perai, Pulau Pinang,

MALAYSIA.

Tarikh Kemaskini

12/12/2023

Nombor Siri

NPRA (R2) 21/046