

BETA FUSIDIC CREAM

Fusidic Acid (2% w/w) dan Betamethasone 17-Valerate (0.12% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan **Beta Fusidic Cream**
2. Bagaimana **Beta Fusidic Cream** berfungsi
3. Sebelum mengambil **Beta Fusidic Cream**
4. Cara menggunakan **Beta Fusidic Cream**
5. Semasa menggunakan **Beta Fusidic Cream**
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan **Beta Fusidic Cream**
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Beta Fusidic Cream

Ia digunakan untuk merawat jangkitan bacteria termasuk gatal, kemerahan dan kulit kering akibat kulit dijangkiti kuman.

Bagaimana Beta Fusidic Cream berfungsi

Ia mengandungi *fusidic acid*, sejenis antibiotik yang membunuh kuman yang menyebabkan jangkitan. Ia juga mengandungi *betamethasone valerate*, steroid untuk mengurangkan bengkak, kemerahan atau gatal-gatal kulit.

Sebelum mengambil Beta Fusidic Cream

Bila tidak boleh mengambil

- Jika ada alahan terhadap **Beta Fusidic Cream** atau ramuan-ramuan lain **Beta Fusidic Cream**.
- Jika merawat keadaan *acne rosacea* (kemerahan dan keradangan pada hidung dan pipi) atau *perioral dermatitis* (ruam bintik merah pada mulut dan dahi) atau jangkitan kulat.

Sebelum mula mengambil

- Berhati-hati semasa menggunakan berhampiran dengan mata kerana ia mungkin menyebabkan iritasi.
- Sila beritahu doktor jikalau mengandungi atau menyusukan anak.
- Jangan guna pada luka terbuka atau kawasan lubang hidung, telinga, bibir dan tempat sulit kecuali dengan arahan doktor.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika sedang mengambil ubat-ubat lain. Ubat ini cuma memberi kesan minimal semasa memandu atau menggunakan mesin. Walau bagaimanapun, semak dengan doktor jika terdapatnya sebarang kesan sampingan yang mengganggu aktiviti memandu atau menggunakan mesin.

Cara menggunakan Beta Fusidic Cream

Berapa banyak harus digunakan

Luka yang terdedah: Sapu pada bahagian berkenaan 2-3 kali sehari. Luka yang tertutup: Guna bila perlu.

Bila perlu digunakan

Sila ikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

Berapa lama perlu digunakan

Dilarang untuk jangka panjang pada muka. Perlu mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

Jika terlupa mengguna

Guna sebaik sahaja teringat. Kemudian, guna seperti biasa.

Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika terlebih dos, hubungi doktor, jabatan kecemasan atau pusat racun dengan segera.

Semasa menggunakan Beta Fusidic Cream

Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor ubat yang sedang diambil.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat sebaik sahaja berasa lega selepas beberapa hari, sambung sehingga jangka rawatan selesai.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Penggunaan untuk jangka lama dan banyak mungkin mengakibatkan risiko tinggi kesan sampingan dan kulit sensitif. Jikalau hamil atau menyusukan anak, elak gunakan ubat kecuali atas arahan doktor.

Kesan-kesan sampingan

Kadangkala berlaku gerakbalas alahan seperti ruam dan iritasi. Boleh

mengakibatkan rintangan bakteria. Jika digunakan pada tempat luas, luka atau terbalut, *betamethasone 17-valerate* mungkin terserap dan menyebabkan kesan sampingan tersebut. Dengan penggunaan berterusan, penipisan kulit, ruam bintik merah hampir mulut dan jangkitan sekunder mungkin berlaku.

Selain itu termasuk lebih tekanan pada mata (glaucoma) dan katarak mata.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan website npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Beta Fusidic Cream

Penyimpanan

Jauhi ubat daripada kanak-kanak

Untuk Kegunaan Luaran Sahaja

Jauhkan dari cahaya

Jangan simpan melebihi 30°C

Pastikan bekas ubat ditutup ketat

Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang ingin dibuang.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih dengan bau semula jadi.

Bahan-bahan kandungan

- **Bahan aktif:** *Fusidic Acid* dan *Betamethasone 17-Valerate*
- **Bahan tidak aktif:** *Glycerin, Emulgade 1000NI, White Soft Paraffin, Chlorocresol, Liquid Paraffin, Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate, Propylene Glycol*

No. MAL

MAL23056038AZ

Pangilang dan Pemegang

Pendaftaran Produk

DYNAPHARM (M) SDN. BHD.

2497, Mk. 1, Lorong Perusahaan Baru 5, Kawasan Perusahaan Perai 3, 13600, Perai, Pulau Pinang, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

19/05/2026

Nombor Siri

NPRA (R2) 20/127