

DYNA GABAPENTIN CAPSULE 300MG

Gabapentin (300mg)

Apakah yang ada di dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan *GABAPENTIN*
2. Bagaimana *GABAPENTIN* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *GABAPENTIN*
4. Cara menggunakan *GABAPENTIN*
5. Semasa menggunakan *GABAPENTIN*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *GABAPENTIN*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

1. Apakah kegunaan *GABAPENTIN*

Epilepsi:

Gabapentin diindikasikan sebagai terapi tambahan dalam rawatan sawan (separa) dengan atau tanpa generalisasi di kalangan orang dewasa, dan kanak-kanak berumur 3 tahun dan ke atas. Keselamatan dan keberkesanan dalam terapi tambahan pada pesakit kanak-kanak di bawah umur 3 tahun belum dapat dipastikan.

Kesakitan neuropathic:

Gabapentin diindikasikan untuk rawatan sakit neuropathic termasuk diabetes neuropati, pasca-herpes neuralgia dan sakit saraf trigeminal di kalangan orang dewasa berumur 18 tahun dan ke atas. Keselamatan dan keberkesanan pada pesakit yang berumur di bawah 18 tahun belum dapat dipastikan.

2. Bagaimana *GABAPENTIN* berfungsi

Gabapentin adalah sejenis ubat yang digunakan untuk merawat epilepsi dan peripheral neuropathic pain (sakit yang berpanjangan yang disebabkan oleh kerosakan saraf).

3. Sebelum menggunakan *GABAPENTIN*

- Bila tidak boleh menggunakan

JANGAN AMBIL ubat ini jika anda alah (hipersensitif) kepada gabapentin atau mana-mana bahan-bahan lain.

Berhati-hati ketika mengambil Gabapentin

- Jika anda mengalami masalah buah pinggang, doktor akan menetapkan jadual dos yang berbeza
- Jika anda ada menjalani rawatan hemodialisis, beritahu doktor anda
- Jika anda mengalami sakit dan/atau lemah otot

- Jika anda mengalami tanda-tanda seperti sakit perut yang berterusan, merasa sakit dan jatuh sakit hubungi doktor anda dengan segera kerana ia mungkin gejala pankreatitis.
- Sebilangan kecil pesakit yang menerima rawatan anti-epilepsi seperti gabapentin mengalami gangguan perasaan untuk membahayakan atau membunuh diri mereka sendiri. Jika pada bila-bila masa anda mengalami perasaan sebegini, segera hubungi doktor anda.

Mengandung dan menyusukan anak

Hamil:

Disebabkan kekurangan kajian yang mencukupi, maka adalah disyorkan gabapentin hanya digunakan semasa hamil sekiranya potensi faedah melebihi potensi risiko kepada janin.

Menyusukan anak:

Gabapentin dirembeskan ke dalam susu manusia. Oleh kerana kesan ke atas bayi tidak diketahui, hendaklah berhati-hati apabila memberi gabapentin kepada ibu yang menyusukan anak. Penggunaan kepada ibu yang menyusukan anak harus dihadkan hanya sekiranya manfaat jelas lebih besar daripada risiko.

- Sebelum anda mula menggunakannya

Sekiranya anda mengalami masalah buah pinggang, gangguan sistem saraf, gangguan pernafasan atau anda berumur lebih 65 tahun, doktor anda mungkin menetapkan rejimen dos yang berbeza.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru mengambil sebarang ubat untuk sawan, gangguan tidur, kemurungan, kebingungan, atau masalah saraf atau psikiatri yang lain.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil atau baru-baru ini mengambil sebarang ubat-ubatan lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi dari doktor.

Jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan yang mengandungi morfin, beritahu doktor atau ahli farmasi anda kerana morfin boleh meningkatkan kesan gabapentin.

Jika gabapentin dan antasid yang mengandungi aluminium dan magnesium diambil pada masa yang sama, penyerapan gabapentin mungkin akan berkurangan. Oleh itu, adalah disarankan gabapentin diambil sekurang-kurangnya dua jam selepas mengambil antasid.

Gabapentin dijangka tidak mempunyai masalah interaksi dengan ubat-ubat anti-epilepsi yang lain atau pil kontraseptif oral.

Setengah ubat dan gabapentin boleh mengganggu antara satu sama lain:

- Ginkgo
- Primrose Petang
- Ketorolac
- Hydrocodone

4. Cara menggunakan *GABAPENTIN*

Ambil secara oral, bersama atau tanpa makanan, dengan segelas air.

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Epilepsi, dos yang biasa adalah:

- **Orang dewasa dan remaja:**

Ambil kapsul seperti yang diarahkan. Doktor selalunya akan menambah dos anda secara beransur-ansur. Dos permulaan biasanya ialah antara 300 mg dan 900 mg sehari. Selepas itu, doktor boleh menambah lagi sehingga maksimum 3600 mg setiap hari.

- **Kanak-kanak berumur 3 - 12 tahun:**

Dos permulaan adalah dari 10 hingga 15 mg/kg sehari diberikan dalam dos yang dibahagikan sama banyak (tiga kali sehari), sehinggalah dos yang berkesan dicapai dalam tempoh tiga hari. Dos berkesan untuk pesakit berumur 5 tahun dan ke atas adalah 25 hingga 35 mg/kg sehari diberikan dalam dos yang dibahagikan sama banyak (tiga kali sehari). Dos berkesan untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 5 tahun adalah 40 mg/kg sehari diberikan dalam dos yang dibahagikan sama banyak (tiga kali sehari). Selang masa maksimum antara dos tidak boleh melebihi 12 jam.

DYNA GABAPENTIN CAPSULE 300MG

Gabapentin (300mg)

Kesakitan akibat kerosakan pada saraf, terutamanya pada bahagian kaki dan tangan, dos yang biasa adalah:

- Dewasa:

Ambil kapsul seperti yang diarahkan. Doktor selalunya akan menambah dos anda secara beransur-ansur. Dos permulaan biasanya antara 300 mg dan 900 mg setiap hari. Selepas itu, dos boleh ditingkatkan sebagaimana yang diarahkan oleh doktor, sehingga maksimum 3600 mg sehari.

- Jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau sedang menerima rawatan hemodialisis:

Doktor boleh menetapkan dos dan/atau jadual dos yang berbeza jika anda mempunyai masalah dengan buah pinggang atau sedang menjalani rawatan hemodialisis.

Dyna Gabapentin Capsule boleh didapati dalam kekuatan 300 mg. Ia tidak bersesuaian untuk digunakan pada sesetengah kadar dos yang diluluskan untuk gabapentin; di dalam kes-kes tersebut keluaran gabapentin lain pada kekuatan yang berbeza yang telah diluluskan perlu digunakan.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan

keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan sedasi, ataksia, pertuturan tidak jelas, nystagmus, gangguan pergerakan, dan gangguan pencernaan. Dalam kes-kes yang lebih teruk, pesakit mungkin mengalami hipotensi dan depresi sistem saraf pusat yang teruk sehingga memerlukan intubasi.

5. Semasa menggunakan GABAPENTIN

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan GABAPENTIN. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan menghentikan atau berhenti mengambil GABAPENTIN dengan mendadak, kecuali dinasihatkan oleh doktor anda. Jika perlu, doktor akan menghentikannya secara berperingkat dalam tempoh sekurang-kurangnya 1 minggu.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi GABAPENTIN dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera
Gabapentin boleh menjejaskan keupayaan untuk memandu atau mengendalikan mesin. Jangan memandu atau mengendalikan jentera, sehingga dipastikan bahawa ubat ini tidak memberi kesan kepada keupayaan anda untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti ini.

6. Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, GABAPENTIN boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas

menggunakan ubat ini.

Kesan buruk yang paling biasa dilaporkan adalah rasa mengantuk, pening, ataksia (kurang keupayaan mengawal pergerakan otot), dan keletihan.

Kesan psikiatri termasuk kekeliruan, kemurungan, dan ketakutan, dan lebih jarang lagi, halusinasi dan psikosis (gangguan mental dengan gejala, seperti delusi atau halusinasi).

Kesan buruk yang lain termasuk kegagalan ginjal, reaksi alergi, alopecia (keguguran rambut), angioedema (bengkak pada kulit), sakit dada, hepatitis, sakit kuning, gangguan pergerakan seperti choreoathetosis (pergerakan yang tidak terkawal), dyskinesia (kepayahan dalam melakukan pergerakan voluntari) dan distonia (gangguan pada pergerakan, akibat dari pengecutan otot berpanjangan yang menyebabkan berpusing dan pergerakan berulang-ulang atau postur yang tidak normal), berdebar-debar, trombositopenia (jumlah platelet yang luar biasa rendah), dan tinnitus (bunyi deringan dalam telinga).

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Bahagian Kecemasan di hospital terdekat anda jika anda mengalami masalah pernafasan seperti pernafasan perlahan, sesak atau lemah selepas mengambil ubat ini kerana ia boleh menjadi tanda tekanan pernafasan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

7. Cara penyimpanan dan pelupusan GABAPENTIN

- Penyimpanan

Jauhi ubat daripada kanak-kanak Lindungi daripada cahaya Jangan simpan melebihi 30°C

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk

DYNA GABAPENTIN CAPSULE 300MG

Gabapentin (300mg)

melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

8. Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Kapsul berwarna kuning bersaiz '1', mengandungi sebuk keputih-putihan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Gabapentin

- Bahan tidak aktif

Magnesium Stearate, Lactose Powder & Corn Starch

- Nombor MAL

MAL17055007AZ

9. Pengilang & Pemegang

Pendaftaran:

DYNAPHARM (M) SDN. BHD.
2497, Mk. 1, Lorong Perusahaan Baru
5,
Kawasan Perusahaan Perai 3,
13600 Perai, Pulau Pinang, Malaysia

10. Tarikh kemaskini RiMUP

01/04/2022

11. Nombor siri

NPRA(R2/1)220328/859