

RETORIN POWDER FOR SUSPENSION

ERYTHROMYCIN ETHYL SUCCINATE SUSPENSION 200mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Retorin
2. Bagaimana Retorin Berfungsi
3. Sebelum mengambil Retorin
4. Cara menggunakan Retorin
5. Semasa menggunakan Retorin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini

Apakah kegunaan Retorin

- Genitourinary tract infections,
- Pneumonia
- Diphteria
- Erythrasma
- Gonorrhoea
- Legionnaires disease
- Listeria infections
- Pertussis
- Pharyngitis
- Respiratory tract infections
- upper and lower
- Rheumatic fever (prophylaxis)
skin and soft tissue infections,
- Syphilis.

Bagaimana Retorin Berfungsi

digunakan untuk merawat jangkitan bakteria.

Sebelum menggunakan Retorin

Bila tidak boleh menggunakan

Tidak boleh digunakan pada pesakit yang mempunyai alahan kepada ubat ini.

Sebelum menggunakan

Beritahu doktor jika anda mempunyai masalah hati, hamil, merancang untuk hamil atau sedang menyusui.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil ubatan berikut:

- heophylline
- Digoxin
- Ergotamine
- Dihydroergotamine
- Triazolam and midazolam
- Lovastatin
- Carbamazepine,
- Alfentanil,
- Disopyramide.

- Bromocryptine,
- Cyclosporine,
- Hexobarbital and phenytoine.
- Chloramphenicol and lincomycins
- Penicillins

Cara menggunakan Retorin

Berapa banyak harus digunakan

Dos dewasa biasa -

Antibakteria; bersamaan erythromycin 400mg setiap enam jam.

Nota: Gonorea (disebarkan) - bersamaan erythromycin: 800 mg setiap enam jam selama tujuh hari.

Penyakit Legionnaires: The bersamaan erythromycin 800 mg kepada 1.6 gram setiap enam jam. Streptococcal profilaksis - prophylaxis berterusan jangkitan streptococcal pada pesakit yang mempunyai sejarah penyakit jantung reumatik dan / atau chorea: Lisan, bersamaan erythromycin 400 mg setiap dua belas jam.

Sifilis: bersamaan erythromycin 800 mg setiap enam jam selama lima belas hari (sifilis awal) atau tiga puluh hari (lewat sifilis). Dewasa biasa menetapkan had - antibakteria, bersamaan erythromycin: Sehingga 4 gram setiap hari.

Nota: Dos sehingga bersamaan 8 gram erythromycin harian nampaknya diterima baik. Biasa dos kanak-kanak - antibakteria, bersamaan erythromycin: 7,5-12,5 mg per kg berat badan setiap enam jam, atau 15 hingga 25 mg bagi setiap kg berat badan setiap dua belas jam.

Bila perlu digunakan

Patuhi nasihat doktor

Berapa lama perlu digunakan

Patuhi nasihat doktor

Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal dengan segera, jika hampir dengan dos seterusnya, tinggalkan dos yang tertinggal dan teruskan dengan dos berikutnya. Jangan ambil lebih daripada dos yang dibenarkan

Jika menggunakannya secara berlebihan(terlebih dos)

Dapatkan bantuan perubatan secepat mungkin jika anda mengambil retorin secara berlebihan.

Semasa menggunakan Retorin

Perkara yang perlu dilakukan

Ikut nasihat doktor

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Behenti mengambil, tanpa nasihat doktor
Memberikan ubat berkenaan kepada orang lain yang mengalami masalah sama

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Jika anda mempunyai masalah hati.
- Jika anda mempunyai masalah pergigian.
- Apabila digunakan dengan terfenadine.
- Jika digugurkan semasa kehamilan

Kesan-kesan Sampingan

Seperti ubat lain, Retorin boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mendapatnya. Antaranya ialah loya, muntah dan cirit-birit

Retorin boleh menyebabkan alahan yang teruk dan tindak balas kulit yang serius. Berhenti menggunakan Retorin dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami mana-mana simptom berikut: kulit kemerahan, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata

Jika anda perasan bahawa kanak-kanak itu muntah dan/atau kerengsaan semasa menyusui berlaku, hubungi doktor dengan segera kerana ia mungkin disebabkan oleh Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis (IHPS).

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

RETORIN POWDER FOR SUSPENSION

ERYTHROMYCIN ETHYL SUCCINATE SUSPENSION 200mg/5ml)

Cara Penyimpanan dan Pelupusan

Retorin

Penyimpanan

Simpan pil pada suhu kurang daripada 30°C. Jauhkan daripada suhu panas, cahaya dan kelembapan serta JAUHKAN DARIPADA KANAK-KANAK. Penggantungan lisan perlu disejukkan dan digunakan dalam tempoh yang dinyatakan.

Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui air buangan atau buangan isirumah. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi persekitaran.

Maklumat lanjut

Rupa/bentuk

Serbuk kering, mestilah bebas daripada ketulan dan apa-apa kekotoran kelihatan. Warna serbuk kering - putih atau hampir putih. Selepas dibancuh semula – menjadi cecair berwarna merah jambu.

Bahan-bahan Kandungan

Bahan aktif yang digunakan ialah Erythromycin Ethyl Succinate .

Bahan-bahan bukan aktif yang digunakan ialah American ice cream soda, sodium phosphate dibasic, xanthum gum, aerocil 200, tween 80, caster sugar, sodium citrate, ponceau 4r lake, corn starch, veegum, vanilla flavor, sodium benzoate, sodium saccharin.

No.MAL: MAL19961700AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran

SM PHARMACEUTICALS
SDN.BHD(218628-M)
Lot 88, Sungai Petani Industrial Estate
08000, Sungai Petani
Kedah Darul Aman, Malaysia

Tarikh Kemaskini: 05.04.2021
NPRA(R2/1)220328/858