

FUSIX TABLET 40MG

FRUSEMIDE TABLET 40MG

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Fusix Tablet
2. Bagaimana Fusix Berfungsi
3. Sebelum mengambil Fusix Tablet
4. Cara menggunakan Fusix Tablet
5. Semasa menggunakan Fusix Tablet
6. Cara Penyimpanan dan Pelupusan
7. Kesan sampingan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini

Apakah kegunaan Fusix Tablet

Furosemide digunakan untuk rawatan edema Ia juga digunakan dalam rawatan tekanan darah tinggi (yang rendah), biasanya digabungkan dengan ejen-ejen antihipertensi yang lain.

Bagaimana Fusix Berfungsi

Furosemide membantu buah pinggang anda untuk menyingkirkan air yang berlebihan yang tidak diperlukan di dalam badan anda.

Sebelum mengambil Fusix Tablet

Bila tidak boleh mengambil

Furosemide tidak digalakkan untuk pesakit anuria. Tidak digalakkan jika ada peningkatan azotemia dan / atau oliguria berlaku semasa rawatan p enyakit , buah pinggang yang teruk Bagi pesakit dengan masalah hati atau kekurangan elektrolit, terapi tidak boleh dimulakan sehingga keadaan asas diperbaiki atau diperbetulkan. Furosemide juga tidak digalakkan bagi pesakit yang ada hipersensitiviti terhadap furosemide dan sulphonamides.

Sebelum mula mengambil

Sila dapatkan nasihat doktor jika anda mengalami masalah berikut sebelum mengambil Fusix Tablet:

- Alah kepada furosemide,
- Mempunyai tekanan darah rendah
- Mempunyai kegagalan buah pinggang yang teruk

- Mempunyai sirosis hati (letih, lemah, pengejalan air, atau rasa sakit, kehilangan berat badan atau selera makan, kekuningan kulit atau mata, gatal-gatal)
- Mempunyai apa-apa gangguan bahan kimia badan (ini boleh membuat anda berasa lemah, bersikap tidak peduli atau mempunyai kejang otot)
- Tidak mengeluarkan apa-apa air kencing
- Mempunyai keracunan digitalis (rasa atau sakit, tahap kalium dalam darah, lambat, denyutan jantung yang cepat atau tidak teratur)

Jika mengambil ubat-ubat lain

Dapatkan nasihat doktor/ahli farmasi sebelum mengambil ubatan dibawah , kerana interaksi dengan Fusix Tablet mungkin berlaku.

Doktor /ahli farmasi anda akan menyuplai maklumat yang lebih terperinci mengenai kesan interaksi. Ubat-ubatan berkenaan adalah:

- Ubat untuk tekanan darah rendah, seperti ACE inhibitor
- Bukan steroid ubat anti-radang (NSAID) seperti ibuprofen atau naproxen
- digoxin untuk jantung anda penenang otot curariform (contohnya vecuronium)
- Kortikosteroid digunakan untuk merawat reaksi alahan julap yang digunakan dalam tempoh masa yang panjang rawatan tertentu untuk asma seperti teofilin
- Antibiotik untuk jangkitan yang memberi kesan kepada buah pinggang atau telinga anda (contohnya cefaclor, colistin, gentamicin, vancomycin)
- litium untuk kemurungan atau mania

Cara menggunakan Fusix Tablet

Berapa banyak harus diambil

Dalam rawatan edema, dos awal yang biasa ialah 40 mg sekali sehari melalui mulut, diselaraskan seperti yang diperlukan mengikut tindak balas. Kes-kes ringan boleh bertindak balas kepada 20 mg setiap hari atau 40 mg selang sehari. Sesetengah pesakit mungkin memerlukan dos 80 mg atau lebih setiap hari boleh diberikan satu atau dua dos setiap hari, atau berselang.

Kes-kes yang teruk mungkin memerlukan pentitratan secara beransur-ansur furosemide dos sehingga 600 mg setiap hari. Jika perlu dos seterusnya peningkatan sebanyak 20 mg dibenarkan dan ia tidak boleh diberikan

lebih kerap daripada 2 jam.

Bagi kanak-kanak, dos biasa melalui mulut adalah 1 hingga 3 mg bagi setiap kg berat badan setiap hari sehingga maksimum 40 mg setiap hari. Dalam rawatan tekanan darah tinggi, furosemide diberikan dalam dos 40 hingga 80 mg setiap hari, sama ada bersendirian atau bersama-sama dengan ejen-ejen antihipertensi yang lain

Terapi dos tinggi.

Pesakit yang tidak bertindak balas kepada dos 1 g mungkin memerlukan dialisis. Jika jawapan kepada salah kaedah pentadbiran memuaskan, dos berkesan (sehingga 1 g) kemudiannya boleh diulangi setiap 24 jam. Dos pelarasan kemudiannya hendaklah dibuat mengikut tindak balas pesakit. Selain itu, rawatan boleh dikekalkan oleh mulut; 500 mg perlu diberi melalui mulut bagi setiap 250 mg dikehendaki oleh suntikan.

Dalam rawatan kekurangan buah pinggang kronik, dos permulaan 250 mg boleh diberikan oleh mulut, meningkat, jika perlu dalam langkah 250 mg setiap 4 hingga 6 jam untuk maksimum 1.5 g dalam 24 jam; dalam kes-kes yang luar biasa sehingga 2.0 g dalam masa 24 jam, boleh diberikan. Dos pelarasan kemudiannya hendaklah dibuat mengikut tindak balas pesakit. Semasa rawatan dengan bentuk-bentuk berdos tinggi terapi furosemide, kawalan makmal berhati-hati adalah penting. Keseimbangan cecair dan elektrolit perlu

FUSIX TABLET 40MG

FRUSEMIDE TABLET 40MG

dikawal dengan teliti dan, khususnya, pada pesakit dengan kejutan, langkah-langkah yang perlu diambil untuk membetulkan tekanan darah dan jumlah darah yang beredar, sebelum memulakan jenis ini rawatan. Dos tinggi terapi frusemide adalah kontra-ditunjukkan dalam kegagalan buah pinggang disebabkan oleh ejen-ejen atau nephrotoxic hepatotoxic, dan kegagalan buah pinggang yang berkaitan dengan koma hati.

Bila perlu diambil

Sekali sehari melalui mulut dan diselaraskan mengikut tindak balas pesakit. Ubat harus ditelan terus dan diambil bersama segelas air.

Ini hanya Rekomendasi, bagi dos sebenar sila sentiasa merujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda

Berapa lama perlu diambil

Patuhi nasihat doktor

Jika anda terlupa mengambil

Ambil dos yang tertinggal dengan segera jika hampir dengan dos seterusnya, tinggalkan dos yang tertinggal dan teruskan dengan dos berikutnya. Jangan ambil lebih daripada dos yang dibenarkan.

Jika terlebih dos

Berlebihan akan membawa kepada kekurangan cecair dan garam selepas diuresis berlebihan awal. Bantuan perubatan perlu dipanggil tanpa berlengah-lengah untuk memastikan langkah-langkah segera untuk pemulihan air yang mencukupi dan baki elektrolit

Semasa menggunakan Fusix Tablet

Perkara yang perlu dilakukan

Ikut nasihat doktor

Perkara yang tidak perlu dilakukan

Behenti mengambil, tanpa nasihat doktor
Memberikan ubat berkenaan kepada orang lain yang mengalami masalah sama

Perkara yang perlu diberi perhatian

Walaupun frusemide digunakan dalam dos yang tinggi untuk oliguria kerana kekurangan buah pinggang kronik atau akut ia tidak perlu diberikan dalam anuria atau kegagalan buah pinggang yang disebabkan oleh ubat nephrotoxic atau hepatotoxic mahupun dalam kegagalan buah pinggang yang berkaitan dengan koma hati. Frusemide tidak boleh diberikan di negeri-negeri pra-pengsan dikaitkan dengan sirosis hati. Ia harus digunakan dengan berhati-hati di kalangan pesakit yang hipertropi prostatik atau kerosakan kencing kerana ia boleh mencetuskan pengekalan kencing akut.

Frusemide harus digunakan dengan berhati-hati dalam mengandung.

Laktasi - Frusemide pas ke dalam susu ibu, dan menghalang pengeluaran susu. Oleh itu, ia tidak boleh diberikan semasa penyusuan.

Kesan Sampingan

Kesan sampingan yang biasa ialah cecair dan ketidakseimbangan elektrolit.

Kesan pada kulit yang selalu dilaporkan ialah ruam kulit, gatal-gatal, dermatitis, kulit mengelupas.

Furosemide boleh menyebabkan hiperurisemia (kadar asid urik tinggi dalam darah) dan memicu serangan gout pada beberapa pesakit.

Seperti semua ubat, Fusix Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengidapnya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Fusix Tablet

Penyimpanan

Simpan pil pada suhu kurang daripada 30°C. Jauhkan daripada suhu panas, cahaya dan kelembapan serta JAUHKAN DARIPADA KANAK-KANAK

Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui air bungan atau buangan isirumah. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi persekitaran

Maklumat Lanjut

Rupa/bentuk

Putih untuk luar putih, bulat, rata dan mempunyai garis putus pada satu muka.

Bahan-bahan Kandungan

Bahan Aktif yang digunakan ialah Frusemide BP 40 mg dan bahan tidak aktif ialah Lactose, Purified Talc, Corn starch, Magnesium Stearate

No.MAL: MAL19991894AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran

SM PHARMACEUTICALS

SDN.BHD(218628-M)

Lot 88, Sungai Petani Industrial Estate

08000, Sungai Petani

Kedah Darul Aman, Malaysia

Tarikh Kemaskini: 01.06.2020

NPRA (R2/1)200521/443