

POTRELEASE TR TABLET

Potassium chloride (600mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Potrelease TR Tablet
2. Bagaimana Potrelease TR Tablet Berfungsi
3. Sebelum menggunakan Potrelease TR Tablet
4. Cara menggunakan Potrelease TR Tablet
5. Semasa menggunakan Potrelease TR Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini

Apakah kegunaan Potrelease TR Tablet

Untuk rawatan dan pencegahan kalium yang rendah di dalam darah.

Bagaimana Potrelease TR Tablet Berfungsi

Ubat ini digunakan untuk meningkatkan kalium dalam darah.

Sebelum menggunakan Potrelease TR Tablet

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika anda mempunyai masalah:

- Penyakit buah pinggang yang teruk (anda mungkin mengeluarkan sedikit atau tiada air kencing).
- Addison's disease (pengeluaran hormon yang tidak mencukupi oleh kelenjar adrenal) yang tidak dirawat.
- Dehidrasi
- Kekejangan otot kerana kepanasan
- Paras kalium yang tinggi dalam darah
- Usus yang tersumbat, pergerakan usus yang tidak normal atau ulser usus.
- Terlalu banyak asid dalam badan.

-Sebelum mula menggunakan Potrelease TR Tablet

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Ubat yang boleh mengganggu Potrelease TR Tablet seperti:

- Ubat untuk darah tinggi: Captopril
- Ubat untuk denyutan jantung perlahan dan keracunan racun serangga: Atropin
- Garam kalsium
- Ubat jantung: Digitalis glycoside
- Terapi hormon: Adrenocorticoids, Glucocorticoids, Corticotrophin (ACTH)
- Ubat untuk paras kalium yang tinggi dalam darah: sodium polystyrene sulfonate
- Laksatif
- Susu rendah garam
- Ubat-ubatan yang mengandungi kalium
- Pil air: Amiloride, Spironolactone, Triamterene.
- Ubat untuk degupan jantung tidak teratur: Quinidine
- Vitamin B12

Cara menggunakan Potrelease TR Tablet

-Berapa banyak harus digunakan

- Dewasa: diberikan secara oral, 1 hingga 2 biji, tiga kali sehari.
- Kanak-Kanak: Penggunaan tidak digalakkan.
- Telan keseluruhan tablet dengan segelas air yang penuh.
- Jangan kunyah atau hancurkan tablet.

-Bila perlu digunakan

Ambil 3 kali sehari dengan atau sejurus selepas makan atau ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Ambil Potrelease TR Tablet mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

-Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Potrelease TR Tablet

-Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Potrelease TR Tablet.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Potrelease TR Tablet kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

POTRELEASE TR TABLET

Potassium chloride (600mg)

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda mempunyai sebarang kesan sampingan, hentikan penggunaan ubat ini dan beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Kesan-kesan Sampingan

Seperti ubat- ubatan lain, Potrelease TR Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan sampingan Potrelease TR tablet jarang berlaku di kalangan orang yang mempunyai fungsi buah pinggang yang normal. Rujuk doktor anda dengan segera jika anda mengalami: Kekeliruan; Denyutan jantung yang tidak teratur; Kebas pada bahagian tangan, kaki atau bibir; sesak nafas atau kesukaran bernafas; keresahan yang tidak dapat dijelaskan; keletihan atau kelemahan yang tidak normal; kelemahan atau rasa berat pada kaki. Rujuk doktor anda jika gejala ini berterusan atau mengganggu: Cirit-birit, loya, sakit perut dan muntah. Kesan sampingan ini berlaku dengan lebih kerap apabila ubat tidak diambil bersama makanan.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Potrelease TR Tablet

-Penyimpanan

Simpan tablet di bawah suhu 30°C di dalam bekas yang tertutup rapat.

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet bersalut yang berwarna kuning, berbentuk bulat dengan cekung yang mendalam pada permukaan.

-Bahan-bahan Kandungan

-Bahan aktif:

Potassium chloride

-Bahan tidak aktif :

Cetostearyl alcohol, ethyl cellulose, gelatin, magnesium stearate, isopropyl alcohol, purified talcum, color quinoline yellow, tween 80, acetone, beeswax dan purified water.

- Nombor MAL: MAL19950545XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran

Produk:

SM PHARMACEUTICALS SDN.BHD
Lot 88, Sungai Petani Industrial Estate
08000, Sungai Petani,
Kedah Darul Aman, Malaysia

Tarikh Kemaskini: 22/02/2023

Nombor siri:

NPRA(R4/1)050123/00002