

PREGAL 150 MG CAPSULE

Pregabalin 150 mg

Apakah yang ada pada risalah ini

Apakah kegunaan Pregal 150mg capsule
Bagaimana Pregal 150mg capsule

Berfungsi

Sebelum mengambil Pregal 150mg capsule

Cara menggunakan Pregal 150 capsule

Semasa menggunakan Pregal 150mg capsule

Kesan-kesan sampingan

Cara Penyimpanan dan Pelupusan

Maklumat lanjut

Pengilang dan Pemegang pendaftaran Produk

Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Pregal 150mg capsule

- Kesakitan neuropatik
Pregabalin ditunjukkan untuk rawatan sakit perut dan pusat neuropathic pada orang dewasa.
- Epilepsi
Pregabalin ditunjukkan sebagai terapi adjunctive pada orang dewasa dengan eizures separa dengan atau tanpa penjelasan sekunder.
- Gangguan Kecemasan Umum
Pregabalin ditunjukkan untuk rawatan Gangguan Kecemasan Umum (GAD) pada orang dewasa.
- Fibromyalgia
Pregabalin juga digunakan untuk rawatan berkaitan fibromyalgia.

Bagaimana Pregal 150mg capsule

Berfungsi

Pregabalin berada dalam kelas ubat-ubatan yang dipanggil anticonvulsants. Ia berfungsi dengan mengurangkan bilangan isyarat sakit yang dihantar oleh saraf yang rosak di dalam badan.

Sebelum mengambil Pregal 150capsule

-Bila tidak boleh

Jika anda alah kepada pregabalin atau mana-mana bahan lain ubat ini.

-Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai

- Masalah jantung

- Jika anda hamil atau merancang untuk hamil atau menyusu.

- Jika anda menhidap Diabetes

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor / ahli farmasi anda jika anda mengambil apa-apa ubat, termasuk yang anda beli tanpa preskripsi.

- Jangan mengambil Pregal 150mg capsule jika anda sudah mengambil ubat lain yang mengandungi Pregabalin.

- Jangan mengambil Pregal 150mg capsule bersama ubat-ubatan yang mengandungi

- Ubat Antiepileptik lain (ubat berfungsi dengan cara yang berbeza untuk mencegah kejang)
- Kontraseptif Lisan (ubat yang menghalang kehamilan.)
- Lorazepam (Ia digunakan untuk merawat gangguan keseimbangan)
- Oxycodone (adalah ubat opioid yang digunakan untuk rawatan kesakitan yang sederhana dan teruk.)
- Etanol (alkohol)
- Diuretik (adalah ubat yang direka untuk meningkatkan jumlah air dan garam yang dikeluarkan dari badan sebagai air kencing.)

• Hypoglycemik Oral (Dadah yang digunakan dalam kencing manis merawat kencing manis dengan menurunkan tahap glukosa dalam darah)

• Insulin (adalah hormon yang merendahkan tahap glukosa (sejenis gula) dalam darah).

Cara menggunakan Pregal 150mg Capsule

-Berapa banyak harus diambil

- Dos adalah 150-600 mg / hari, yang diberikan dalam dos 2 atau 3 dibahagikan.

-Bila perlu diambil

Patuhi nasihat doktor.

-Berapa lama perlu diambil

Jangan berhenti mengambil Pregal 150mg capsule tanpa nasihat doktor.

-Jika anda terlupa mengambil

Ambil dos yang tertinggal dengan segera apabila teringat. Jika sudah hampir dengan dos seterusnya, langkau dos yang tertinggal dan ambil dos seterusnya secara biasa,

jangan gandakan dos untuk menggantikan dos yang terlupa.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda telah mengambil Pregal 150mg capsule secara tidak sengaja, anda mungkin mengalami peningkatan risiko mengalami kesan sampingan dengan ubat ini.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke hospital terdekat untuk rawatan.

Semasa menggunakan Pregal 150mg capsule

-Perkara yang perlu dilakukan

Ikut nasihat doktor

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil Pregal 150mg capsule tanpa berunding dengan doktor anda terlebih dahulu.

Adalah penting untuk mengambil langkah berjaga-jaga supaya tidak menjangkiti orang lain.

Jangan berikan ubat anda kepada orang lain yang mengalami gejala yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Perlu dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat perubatan sekiranya tanda-tanda pemikiran atau tingkah laku bunuh diri muncul.
- Berhati-hati harus dilakukan pada pesakit dengan riwayat penyalahgunaan bahan dan pesakit harus dipantau untuk gejala pregabalin penyalahgunaan, penyalahgunaan atau ketergantungan.

PREGAL 150 MG CAPSULE

Pregabalin 150 mg

Kesan-kesan Sampingan

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Kesan sampingan yang biasa termasuk cirit-birit, muntah, loya, pening.

Jumpa doktor atau ahli farmasi dengan segera jika anda mengalami apa-apa kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web <http://npra.moh.gov.my> (Orang Awam Laporkan Kesan Sampingan Ubat (ConSERF) atau Vaksin (AEFI))

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Pregal 150 capsule

-Penyimpanan

Simpan pada suhu kurang daripada 30°C.
JAUHKAN DARIPADA KANAK-KANAK.

-Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi persekitaran

Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan Warna Produk

Kapsul bersaiz “2”, berwarna putih, bercetak “SM-LU” pada bahagian atas dan “150” pada bahagian bawah, dengan dakwat hitam, serta diisi dengan sebuk yang keputihan.

-Bahan-bahan Kandungan

Bahan aktif yang digunakan ialah Pregabalin

Bahan bukan aktif yang digunakan ialah Pregelatinized starch
Purified Talc

Nombor MAL:

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran

Produk

SM Pharmaceuticals Sdn.Bhd(218628-M)
Lot 88,Sungai Petani Industrial Estate
08000,Sungai Petani
Kedah Darul Aman,Malaysia

Tarikh Kemaskini: 30.08.2021

NPRA(R2)21/017