

# Imdur®

Isosorbide-5-mononitrate 30mg, 60mg

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Imdur®
2. Bagaimana Imdur® berfungsi
3. Sebelum menggunakan Imdur®
4. Cara menggunakan Imdur®
5. Semasa menggunakan Imdur®
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Imdur®
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Imdur®

Imdur digunakan sebagai rawatan pencegahan spasma vaskular di dalam jantung (angina pectoris).

## Bagaimana Imdur® berfungsi

Imdur bertindak dengan meluaskan salur darah lalu memudahkan kerja jantung sekiranya berlaku spasma vaskular di dalam jantung.

## Sebelum menggunakan Imdur®

- Bila tidak boleh mengambil Imdur®

Anda tidak boleh menggunakan Imdur dalam keadaan yang berikut:

- sedang mengalami renjatan
- sedang mengalami tekanan darah yang rendah
- sedang menghidap penyakit otot jantung (kardiomiopati berserta penyempitan)
- sedang mengalami penyakit yang tertentu pada perikardium (perikarditis berserta penyempitan, tamponad perikardium)
- sedang memakan perencat fosfodiesterase jenis 5 pada masa yang sama, misalnya Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil) dan Levitra (vardenafil)
- hipersensitif terhadap mana-mana ramuannya

- Sebelum mengambil Imdur®

Bincanglah dengan doktor sebelum anda mula menggunakan Imdur jika anda mengalami mana-mana masalah kesihatan yang berikut:

- kerosakan otak
- penyakit jantung
- aras oksigen yang terkurang di dalam darah (hipoksemia)
- kekurangan sel darah merah (anemia)
- fungsi kelenjar tiroid yang kurang sempurna (hipotiroidisme)

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda memakan ubat lain pada masa yang sama dengan Imdur. Sesetengah jenis ubat boleh menjejaskan atau boleh terjejas oleh rawatan dengan Imdur.

Semasa menjalani rawatan dengan Imdur, anda tidak boleh menggunakan perencat fosfodiesterase jenis 5, misalnya Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil) dan Levitra (vardenafil), yang digunakan untuk merawat impotens (disfungsi erektil atau mati pucuk).

## Cara menggunakan Imdur®

- Berapa banyak harus digunakan

Doktor akan menentukan dos yang sesuai bagi anda. Dos biasa ialah 60 mg sekali sehari.

- Bila perlu digunakan

Tablet bagi kekuatan yang lebih rendah, iaitu 30mg dan 60mg, boleh dibelah. Tablet yang lengkap ataupun yang dibelah tidak boleh dikunyah atau dihancurkan dan mestilah ditelan sekurang-kurangnya dengan ½ gelas cecair.

Kandungan tablet Imdur disaluti kelongsong yang boleh melalui usus tanpa diubah. Oleh itu, tablet ini mungkin akan nampak sempurna sepenuhnya, tetapi sebenarnya,

bahan aktif di dalamnya telah pun meresap keluar dalam perjalanan melalui salur gastrousus.

- Berapa lama perlu digunakan

Jangan berhenti memakan tablet walaupun anda sudah berasa sihat, kecuali diarahkan oleh doktor.

Jika anda ada pertanyaan selanjutnya mengenai penggunaan ubat ini, tanyalah doktor atau ahli farmasi.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa memakan satu dos, makanlah sebaik sahaja anda ingat. Walau bagaimanapun, jika waktunya sudah hampir dengan waktu dos yang seterusnya, abaikan sahaja dos yang tertinggal itu.

Jangan makan dua dos untuk menggantikan dos yang terlupa dimakan itu.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda memakan terlebih banyak ubat, hubungi doktor atau hospital untuk mendapatkan penilaian risiko dan nasihat.

## Semasa menggunakan Imdur®

- Perkara yang perlu dilakukan

Makanlah ubat ini seperti yang telah diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti memakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

## Kehamilan

Pengalaman menggunakannya semasa hamil masih terhad.

Oleh itu, beritahu doktor jika anda

**Imdur®**

Isosorbide-5-mononitrate 30mg, 60mg

menggunakan Imdur semasa hamil, kecuali digunakan sekali-sekala sahaja.

Menyusukan anak dengan susu badan

Tidak diketahui sama ada isosorbida mononitrat akan dipindahkan ke dalam susu badan.

Oleh itu, tanyalah doktor sebelum menggunakan Imdur secara tetap semasa menyusukan anak dengan susu badan.

Memandu dan mengendalikan jentera

Imdur boleh menjejaskan kebolehan bertindak balas, kerana anda mungkin akan berasa pening semasa memakan ubat ini.

Anda haruslah mempertimbangkan perkara ini semasa memandu atau mengendalikan jentera.

**Kesan-kesan sampingan**

Kesan sampingan boleh berlaku, tetapi anda tidak semestinya akan mengalami mana-mana satu pun.

Lazim berlaku:(lebih daripada dalam setiap 100 pengguna akan mengalaminya): sakit kepala, tekanan darah rendah yang boleh menyebabkan pening dan loya, peningkatan kadar denyutan nadi. Sakit kepala akan hilang beberapa minggu selepas memulakan rawatan.

Tidak lazim berlaku: muntah-muntah, cirit-birit.

Jarang-jarang sekali berlaku (kurang daripada 1 dalam setiap 1000 pengguna akan mengalaminya): pitam, ruam, gatal-gatal.

Kes-kes terencil berlakunya sakit otot (mialgia) pernah dilaporkan

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan adwers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adwers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web [npra.moh.gov.my](http://npra.moh.gov.my) (*Public Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety*).

**Cara penyimpanan dan pelupusan Imdur®**Penyimpanan

Jauhkan daripada capaian dan pandangan kanak-kanak.

Guna sebelum tarikh luput yang dinyatakan pada bungkusannya.

Pelupusan

Sila semak dengan ahli farmasi anda bagaimana anda patut melupuskan ubat anda

**Maklumat Lanjut**Rupa dan warna produk

Tablet pelepasan lanjut 30 mg: merah jambu, bujur dengan garis patah, ditandai A/II.

Tablet pelepasan lanjut 60 mg: kuning pucat, bujur dengan garis patah, ditandai A/ID.

**Bahan-bahan kandungan**Bahan Aktif:

isosorbide mononitrate 30 mg atau 60 mg

Bahan Tidak Aktif:

magnesium stearat, silikon dioksida, parafin, hipromelosa, hidroksiropil selulosa, natrium aluminium silikat, makrogol, pewarna (titanium dioksida E171), pewarna bagi tablet pelepasan lanjut 30 dan 60 mg (besi oksida E172).

Nombor MAL:

Tablet Imdur 30mg: MAL 19940091A

Tablet Imdur 60mg: MAL 19940090A

**Pengilang**

Laboratorios Alcalá Farma, S.L.  
Avenida de Madrid, 82, Alcalá de Henares,

Madrid, 28802, Spain

**Pemegang Pendaftaran Produk**

Zuellig Pharma Sdn Bhd  
No 15, Persiaran Pasak Bumi,  
Seksyen U8, Perindustrian Bukit  
Jelutong, 40150, Shah Alam,  
Selangor.

**Tarikh Kemaskini RiMUP**

19/09/2024

**Nombor Siri**

NPRA (R1/2) 16012025/002