

OLUMIANT FILM-COATED TABLETS

Baricitinib (2 mg, 4 mg)

Apa yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Olumiant
2. Bagaimana Olumiant berfungsi
3. Sebelum menggunakan Olumiant
4. Cara menggunakan Olumiant
5. Semasa menggunakan Olumiant
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Olumiant
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Olumiant

Radang sendi reumatoid (rheumatoid arthritis)

Olumiant digunakan untuk merawat orang dewasa yang mengalami radang sendi reumatoid, sejenis penyakit radang sendi yang sederhana atau teruk, sekiranya rawatan yang sebelumnya tidak berkesan atau tidak sesuai.

Olumiant boleh digunakan secara bersendirian atau bersama dengan ubat-ubatan lain, seperti *methotrexate*.

Radang kulit (atopic dermatitis)

Olumiant digunakan untuk merawat kanak-kanak dari umur 2 tahun, remaja dan orang dewasa yang mengalami radang kulit peringkat sederhana hingga teruk, ia juga dikenali sebagai ekzema atopik. Olumiant boleh digunakan bersama atau tanpa ubat ekzema yang disapu pada kulit.

Keguguran rambut yang teruk / kebotakan (alopecia areata)

Olumiant digunakan untuk merawat orang dewasa yang menghadapi *alopecia areata* yang teruk, penyakit autoimun yang dicirikan oleh keradangan, keguguran rambut tanpa parut pada kulit kepala, muka dan kadang-kadang pada bahagian lain badan yang boleh berulang dan merebak (progresif).

Kanak-kanak dan remaja

Artritis idiopatik juvenil poliartikular, artritis berkaitan entesis, dan artritis psoriatik juvenil

Olumiant digunakan untuk merawat

artritis idiopatik juvenil poliartikular yang aktif, iaitu penyakit radang pada sendi, dalam kalangan kanak-kanak berumur 2 tahun ke atas.

Olumiant juga digunakan untuk merawat artritis berkaitan entesis yang aktif, iaitu penyakit radang pada sendi dan kawasan di mana tendon bersambung dengan tulang, dalam kalangan kanak-kanak berumur 2 tahun ke atas.

Olumiant turut digunakan untuk merawat artritis psoriatik juvenil yang aktif, iaitu keadaan radang pada sendi yang sering disertai psoriasis, dalam kalangan kanak-kanak berumur 2 tahun ke atas.

Olumiant boleh digunakan secara bersendirian atau bersama *methotrexate*.

Bagaimana Olumiant berfungsi

Olumiant mengandungi bahan aktif yang bernama baricitinib. Ianya tergolong dalam golongan ubat-ubatan yang dikenali sebagai *Janus kinase inhibitors*, yang boleh membantu mengurangkan keradangan.

Radang sendi reumatoid (rheumatoid arthritis)

Olumiant berfungsi dengan mengurangkan aktiviti satu enzim di dalam badan yang bernama '*Janus kinase*', yang terlibat dalam proses keradangan. Dengan mengurangkan aktiviti enzim ini, Olumiant boleh membantu mengurangkan kesakitan, kekerasan dan bengkak pada bahagian sendi, keletihan, dan bantu memperlahankan kerosakan pada bahagian tulang dan rawan di dalam sendi. Kesan-kesan ini boleh membantu anda melakukan aktiviti-aktiviti harian biasa dan mempertingkatkan kualiti hidup yang berkaitan dengan kesihatan pesakit yang mengalami radang sendi reumatoid.

Radang kulit (atopic dermatitis)

Olumiant berfungsi dengan mengurangkan aktiviti enzim dalam badan yang disebut '*Janus kinase*', yang terlibat dalam keradangan. Dengan mengurangkan aktiviti enzim ini, Olumiant membantu memperbaiki keadaan kulit anda dan mengurangkan rasa gatal. Selain itu, Olumiant membantu memperbaiki

gangguan tidur anda (kerana gatal) dan kualiti hidup keseluruhan. Olumiant juga terbukti dapat memperbaiki gejala sakit kulit, kegelisahan, dan kemurungan yang berkaitan dengan *atopic dermatitis*.

Keguguran rambut yang teruk / kebotakan (alopecia areata)

Olumiant berfungsi dengan mengurangkan aktiviti enzim dalam badan yang dipanggil '*Janus kinase*', yang terlibat dalam keradangan. Dengan mengurangkan aktiviti enzim ini, Olumiant membantu rambut untuk tumbuh semula pada kulit kepala, muka dan bahagian lain badan yang terjejas oleh penyakit ini.

Sebelum menggunakan Olumiant

- Apabila anda tidak boleh menggunakannya

Jangan mengambil Olumiant:

- jika anda mempunyai alahan kepada baricitinib atau mana-mana bahan kandungan dalam ubat ini (sila rujuk bahagian **Maklumat Lanjut**).
- jika anda hamil atau fikir anda mungkin hamil.

Kanak-kanak dan remaja

Jika boleh, kanak-kanak dan remaja harus divaksinasi sebelum menggunakan Olumiant.

Jangan berikan ubat ini kepada kanak-kanak di bawah umur 2 tahun.

Jangan berikan ubat ini kepada kanak-kanak dan remaja yang menghadapi *alopecia areata* di bawah umur 18 tahun kerana tiada kajian yang dilakukan dalam kumpulan pesakit ini.

Mengandung dan menyusukan anak

Jika anda hamil atau menyusu anak, fikir anda mungkin hamil atau merancang untuk mempunyai anak, dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini.

Anda patut menggunakan cara pencegahan kehamilan yang berkesan untuk mencegah kehamilan semasa rawatan dengan Olumiant dan sekurang-kurangnya satu minggu selepas rawatan Olumiant yang

OLUMIANT FILM-COATED TABLETS

Baricitinib (2 mg, 4 mg)

terakhir. Anda mesti memberitahu doktor anda sekiranya anda hamil sebab Olumiant tidak patut digunakan semasa hamil.

Anda tidak patut mengambil Olumiant semasa menyusu anak kerana ianya tidak diketahui sama ada ubat ini boleh melalui susu badan. Anda patut berbincang dengan doktor anda jika anda perlu menyusu anak atau mengambil Olumiant. Anda tidak patut melakukan kedua-duanya.

- Sebelum anda mula menggunakannya

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum dan semasa menjalani rawatan dengan Olumiant sekiranya anda:

- berumur lebih daripada 65 tahun. Pesakit berumur 65 tahun ke atas mungkin berisiko lebih tinggi mendapat jangkitan, masalah jantung termasuk serangan jantung dan beberapa jenis kanser. Doktor anda akan berbincang dengan anda jika Olumiant sesuai untuk anda
- mengalami jangkitan, atau jika anda sering mengalami jangkitan. Beritahu doktor anda jika anda mengalami luka dan mengalami simptom-simptom seperti demam dan berasa lebih letih dari biasa kerana ini mungkin gejala-gejala jangkitan. Olumiant boleh mengurangkan kebolehan badan anda mengatasi jangkitan dan mungkin menyebabkan jangkitan yang sedia ada bertambah teruk atau meningkatkan peluang mengalami jangkitan. Jika anda menghidap diabetes atau berumur lebih daripada 65 tahun anda mungkin mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk mendapat jangkitan.
- sedang menghidapi, atau pernah menghidapi penyakit tuberkulosis. Anda mungkin perlu menjalani ujian untuk penyakit tuberkulosis sebelum anda diberi Olumiant. Beritahu doktor anda jika anda mengalami batuk yang berterusan, demam, berpeluh pada waktu malam dan penurunan berat badan semasa menjalani rawatan dengan Olumiant kerana ini mungkin gejala-gejala tuberkulosis.
- pernah mengalami jangkitan *herpes*

(penyakit kayap), kerana Olumiant mungkin menyebabkan penyakit ini berulang. Beritahu doktor anda jika anda mengalami ruam kulit berbisul yang sakit semasa menjalani rawatan dengan Olumiant kerana ini mungkin gejala-gejala penyakit kayap.

- sedang menghidapi, atau pernah menghidapi penyakit hepatitis B atau C.
- dijangka akan mengambil vaksin. Anda tidak patut diberi sesetengah jenis vaksin (hidup) semasa menggunakan Olumiant.
- menghidapi atau pernah menghidapi penyakit kanser, merokok atau pernah merokok pada masa lalu, kerana doktor anda akan berbincang dengan anda jika Olumiant sesuai untuk anda.
- mempunyai hati yang tidak berfungsi dengan baik.
- mempunyai, atau pernah mengalami, masalah jantung, kerana doktor anda akan berbincang dengan anda jika Olumiant sesuai untuk anda
- pernah mengalami bekuan darah di dalam salur darah kaki (*deep vein thrombosis*) atau paru-paru (*pulmonary embolism*), atau mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalaminya (contohnya: jika anda baru sahaja menjalani pembedahan besar, jika anda menggunakan kontraseptif hormon\ terapi penggantian hormon, atau jika anda atau saudara terdekat dikenal pasti mempunyai masalah dalam pembekuan darah). Doktor anda akan berbincang dengan anda jika Olumiant sesuai untuk anda. Beritahu doktor anda jika anda mengalami sesak nafas secara tiba-tiba atau kesukaran bernafas, sakit dada atau sakit di bahagian atas belakang, bengkak kaki atau lengan, sakit kaki atau kelemutan, atau kemerahan atau perubahan warna pada kaki atau lengan kerana ini mungkin tanda- tanda bekuan darah di dalam salur darah anda.
- pernah mengalami *diverticulitis* (sejenis radang usus besar) atau ulser pada perut atau usus.
- Kanser kulit bukan melanoma dapat diperhatikan pada pesakit

yang mengambil Olumiant. Doktor anda mungkin mengesyorkan agar anda menjalani pemeriksaan kulit secara berkala semasa mengambil Olumiant. Jika belur (*lesion*) kulit baru muncul semasa atau selepas terapi atau jika belur (*lesion*) sedia ada berubah rupa, beritahu doktor anda.

Anda mungkin memerlukan ujian darah sebelum anda mula mengambil Olumiant atau semasa anda sedang mengambilnya, untuk menguji sama ada anda mengalami bilangan sel darah merah yang kurang (*anaemia*), bilangan sel darah putih yang kurang (*neutropaenia* atau *lymphopaenia*), kandungan lemak darah (kolesterol) tinggi atau paras enzim hati yang tinggi, untuk memastikan bahawa rawatan dengan Olumiant tidak membawa sebarang masalah.

- Mengambil ubat-ubatan lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil, telah baru-baru ini mengambil atau mungkin akan mengambil sebarang ubat-ubatan lain.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Olumiant jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain seperti:

- *probenecid* (untuk penyakit gout), kerana ubat ini mungkin meningkatkan paras Olumiant di dalam darah anda. Jika anda sedang mengambil *probenecid*, dos Olumiant yang patut diambil adalah 2 mg sekali sehari.
- Ubat anti-reumatoid jenis suntikan.
- Suntikan ubat yang menekan sistem imun, termasuk terapi biologi (antibodi) yang disasarkan
- Ubat-ubatan yang digunakan untuk mengawal gerak balas imun, seperti *azathioprine*, *tacrolimus* atau *ciclosporin*.
- Ubat-ubatan yang tergolong dalam golongan ubat *Janus kinase inhibitors*.
- ubat-ubatan yang boleh meningkatkan risiko *diverticulitis* seperti ubat anti-radang bukan steroid (biasanya digunakan untuk mengubati kesakitan otot dan sendi dan /

OLUMIANT FILM-COATED TABLETS

Baricitinib (2 mg, 4 mg)

atau keradangan) dan / atau opioid (digunakan untuk merawat kesakitan yang teruk), dan / atau kortikosteroid (biasanya digunakan untuk merawat keadaan keradangan) (lihat **Kesan-kesan sampingan**).

- Ubat-ubatan untuk merawat kencing manis atau jika anda menghidap diabetes. Doktor anda mungkin memutuskan sama ada anda memerlukan kurang ubat anti-diabetik semasa mengambil Olumiant.

Cara menggunakan Olumiant

- Berapa banyak yang boleh digunakan

Rawatan harus dimulakan oleh seorang doktor yang berpengalaman dalam mendiagnos dan merawat keadaan anda. Anda harus sentiasa mengambil ubat ini seperti yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda tidak pasti.

Radang sendi reumatoid (rheumatoid arthritis), radang kulit (atopic dermatitis) dan Keguguran rambut yang teruk/ kebotakan (alopecia areata) bagi orang dewasa

Dos yang disyorkan adalah 4 mg sekali sehari. Doktor anda mungkin akan memberi dos yang lebih rendah iaitu 2 mg sekali sehari, terutamanya jika anda berumur melebihi 65 tahun atau jika anda berisiko tinggi untuk mengalami jangkitan, bekuan darah, masalah jantung (*major cardiovascular events*) atau kanser.

Jika ubat anda berkesan, doktor anda mungkin akan membuat cadangan untuk menurunkan dos anda.

Jika buah pinggang anda tidak berfungsi dengan baik, dos Olumiant yang disyorkan adalah 2 mg sekali sehari.

Penggunaan bagi kanak-kanak dan remaja

Dos yang disyorkan ialah 4 mg sekali sehari untuk pesakit ≥ 30 kg. Bagi pesakit 10 kg hingga <30 kg dos yang disyorkan ialah 2 mg sekali sehari.

Bagi kanak-kanak yang mempunyai

berat kurang daripada 30 kg dan mengambil penghalang OAT3 atau mengalami kegagalan buah pinggang sederhana, dos tidak sepatutnya melebihi 1 mg sekali sehari. Walau bagaimanapun, kerana kekuatan dos ini tidak tersedia, Olumiant tidak disyorkan untuk pesakit-pesakit ini.

Bagi pesakit kanak-kanak yang tidak dapat menelan keseluruhan tablet, tablet boleh dilarut di dalam air:

- Letakkan seluruh tablet dalam bekas dengan 5-10 mL air pada suhu bilik dan kacau perlahan-lahan untuk melarutkan (pecah) tablet. Ia mungkin mengambil masa sehingga 10 minit untuk tablet melarut menjadi larutan merah jambu pucat keruh. Sedikit bahan terampai mungkin terhasil.

- Selepas tablet larut, kacau perlahan-lahan sekali lagi dan kemudian telan larutan tersebut dengan serta-merta

- Bilas bekas dengan 5-10 mL air pada suhu bilik, dan telan campuran dengan segera untuk memastikan dos penuh diambil.

Hanya air harus digunakan untuk melarutkan tablet.

Selepas tablet larut di dalam air, ia boleh digunakan sehingga 4 jam jika disimpan pada suhu bilik.

Jika tablet larut di dalam air dan hanya sebahagian daripada dos yang terlarut diambil, tunggu sehingga hari berikutnya untuk mengambil dos yang dijadualkan seterusnya.

- Bila hendak menggunakannya
Olumiant adalah untuk kegunaan oral. Anda patut menelan tablet Olumiant anda dengan segelas air. Anda boleh mengambil tablet anda dengan atau tanpa makanan. Untuk membantu anda ingat mengambil Olumiant, anda mungkin boleh mengambilnya pada waktu yang sama setiap hari.

- Berapa lama untuk menggunakannya

Jangan berhenti mengambil Olumiant kecuali diberitahu oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakannya
Jika anda terlupa satu dos, ambil dos tersebut sebaik sahaja anda ingat.

Jika anda terlupa dos anda untuk satu hari, abaikan dos yang dilupa dan hanya ambil satu dos seperti biasa pada keesokan hari. Jangan menggandakan dos anda untuk menggantikan tablet yang dilupa.

- Jika anda menggunakan terlalu banyak (berlebihan)

Jika anda terlebih ambil Olumiant, hubungi doktor anda. Anda mungkin mengalami kesan-kesan sampingan yang disenaraikan di bahagian **Kesan-kesan sampingan**.

Semasa menggunakan Olumiant

- Perkara yang anda mesti lakukan

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai penggunaan ubat ini, tanya doktor, ahli farmasi atau jururawat anda.

- Perkara yang anda tidak boleh lakukan

Ubat ini telah diberi untuk anda sahaja. Jangan memberikannya kepada orang lain. Ianya mungkin membahayakan mereka, walaupun mereka mengalami tanda-tanda penyakit yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera
Olumiant tidak memberi sebarang kesan terhadap kebolehan anda memandu atau menggunakan jentera.

Darah beku

Olumiant boleh menyebabkan keadaan darah beku dibahagian kaki anda yang boleh bergerak ke paru-paru anda. Maklumkan kepada doktor anda dengan segera sekiranya anda mengalami gejala berikut:

- Bengkak atau sakit pada sebelah kaki
- Kehangatan atau kemerahan pada sebelah kaki
- Sesak nafas yang tidak dijangka
- Pernafasan laju
- Sakit dada

Kesan-kesan sampingan

Sekiranya anda mengalami kesan sampingan yang serius seperti berikut, anda perlu segera berjumpa doktor:

- mengi (berdehit atau bunyi nafas yang sempit)

OLUMIANT FILM-COATED TABLETS

Baricitinib (2 mg, 4 mg)

- pening teruk atau sakit kepala ringan
- bengkak bibir, lidah atau tekak
- gatal-gatal (gatal atau ruam kulit)
- sakit perut yang teruk terutamanya disertai demam, loya dan muntah.
- sakit dada atau sesak yang teruk (yang mungkin merebak ke lengan, rahang, leher, belakang)
- sesak nafas
- peluh sejuk
- kelemahan pada sebelah lengan dan/atau kaki
- percakapan yang tidak jelas

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan sampingan yang serius

Jangkitan seperti penyakit kayap dan radang paru-paru, yang mungkin menjejaskan sehingga 1 dalam 10 orang:

Beritahu doktor anda atau dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami gejala-gejala berikut yang mungkin merupakan tanda-tanda:

- penyakit kayap (*herpes zoster*): ruam kulit berbisul yang sakit dan demam (sangat jarang berlaku pada *atopic dermatitis* dan jarang berlaku pada *alopecia areata*)
- radang paru-paru: batuk berterusan, demam, sesak nafas, dan letih (ini jarang berlaku dalam *atopic dermatitis* dan *alopecia areata*)

Radang paru-paru dan penyakit kayap yang serius adalah jarang berlaku.

Kesan sampingan lain

Sangat kerap berlaku (mungkin menjejaskan lebih dari 1 dalam 10 orang):

- jangkitan tekak dan hidung
- paras lemak darah (kolesterol) tinggi yang dikesan melalui ujian darah

Kerap berlaku (mungkin menjejaskan sehingga 1 dalam 10

orang):

- lepuh sejuk (*herpes simplex*)
- jangkitan yang menyebabkan perut sakit atau cirit-birit (*gastroenteritis*)
- jangkitan saluran kencing
- bilangan platelet (sel yang terlibat dalam pembekuan darah) yang tinggi, yang dikesan melalui ujian darah (tidak kerap berlaku pada *atopic dermatitis* dan *alopecia areata*)
- sakit kepala
- perut tidak selesa (merasa loya, tidak kerap berlaku pada *atopic dermatitis*)
- sakit perut (jarang berlaku pada *alopecia areata*)
- paras enzim hati yang tinggi, yang dikesan melalui ujian darah (tidak kerap berlaku pada *atopic dermatitis*)
- ruam
- jerawat (tidak kerap berlaku pada *rheumatoid arthritis*)
- peningkatan enzim yang dipanggil *creatine kinase*, yang dikesan melalui ujian darah (tidak kerap berlaku pada *rheumatoid arthritis*)
- keradangan (bengkak) folikel rambut terutamanya di kawasan kulit kepala yang berkaitan dengan pertumbuhan semula rambut (diperhatikan dalam *alopecia areata*)

Jarang berlaku (mungkin menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang):

- bilangan sel darah putih (neutrofil) yang rendah, yang dikesan melalui ujian darah
- paras lemak darah (*triglycerides*) yang tinggi, yang dikesan melalui ujian darah
- tahap enzim hati yang tinggi, yang dikesan melalui ujian darah (ini biasa berlaku pada *alopecia areata*)
- peningkatan berat badan
- bengkak pada muka
- ruam gatal yang timbul akibat tindak balas alahan (*urticaria*)
- penyumbatan salur darah dalam paru-paru (*pulmonary embolism*)
- darah beku dalam saluran darah pada bahagian kaki atau pelvis yang dipanggil *deep vein*

thrombosis (DVT)

- diverticulitis (keradangan yang menyakitkan pada ruang kecil di lapisan usus anda)

Kanak-kanak dan remaja

- **Polyarticular juvenile idiopathic arthritis, enthesitis-related arthritis and juvenile psoriatic arthritis:** Dalam kajian ke atas kanak-kanak berumur 2 tahun dan ke atas yang menghadapi *polyarticular juvenile idiopathic arthritis*, *enthesitis related arthritis* dan *juvenile psoriatic arthritis*, sakit kepala adalah sangat kerap berlaku, bilangan sel darah putih rendah dan pembekuan darah dalam paru-paru adalah kerap berlaku (1 daripada setiap 82 kanak-kanak).

- **Paediatric atopic dermatitis:** Dalam kajian ke atas kanak-kanak berumur 2 tahun dan ke atas yang menghadapi *atopic dermatitis*, kesan sampingan adalah konsisten dengan yang dilihat pada pesakit dewasa dengan pengecualian kepada bilangan sel darah putih (neutrofil) yang rendah, yang lebih biasa berbanding orang dewasa.

Sekiranya anda mengalami sebarang kesan sampingan, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda. Ini termasuk mana-mana kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan apa-apa kesan sampingan atau kesan sampingan ubat-ubatan terus ke Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumer → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Olumiant

- Penyimpanan

Jauhi ubat ini daripada jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C.

Jangan menggunakan ubat ini selepas tarikh luput yang tertera pada lepuh dan kotak selepas EXP. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir pada bulan tersebut.

OLUMIANT FILM-COATED TABLETS

Baricitinib (2 mg, 4 mg)

- Pelupusan

Jangan buang sebarang ubat melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila bertanya kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Olumiant 2 mg film-coated tablets adalah tablet berwarna merah jambu cerah, 9 x 7.5 mm berbentuk bujur, dengan "Lilly" pada satu muka dan "2" pada muka yang bersebelahan.

Olumiant 4 mg film-coated tablets adalah tablet berwarna merah jambu sederhana, 8.5 mm berbentuk bulat, dengan "Lilly" pada satu muka dan "4" pada muka yang bersebelahan.

Tablet-tablet tersebut berbentuk bulat dan mempunyai bahagian sisi cembung (lekuk) untuk memudahkan anda mengambilnya.

Olumiant 2 mg dan 4 mg boleh didapati dalam saiz pek 1 x 7 dan 4 x 7 tablet dalam lepuh unit dos bertebuk. Bukan semua saiz pek dipasarkan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif ialah baricitinib.

- Olumiant 2 mg film-coated tablets: Setiap biji tablet mengandungi 2 miligram baricitinib.
- Olumiant 4 mg film-coated tablets: Setiap biji tablet mengandungi 4 miligram baricitinib.

- Bahan tidak aktif

Bahan-bahan lain adalah *microcrystalline cellulose*, *croscarmellose sodium*, (lihat "Kandungan natrium Olumiant") *magnesium stearate*, *mannitol*, *iron oxide red (E172)*, *lecithin (soya) (E322)*, *macrogol*, *poly (vinyl alcohol)*, *talc* dan *titanium dioxide (E171)*.

Kandungan natrium dalam Olumiant
Ubat ini mengandungi natrium

kurang dari 1 mmol (23 mg) setiap tablet, iaitu secara asasnya "bebas natrium".

- Nombor MAL

Olumiant 2 mg film-coated tablets –
MAL18086128ARZ

Olumiant 4 mg film-coated tablets –
MAL18086127ARZ

Pengilang

Lilly del Caribe, Inc.

12.6 KM 65th Infantry Road (PR01)
Carolina, Puerto Rico (PR) 00985
USA

Pemegang Pendaftaran Produk

Zuellig Pharma Sdn Bhd

No. 15 Persiaran Pasak Bumi,
Seksyen U8, Perindustrian Bukit
Jelutong, 40150 Shah Alam, Selangor,
Malaysia

Tarikh Kemaskini RiMUP

09/07/2025

Nombor Siri

NPRA (R1/AI5)17032025/006

NPRA (R1/7) 19122023/213