

CABOMETYX™ Film-coated Tablets

Cabozantinib (20mg, 40mg, 60mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan CABOMETYX
2. Bagaimana CABOMETYX berfungsi
3. Sebelum menggunakan CABOMETYX
4. Cara menggunakan CABOMETYX
5. Semasa menggunakan CABOMETYX
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan CABOMETYX
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan CABOMETYX

CABOMETYX adalah sejenis ubat barah yang mengandungi cabozantinib sebagai bahan aktif.

Ia digunakan pada orang dewasa untuk merawat:

- peringkat lanjutan jenis barah buah pinggang dikenali sebagai karsinoma sel ginjal
- barah hati apabila ubat antikanker (sorafenib) tidak lagi menghentikan penyakit daripada merebak.

CABOMETYX juga digunakan untuk merawat kanser tiroid (*locally advanced or metastatic differentiated thyroid cancer*), sejenis kanser dalam kelenjar tiroid, yang berlaku pada orang dewasa apabila rawatan iodin radioaktif dan ubat antikanser tidak lagi menghalang perkembangan penyakit.

CABOMETYX boleh diberikan bersama dengan nivolumab untuk barah buah pinggang (*advance kidney cancer*). Adalah penting untuk anda turut membaca risalah pakej nivolumab. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai ubat-ubatan ini, sila tanya doktor anda.

Bagaimana CABOMETYX berfungsi

CABOMETYX menghalang tindakan protein yang dipanggil kawasan tyrosine kinases (RTKs), yang terlibat dalam pertumbuhan sel-sel dan pembangunan saluran darah baru yang membekalkan mereka. Protein ini boleh hadir dalam

jumlah yang tinggi dalam sel-sel barah dan menghalang tindakan mereka.

Ubat ini boleh melambatkan kadar pembesaran kanser dan membantu untuk memotong bekalan darah yang diperlukan oleh kanser.

Sebelum menggunakan CABOMETYX

Bila tidak boleh menggunakan

Jika anda mempunyai alahan kepada cabozantinib atau mana-mana bahan-bahan lain daripada ubat ini (disenaraikan dibawah Bahan-bahan kandungan).

Kehamilan dan Penyusuan anak

Elakkan hamil semasa dirawat dengan CABOMETYX. Jika anda atau pasangan anda boleh hamil, menggunakan pencegah kehamilan yang mencukupi semasa rawatan dan sekurang-kurangnya 4 bulan selepas rawatan telah selesai. Berbincang dengan doktor anda mengenai kaedah pencegah kehamilan yang sesuai semasa anda mengambil ubat ini.

Beritahu doktor jika anda atau pasangan anda mengandung atau merancang untuk hamil semasa anda dirawat dengan ubat ini.

Berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini Jika anda atau pasangan anda akan mempertimbangkan atau merancang untuk mempunyai bayi selepas rawatan anda selesai. Ada kemungkinan kesuburan anda boleh terjejas oleh rawatan dengan ubat ini.

Wanita yang mengambil ubat ini tidak boleh menyusu semasa rawatan dan sekurang-kurangnya 4 bulan selepas rawatan selesai, cabozantinib dan/atau *metabolites* akan wujud dalam susu badan dan berbahaya kepada anak anda.

Sekiranya anda mengambil CABOMETYX semasa mengambil pil pencegah hamil, pil pencegah hamil mungkin tidak berkesan. Anda juga harus menggunakan cara pencegahan hamil yang lain (seperti kondom atau diafragma) semasa mengambil CABOMETYX dan sekurang-kurangnya 4 bulan setelah rawatan selesai.

- Sebelum mula menggunakan CABOMETYX

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil CABOMETYX jika anda:

- mempunyai tekanan darah tinggi
- sedang atau pernah mengalami aneurisma (pembesaran dan kelemahan dinding pembuluh darah) atau koyakan pada dinding saluran darah
- mengalami cirit-birit
- mengalami pendarahan ketara baru-baru ini
- mempunyai pembedahan dalam bulan lepas (atau jika prosedur pembedahan dirancang), termasuk pembedahan pergigian
- menghidap penyakit radang usus (untuk contoh, Crohn's penyakit atau kolitis ulser, diverticulitis atau apendisitis)
- mempunyai sejarah darah beku di kaki, strok atau serangan jantung
- mengalami kegagalan jantung (boleh termasuk gejala seperti sesak nafas, rasa letih, pengsan, bengkak pada buku lali dan kaki)
- mempunyai masalah tiroid. Fungsi tiroid anda harus diperiksa sebelum anda mengambil ubat ini dan diperiksa secara kerap semasa anda mengambilnya. Beritahu doktor anda jika anda cepat merasa letih, biasanya berasa lebih sejuk daripada orang lain, atau suara anda semakin mendalam semasa mengambil ubat ini. Sekiranya kelenjar tiroid anda tidak menghasilkan hormon tiroid yang mencukupi, anda mungkin perlu dirawat dengan penggantian hormon tiroid.
- menghidap penyakit hati atau buah pinggang.

Beritahu doktor anda jika ini memberi kesan kepada anda.

Anda mungkin memerlukan rawatan untuk penyakit yang disenaraikan, atau doktor anda boleh memutuskan untuk mengubah dos CABOMETYX anda, atau berhenti rawatan sama sekali. Lihat juga Kesan-kesan sampingan.

Kanak-kanak dan remaja

CABOMETYX tidak disyorkan untuk kanak-kanak atau remaja. Kesan ubat ini

pada orang yang lebih muda daripada umur 18 tahun tidak diketahui.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau telah mengambil mana-mana lain-lain ubat-ubatan, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi. Ini adalah kerana CABOMETYX boleh mempengaruhi cara bekerja beberapa ubat-ubatan lain. Selain itu, sesetengah ubat boleh mempengaruhi efikasi CABOMETYX. Ini boleh bermakna bahawa doktor perlu mengubah dos yang anda ambil.

Anda perlu memberitahu doktor anda tentang setiap ubat yang diambil, tetapi khususnya jika anda mengambil:

- * Ubat-ubatan yang merawat jangkitan kulat, itraconazole, ketoconazole dan posaconazole
- * Ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat jangkitan bakteria (antibiotik) seperti erythromycin, clarithromycin dan rifampicin
- * Ubat-ubatan bagi alahan/alergi seperti fexofenadine
- * Ubat-ubatan untuk merawat angina pectoris (sakit dada kerana bekalan ke jantung yang tidak mencukupi) seperti ranolazine
- * Ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat epilepsi atau sawan seperti phenytoin, carbamazepine dan phenobarbital
- * Persediaan herba yang mengandungi St. John's Wort (*Hypericum perforatum*), kadang-kadang digunakan untuk merawat kemurungan atau syarat-syarat berkaitan dengan kemurungan keresahan
- * Ubat-ubatan yang digunakan untuk nipis dalam darah seperti warfarin dan dabigatran etexilate
- * Ubat-ubatan untuk merawat tekanan darah tinggi atau lain-lain keadaan jantung seperti aliskiren, ambrisentan, dabigatran etexilate, digoxin, talinolol dan tolvaptan
- * Ubat untuk kencing manis, seperti saxagliptin dan sitagliptin
- * Ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat gout, seperti colchicine
- * Ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat HIV atau AIDS, seperti

efavirenz, ritonavir, maraviroc dan emtricitabine

- * Ubat-ubatan yang digunakan untuk mencegah pemindahan penolakan (ciclosporin) dan berasaskan ciclosporin sembuh artritis reumatoid dan psoriasis

Cara menggunakan CABOMETYX

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

CABOMETYX perlu diambil sekali sehari. Dos yang biasa adalah 60 mg, namun doktor akan menentukan dos yang sesuai untuk anda.

Apabila ubat ini diberikan bersama dengan nivolumab untuk rawatan barah ginjal (*advanced kidney cancer*), dos CABOMETYX yang disyorkan adalah 40 mg sekali sehari.

- Berapa lama perlu digunakan

Anda perlu terus mengambil ubat ini sehingga doktor memutuskan untuk menghentikan rawatan anda. Jika anda mendapat kesan sampingan yang serius, doktor anda boleh memutuskan untuk menukar dos anda atau berhenti rawatan lebih awal daripada asalnya dirancang. Doktor anda akan memberitahu anda jika anda memerlukan dos anda diselaraskan.

- Jika terlupa menggunakan

Jika masih terdapat 12 jam atau lebih sebelum anda dos seterusnya, mengambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Mengambil dos seterusnya yang pada masa biasa.

Jika dos seterusnya anda adalah disebabkan oleh kurang daripada 12 jam, mengambil dos yang telah terlepas. Mengambil dos seterusnya anda pada masa yang biasa.

- Jika anda berhenti menggunakan CABOMETYX

Menghentikan rawatan anda boleh menghentikan kesan ubat. Jangan hentikan rawatan dengan ubat ini melainkan anda telah berbincang dengan doktor anda.

Apabila ubat ini diberikan bersama dengan nivolumab, pertama anda akan diberi nivolumab diikuti oleh CABOMETYX.

Sila rujuk risalah pakej nivolumab untuk memahami penggunaan ubat ini. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lebih lanjut mengenai penggunaan ubat ini, tanyakan kepada doktor anda.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika anda telah CABOMETYX lebih banyak daripada apa yang anda telah diarahkan, berbincang dengan doktor atau pergi ke hospital dengan tablet dan risalah ini serta-merta.

Semasa menggunakan CABOMETYX

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil CABOMETYX.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

CABOMETYX **tidak** boleh diambil dengan makanan. Anda tidak boleh makan apa-apa untuk sekurang-kurangnya 2 jam sebelum dan 1 jam selepas mengambil ubat tersebut. Menelan tablet dengan segelas air. Jangan menghancurkan tablet.

Elakkan makan limau gedang atau produk yang mengandungi limau gedang untuk seberapa lama yang anda sedang menggunakan ubat ini, kerana mereka boleh meningkatkan tahap CABOMETYX dalam darah.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan mesin semasa mengambil

ubat ini. Rawatan dengan CABOMETYX boleh membuat anda merasa letih dan lemah dan boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin.

CABOMETYX mengandungi laktosa

Ubat ini mengandungi laktosa (sejenis gula). Jika anda telah diberitahu oleh doktor bahawa anda tidak bertoleransi kepada jenis gula ini, bercakap dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

CABOMETYX mengandungi sodium

Ubat ini mengandungi natrium kurang dari 1 mmol (23 mg) per tablet, yang bermaksud "bebas natrium".

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, CABOMETYX boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Jika anda mendapat kesan sampingan, doktor mungkin memberitahu anda untuk mengambil CABOMETYX pada dos yang lebih rendah. Doktor anda juga boleh menetapkan ubat-ubatan lain untuk membantu mengawal kesan sampingan anda.

Beritahu doktor anda serta-merta jika anda mendapati mana-mana kesan sampingan berikut – anda mungkin memerlukan rawatan perubatan yang segera:

- Simptom seperti sakit abdomen, loya (rasa sakit), muntah, sembelit, atau demam. Ini mungkin tanda-tanda gastrousus berlubang, satu lubang yang berkembang dalam perut atau usus yang boleh mengancam nyawa anda.
- Muntah darah, najis hitam, kencing berdarah, sakit kepala, batuk darah.
- Bengkak, sakit di tangan dan kaki, atau sesak nafas.
- Luka yang tidak sembuh.
- Sawan, sakit kepala, kekeliruan atau mendapati sukar untuk menumpukan perhatian. Ini mungkin tanda-tanda mengalami keadaan yang dipanggil *posterior reversible encephalopathy syndrome* (PRES). PRES adalah jarang berlaku (ia menjejaskan kurang daripada 1 dalam 1000 orang).
- Rasa lemah, keliru atau hilang kesedaran. Ini mungkin disebabkan oleh masalah hati.

- Sakit di mulut, gigi dan / atau rahang, bengkak atau luka di dalam mulut, kebas atau rasa berat pada rahang, atau gigi menjadi longgar. Ini menjadi tanda kerosakan tulang pada rahang (*osteonecrosis*).

Kesan-kesan sampingan lain termasuk: Kesan-kesan sampingan yang sangat biasa (mungkin menjejaskan lebih daripada 1 dalam setiap 10 orang)

- Cirit-birit, loya, muntah, sembelit, senak, sakit perut,
- Lepuh, sakit tangan atau tapak kaki, ruam atau kemerahan kulit
- Selera makan berkurangan, penurunan berat badan, berubah deria rasa
- Keletihan, lemah, sakit kepala, pening
- Tekanan darah tinggi
- Anemia (kandungan sel darah merah rendah)
- Kandungan platelet rendah
- Kemerahan, bengkak atau sakit di dalam mulut atau tekak, kesukaran dalam bertutur, serak, batuk
- Perubahan dalam ujian darah yang digunakan untuk memantau kesihatan dan fungsi organ-organ anda (termasuk hati dan buah pinggang), tahap rendah elektrolit (seperti magnesium, atau kalium)
- Sesak nafas
- Pengurangan aktiviti tiroid; gejala-gejala boleh termasuk: keletihan, kenaikan berat badan, sembelit, rasa sejuk dan kulit kering
- Bengkak di kaki dan tangan anda
- Sakit di lengan, tangan, betis atau kaki
- Kandungan albumin dalam darah rendah

Kesan-kesan sampingan yang biasa (boleh menjejaskan sehingga kepada 1 dalam setiap 10 orang)

- Nanah (pengumpulan nanah, bengkak dan keradangan)
- Dehidrasi
- Kesukaran menelan
- Deringan/dengung di telinga
- Pembekuan darah dalam salur darah dan paru-paru
- Kandungan sel-sel darah putih rendah
- Paras glukosa darah meningkat atau menurun

- Pengurangan dalam tahap; kalsium, sodium dan fosfat dalam darah
- Peningkatan dalam tahap kalium dalam darah
- Meningkatkan paras bilirubin di dalam darah (yang boleh menyebabkan Jaundis/kuning kulit atau mata)
- Peningkatan dalam tahap amylase dalam darah
- Peningkatan dalam tahap lipase di dalam darah
- Peningkatan paras kolesterol atau *triglyceride* dalam darah
- Kebas, kesemutan, pembakaran sensasi atau sakit di anggota badan yang
- Radang pankreas
- Tisu terkoyak yang menyakitkan atau sambungan tisu tidak normal di dalam badan anda
- Penyakit *Gastro-oesophageal reflux disease* (membawa sehingga asid dalam perut)
- Buasir
- Mulut kering dan sakit di dalam mulut
- Rasa mengantuk, keliru atau hilang kesedaran kerana masalah hati
- Kulit kering, kegatalan kulit yang teruk, jerawat
- Penebalan lapisan luar kulit
- *Alopecia* (keguguran rambut dan penipisan), perubahan warna rambut
- Sakit di sendi, kekejangan otot
- Protein dalam air kencing (dikesan melalui ujian)
- Rasa terbakar atau menyengat pada lidah
- Komplikasi luka
- Jangkitan paru-paru (pneumonia)

Kesan-kesan sampingan yang jarang (mungkin menjejaskan 1 dalam 100 orang)

- Angin ahmar
- Sawan
- Tekanan darah tinggi yang teruk
- Mengurangkan aliran hempedu dari hati
- Kerosakan tulang di dalam rahang
- Kegagalan jantung (boleh termasuk gejala seperti sesak nafas, berasa letih, pengsan, bengkak pada buku lali dan kaki)

- Clot/embolus yang bergerak melalui arteri anda dan tersekat
- Paru-paru runtuh dengan udara terperangkap di ruang antara paru-paru dan dada, yang sering menyebabkan sesak nafas (pneumotoraks)

Tidak diketahui (bilangan orang-orang yang terjejas tidak diketahui)

- Serangan jantung
- pembesaran dan kelemahan dinding pembuluh darah atau koyakan pada dinding saluran darah (*aneurysms atau artery dissections*)

Kesan sampingan berikut telah dilaporkan bagi **CABOMETYX yang diambil bersama nivolumab**:

Kesan sampingan yang sangat biasa (boleh mempengaruhi lebih daripada 1 dari 10 orang)

- Jangkitan saluran pernafasan atas
- Pengurangan aktiviti tiroid; simptom boleh merangkumi keletihan, kenaikan berat badan, sembelit, kulit sejuk dan kering
- Peningkatan aktiviti tiroid; gejala boleh merangkumi degupan jantung yang cepat, berpeluh dan penurunan berat badan
- Kurang selera makan, deria rasa berubah
- Sakit kepala, pening
- Tekanan darah tinggi (hipertensi)
- Kesukaran bercakap, suara serak (disfonia), batuk dan sesak nafas
- Sakit perut, termasuk cirit-birit, mual, muntah, senak, sakit perut dan sembelit
- Kemerahan, bengkak atau sakit di mulut atau tekak (stomatitis)
- Ruam kulit kadang-kadang dengan lepuh (*blisters*), gatal-gatal, sakit pada tangan atau tapak kaki, ruam atau kemerahan pada kulit
- Sakit pada sendi (*arthralgia*), kekejangan otot, kelemahan otot dan otot yang sakit
- Protein dalam air kencing (didapati melalui ujian)
- Rasa letih atau lemah, demam dan edema (bengkak)

- Ujian fungsi hati tidak normal (peningkatan enzim hati seperti aspartat aminotransferase, alanin aminotransferase atau alkali fosfatase dalam darah, tahap bilirubin yang tinggi dalam darah)
- Ujian fungsi buah pinggang tidak normal (peningkatan paras kreatinin dalam darah)
- Tahap gula dalam darah tinggi (hiperglisemia) atau rendah (hipoglisemia)
- Anemia (paras sel darah merah yang rendah yang membawa oksigen), paras sel darah putih yang rendah (penting untuk melawan jangkitan), paras platelet yang rendah (sel yang membantu pembekuan darah)
- Peningkatan paras enzim yang memecahkan lemak (lipase) dan enzim yang memecahkan kanji (amilase)
- Pengurangan jumlah fosfat
- Peningkatan atau penurunan jumlah kalium
- Penurunan atau peningkatan paras kalsium, magnesium atau natrium dalam darah
- Penurunan berat badan

Kesan sampingan yang biasa (boleh mempengaruhi sehingga 1 dari 10 orang)

- Jangkitan paru-paru yang serius (radang paru-paru)
- Peningkatan beberapa sel darah putih yang disebut eosinofil
- Tindak balas alergi (termasuk reaksi anafilaksis)
- Penurunan rembesan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal (kelenjar yang terletak di atas buah pinggang)
- Dehidrasi (kekurangan air)
- Keradangan saraf (menyebabkan kebas, kelemahan, kesemutan atau rasa sakit pada lengan dan kaki)
- Deringan/dengung di telinga (tinnitus)
- Mata kering dan penglihatan kabur
- Perubahan irama atau kadar degupan jantung, degupan jantung yang cepat
- Pembekuan darah di saluran darah

- Keradangan paru-paru (pneumonitis, ditandai dengan batuk dan kesukaran bernafas), pembekuan darah di paru-paru, cairan di sekitar paru-paru
- Hidung berdarah
- Keradangan usus besar (kolitis), mulut kering, sakit di mulut, radang perut (gastritis) dan buasir
- Keradangan hati (hepatitis)
- Kulit kering dan gatal-gatal pada kulit yang teruk
- *Alopecia* (keguguran dan penipisan rambut), perubahan warna rambut
- Keradangan pada sendi (arthritis)
- Kegagalan buah pinggang (termasuk kehilangan fungsi ginjal secara tiba-tiba)
- Rasa sakit, sakit dada
- Peningkatan tahap trigliserida dalam darah
- Peningkatan tahap kolesterol dalam darah

Kesan sampingan yang jarang (boleh mempengaruhi 1 dari 100 orang)

- Reaksi alergi yang berkaitan dengan kemasukan ubat nivolumab
- Keradangan kelenjar pituitari yang terletak di pangkal otak (*hypophysitis*), pembengkakan kelenjar tiroid (*thyroiditis*)
- Keradangan saraf sementara yang menyebabkan kesakitan, kelemahan dan kelumpuhan di bahagian tangan dan kaki (sindrom Guillain Barré); kelemahan otot dan keletihan tanpa kemerosotan (sindrom myasthenic)
- Keradangan otak
- Keradangan mata (yang menyebabkan kesakitan dan kemerahan)
- Keradangan otot jantung
- Darah beku/embolus yang bergerak melalui arteri anda dan tersekat
- Keradangan pankreas (pankreatitis), kebocoran usus, rasa terbakar atau menyakitkan di lidah (*glossodynia*)
- Penyakit kulit dengan tompok kulit merah yang menebal,

sering dengan sisik keperakan (*psoriasis*)

- Gatal-gatal (ruam gatal)
- Kelembutan otot yang lemah, bukan disebabkan oleh senaman (miopati), kerosakan tulang di rahang, koyakan yang menyakitkan atau sambungan tisu yang tidak normal di dalam badan anda (fistula)
- Keradangan buah pinggang
- Paru-paru runtuh dengan udara terperangkap di ruang antara paru-paru dan dada, yang sering menyebabkan sesak nafas (pneumotoraks)

Tidak diketahui (peratusan individu yang terjejas tidak diketahui)

* Radang salur darah di kulit (vaskulitis kutaneus)

* Pemusnahan progresif dan kehilangan duktus hempedu intrahepatik serta penyakit kuning (jaundis)

Perubahan dalam keputusan ujian

CABOMETYX yang diambil bersama dengan nivolumab boleh menyebabkan perubahan dalam keputusan ujian yang dilakukan oleh doktor anda. Ini termasuk:

- Ujian fungsi hati yang tidak normal (peningkatan jumlah enzim hati aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase atau alkali fosfatase dalam darah anda, kadar bahan buangan bilirubin yang lebih tinggi dalam darah)
- Ujian fungsi buah pinggang yang tidak normal (peningkatan jumlah kreatinin dalam darah anda)
- Kandungan gula yang tinggi (hiperglikemia) atau rendah (hipoglikemia) dalam darah
- Penurunan jumlah sel darah merah (yang membawa oksigen), sel darah putih (yang penting dalam memerangi jangkitan) atau platelet (sel yang membantu darah membeku)
- Peningkatan kandungan enzim yang memecah lemak dan enzim yang memecah kanji
- Penurunan kadar fosfat
- Peningkatan atau penurunan jumlah kalsium atau kalium
- Peningkatan atau penurunan kadar magnesium atau natrium dalam darah
- Peningkatan kadar magnesium dalam darah

- Penurunan berat badan
- Peningkatan kadar trigliserida dalam darah
- Peningkatan kadar kolesterol dalam darah

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan CABOMETYX

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Jangan gunakan ubat ini selepas tamat tempoh yang dinyatakan di label botol dan kadbod. Tarikh tamat tempoh merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

Produk ubat-ubatan ini tidak memerlukan apa-apa syarat khas penyimpanan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

- CABOMETYX 20 mg tablet bersalut filem adalah kuning, bulat tanpa skor, dan dikenali dengan "XL" pada satu sisi dan "20" di sisi lain.

- CABOMETYX 40 mg tablet bersalut filem adalah berwarna kuning, berbentuk segi tiga tanpa skor, dan dikaitkan dengan "XL" pada satu sisi dan "40" di sisi lain.

- CABOMETYX 60 mg tablet bersalut filem adalah berwarna kuning, berbentuk bujur tanpa skor, dan dikaitkan dengan "XL" pada satu sisi dan "60" di sisi lain.

Tablet CABOMETYX boleh didapati dalam pek yang mengandungi satu botol plastik dengan 30 tablet (*film-coated tablet*). Botol ini juga mengandungi 3 bekas gel silika sebagai bahan pengering. Simpan bekas-bekas gel silika di dalam botol dan jangan makan bahan tersebut.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Bahan aktif ini adalah cabozantinib (S)-malate.

CABOMETYX 20 mg filem-tablet bersalut: setiap tablet mengandungi cabozantinib (S)-malate bersamaan 20 mg cabozantinib.

CABOMETYX 40 mg tablet bersalut filem: setiap tablet mengandungi cabozantinib (S)-malate bersamaan 40 mg cabozantinib.

CABOMETYX 60 mg tablet bersalut filem: setiap tablet mengandungi cabozantinib (S)-malate bersamaan 60 mg cabozantinib.

- Bahan tidak aktif

Tablet contents: *microcrystalline cellulose, lactose anhydrous, hydroxypropyl cellulose, croscarmellose sodium, colloidal silicon dioxide anhydrous, magnesium stearate.* (lihat bahagian "Semasa menggunakan CABOMETYX" untuk kandungan laktosa)

Film coating: *hypromellose, titanium dioxide (E171), triacetin, iron oxide yellow (E172)*

- Nombor MAL

CABOMETYX 20mg film-coated tablets
MAL21046002ACRZ

CABOMETYX 40mg film-coated tablets
MAL21046003ACRZ

CABOMETYX 60mg film-coated tablets
MAL21046004ACRZ

Pengilang

Patheon Inc
2100 Syntex Court,
Mississauga, ON L5N 7K9
Canada

Pemegang Pendaftaran Produk

Zuellig Pharma Sdn Bhd
No.15, Persiaran Pasak Bumi,
Seksyen U8, Perindustrian Bukit Jelutong
40150, Shah Alam, Selangor,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

09/03/2026

Nombor Siri

NPRA (R1/A12) 08032023/007