

METHYCOBAL® TABLET 0.5MG

Mecobalamin (0.5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Methycobal*®
2. Bagaimana *Methycobal*® berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Methycobal*®
4. Cara menggunakan *Methycobal*®
5. Semasa menggunakan *Methycobal*®
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Methycobal*®
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Methycobal*®
Methycobal® digunakan untuk merawat neuropati periferai (merujuk kepada keadaan yang berlaku apabila saraf yang membawa mesej ke dan dari otak dan saraf tunjang dari dan ke seluruh badan rosak atau berpenyakit).

Bagaimana *Methycobal*® berfungsi
Methycobal® adalah sejenis koenzim B12 yang didapati secara semula jadi di dalam tubuh kita. Ia diangkut ke sel-sel saraf dan menggalakkan pengeluaran asid nukleik, protein dan fosfolipid. *Methycobal*® menormalkan fungsi sistem saraf untuk mengekalkan sistem saraf yang sihat.

Sebelum menggunakan *Methycobal*®

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan *Methylcobal* sekiranya anda mempunyai alahan kepada mecobalamin atau kandungan lain di dalam ubat ini.

Mecobalamin mengandungi kobalt dan boleh menyebabkan tindak balas sensitiviti pada individu yang mempunyai alahan kobalt.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil *Methycobal*® jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil *Methycobal*® jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum menggunakan *Methycobal*®

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mula menggunakan ubat ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan *Methycobal*®

- Berapa banyak harus digunakan

Dos biasa untuk orang dewasa ialah 1 tablet 3 kali sehari.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Guna selagi diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Berhenti mengambil *Methycobal*® sekiranya tiada kesan selepas penggunaan yang berpanjangan (berbulan).

Penggunaan *Methycobal*® secara berpanjangan pada dos yang tinggi tidak digalakkan untuk pekerja yang mengendalikan merkuri atau sebatianannya.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan *Methycobal*®

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *Methycobal*®.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat

baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Pastikan *Methycobal*® dikeluarkan dari pakejnya sebelum digunakan untuk mengelakkan diri daripada menelan lembaran pembungkusan lepuh.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Methycobal*® boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Gejala seperti tiada selera makan, loya atau cirit-birit mungkin muncul. Ruam kulit jarang berlaku.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan *Methycobal*®

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C.

Lindungi dari kelembapan dan cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Methycobal® adalah tablet putih bersalut gula

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
- Mecobalamin

METHYCOBAL[®] TABLET 0.5MG

Mecobalamin (0.5mg)

- Bahan tidak aktif

- *Carnauba wax*
- *Microcrystalline cellulose*
- *Titanium oxide*
- *Stearic acid*
- *Calcium stearate*
- *Sucrose*
- *Talc*
- *Precipitated calcium carbonate*
- *Corn starch*
- *Lactose hydrate*
- *White shellac*
- *Hydroxypropylcellulose*
- *Pullulan*
- *Povidone*
- *Macrogol 6000*
- *Hydrated silicon dioxide*

Nombor MAL

MAL19910799XC

MAL19970954XCR

Pengilang

Bushu Pharmaceuticals Ltd. Misato factory
950, Hiroki, Ohaza, Misato-machi,
Kodama-gun, Saitama-ken, Japan

Pemegang Pendaftaran Produk

Eisai (Malaysia) Sdn Bhd
Unit 701D, Level 7, Tower D, Uptown 5,
No. 5, Jalan SS21/39, Damansara Uptown,
47400 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

18/6/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)110719/00185
