

※2005年7月改訂（第7版 薬事法改正に伴う改訂を含む）
※ 2005年1月改訂

日本標準商品分類番号
873311

※処方せん医薬品：注意—医師等の処方
せんにより使
用すること

日本薬局方 生理食塩液

生食MP
Isotonic Sodium Chloride Solution MP

貯 法：室温保存
使用期限：3年
（外箱・容器に表示の使用期限内に
使用すること）
注 意：取扱い上の注意の項参照

	20mL	100mL	250・500mL	500mL（開栓）
承認番号	20500AMY00339			
薬価収載	1994年7月	1994年7月	1999年2月	1999年2月
販売開始	1994年7月	1995年7月	1999年7月	1999年9月

【組成・性状】

本剤は100mL中に日局 塩化ナトリウム0.9gを含有する。

性 状	無色澄明の液で、弱い塩味がある。	
pH	4.5～8.0	
電解質組成 (mEq/L)	Na ⁺	Cl ⁻
	154	154

【効能・効果】

注 射：細胞外液欠乏時、ナトリウム欠乏時、クロール
欠乏時、注射剤の溶解希釈剤
外 用：皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布、含そう・噴

(2) 投与前：

- 1) 投与に際しては、感染に対する配慮をすること。
（患者の皮膚や器具消毒）
- 2) 寒冷期には体温程度に温めて使用すること。
- 3) 開封後直ちに使用し、残液は決して使用しないこと。

(3) 投与時：ゆっくり静脈内に投与すること。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：〔日局〕塩化ナトリウム（Sodium Chloride）
分子式：NaCl
分子量：58.44

霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進
その他：医療用器具の洗浄

【用法・用量】

注 射：(1)通常20～1000mLを皮下、静脈内注射または
点滴静注する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
(2)適量を取り注射用医薬品の希釈、溶解に用
いる。

末で、においはなく、味は塩辛い。
本品は水に溶けやすく、エタノール(95)に極め
て溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶
けない。

【取扱い上の注意】

1. 20mLの場合の注意：
アンプルカットの手順
(1)アンプルの結合部分を (2)頭部を回転させて切

外 用：皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布、含そう・噴

3. 包装内に水滴が認められるものや内容液が着色または混濁しているものは使用しないこと。
4. 容器の目盛はおよその目安として使用すること。

【包装】

20mL：100管（プラスチック容器）
100mL：10瓶（プラスチック容器）
250mL：20瓶（プラスチック容器）
500mL：20瓶（プラスチック容器）
20本（プラスチック容器開栓型）

※※【文献請求先】

メルク・ホエイ株式会社 開発部 安全管理課
〒541-0053 大阪市中央区本町2丁目6番8号

※※【学術情報に関するお問い合わせ先】

メルク・ホエイ株式会社 営業部 学術課
東京 03-60 22 5218 大阪 03-60 22 6700

(9:00～18:00／土日祝日を除く)