

NEUROMETHYN CAPSULE

Mecobalamin (500mcg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Neuromethyn
2. Bagaimana Neuromethyn berfungsi
3. Sebelum mengambil Neuromethyn
4. Cara mengambil Neuromethyn
5. Semasa mengambil Neuromethyn
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Neuromethyn
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Neuromethyn

Neuromethyn digunakan untuk merawat kerosakan saraf dan anemia (sel darah merah rendah) yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B12.

Bagaimana Neuromethyn berfungsi

Neuromethyn mengandungi mecobalamin (vitamin B12) sebagai bahan aktif. Ia berfungsi memulihkan dan melindungi saraf serta membantu mengurangkan kesakitan akibat kerosakan saraf. Ia juga membantu meningkatkan pengeluaran sel darah merah.

Sebelum mengambil Neuromethyn

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda alah kepada mecobalamin, kobalt atau bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

- Sebelum mengambil

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Sila maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika pekerjaan anda melibatkan pengendalian merkuri atau sebatianannya.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara mengambil Neuromethyn

- Berapa banyak harus ambil

Ambil 1 kapsul tiga kali sehari.

- Bila perlu ambil

Ambil 3 kali sehari atau seperti arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu ambil

Ambil Neuromethyn selagi mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa mengambil

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa mengambil Neuromethyn

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda betul-betul seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Maklumkan kepada doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Neuromethyn.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti dari mengambil ubat ini kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan ambil sebarang ubat baharu tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Neuromethyn kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda tidak merasakan atau melihat sebarang perubahan dalam keadaan anda selepas beberapa bulan mengambil ubat ini, sila berjumpa dengan doktor anda sekali lagi.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Neuromethyn boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Gejala seperti masalah pemakanan, loya atau cirit-birit mungkin berlaku. Selain itu, kesan seperti ruam kulit juga boleh terjadi (jarang).

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Neuromethyn

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C.

Lindungi dari kelembapan dan cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

NEUROMETHYN CAPSULE

Mecobalamin (500mcg)

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Kapsul Neuromethyn berwarna merah.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Mecobalamin

Bahan tidak aktif

Lactose, silicone dioxide, magnesium stearate

- Nombor MAL

MAL19988462X

Pengilang

Sam Chun Dang Pharm. Co. Ltd.

71, Jeyakgongdan 2-gil,

Hyangnam-eup,

Hwaseong-si Gyeonggi-do

South Korea

Pemegang Pendaftaran Produk

The Zymas Medical Co.

No. 15, Jalan Mega 1/5

Taman Perindustrian Nusa Cemerlang

79200 Iskandar Puteri, Johor

Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

30/10/2024

Nombor siri

NPRA(R4/1)301024/00120