

PEPTAZOL 40 – Enteric coated tablets

Pantoprazole 40 mg

CONSUMER MEDICINE INFORMATION

Please read this leaflet carefully before you start taking Peptazol 40

What is in this leaflet

This leaflet answers some common questions about Peptazol 40 enteric coated tablets.

It does not contain all the available information.

It does not take the place of talking to your doctor or pharmacist.

All medicines have benefits and risks. In deciding to give you Peptazol 40, your doctor has weighed the risks of you taking Peptazol 40 against the expected benefits it will have for you.

Always follow the instructions that your doctor and pharmacist give you about Peptazol 40 enteric coated tablets.

If you have any concerns about taking this medicine, ask your doctor or pharmacist.

What is Peptazol 40 used for

Peptazol 40 contains the active ingredient pantoprazole (as sodium sesquihydrate). It is used to treat and help heal duodenal and gastric ulcers.

Depending on the position of the ulcer it is called a gastric or duodenal ulcer. A gastric ulcer occurs in the duodenum which is the tube leading out of the stomach. These can be caused in part by too much acid being made in the stomach.

Peptazol 40 may also be used to prevent ulcers associated with the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs

Peptazol 40 is also used to treat reflux oesophagitis or reflux disease. This can be caused by "washing back" (reflux) of food and acid from the stomach into the food pipe, also known as the oesophagus.

Reflux can cause a burning sensation in the chest rising up to the throat, also known as heartburn.

Peptazol 40 is also used to prevent reflux oesophagitis from coming back.

Your doctor may have prescribed it for another reason.

Ask your doctor if you have any questions about why this medicine has been prescribed for you.

This medicine is available only with a doctor's prescription

How Peptazol 40 works

Peptazol 40 contains the active ingredient pantoprazole, which blocks the "pump" that produces stomach acid. Hence it reduces the amount of acid in your stomach.

Before you take Peptazol 40

When you must not take it

Do not take this medicine if you have had an allergic reaction to pantoprazole or any of the ingredients listed at the end of this leaflet.

Some of the symptoms of an allergic reaction may include: shortness of breath, wheezing or difficulty breathing; swelling of the face, lips, tongue, throat or other parts of the body; muscle pain or tenderness or joint pain; or rash, itching or hives on the skin.

Do not take Peptazol 40 if you have severe liver disease or cirrhosis

Do not take Peptazol 40 in combination with antibiotics or any other medicine if:

- you are allergic to any of the antibiotics or medicines your doctor may prescribe with Peptazol
- you have moderate to severe liver or kidney disease.

Do not take Peptazol 40 in combination with atazanavir (an anti-viral medication).

Do not take this medicine after the expiry date (EXP) printed on the pack.

If you take this medicine after the expiry date has passed, it may not work as well.

Do not take this medicine if the packaging is torn, shows signs of tampering or if it does not look quite right.

If it has expired or is damaged, return it to your pharmacist for disposal.

If you are not sure whether you should start taking this medicine, talk to your doctor.

Before you start to take it

Tell your doctor if:

1. You have allergies to:

- pantoprazole
- any other ingredients listed at the end of this leaflet
- any other substances, such as foods, preservatives or dyes.

2. You have or have had any medical conditions

3. You plan to become pregnant or breast-feed.

Your doctor will discuss the risks and benefits of taking pantoprazole during pregnancy or while breast-feeding.

If you have not told your doctor about any of the above, tell them before you start taking this medicine.

Taking other medicines

Tell your doctor or pharmacist if you are taking any other medicine, including any that you buy without a prescription.

Some medicines may be affected by pantoprazole, or may be affected how well it works. These may include:

Medicines used to prevent blood clots (anticoagulants) and medicines whose activity depend on the acidity of the stomach e.g. ketoconazole.

Your doctor and pharmacist can tell you if you are taking any of these medicines. They may also have more information on medicines to be careful with or avoid while taking pantoprazole.

Other interactions not listed above may also occur.

How to take Peptazol 40

Follow all directions given to you by your doctor or pharmacist carefully.

They may be different to the information in the leaflet.

If you do not understand any written instructions, ask your doctor or pharmacist for help.

How much to take

The usual dose is one tablet per day. Your doctor will prescribe the dose that is right for you.

The dose and frequency of Peptazol 40 that your doctor prescribes for you depends on your medical condition. Your doctor may change the dose as your condition changes.

How to take it

Swallow your tablet whole with a little water with or without food.

Do not crush or chew the tablets. Peptazol 40 have a special coating to protect them from the acidic contents of your stomach. For Peptazol 40 to work effectively, this coating must not be broken.

When to take it

Take Peptazol 40 at about the same time each day. Taking your tablet at the same time each day will have the best effect. It will also help you to remember when to take it.

How long to take it

You should take Peptazol 40 for as long as your doctor continues to prescribe it.

If you forget to take Peptazol 40

If you miss a dose, take it as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, skip the dose you missed and take your next dose when you are meant to.

Date of revision

This leaflet was prepared in 09/03/2017

Marketing authorisation Holder
The Zylfas Medical Co, JB

are not sure what to do, ask your doctor or pharmacist.
If you have trouble remembering to take your medicine, ask your pharmacist for some hints.

If you take too much (overdose)
If overdose occurs, refer to the nearest hospital or contact a Toxicology center.

While you are taking Peptazol 40

Things you must do

- Take Peptazol 40 exactly as your doctor has prescribed, and have any blood tests promptly if your doctor orders them.
- Tell your doctor if you become pregnant while taking Peptazol 40.
- Tell all your doctors, dentists, nurses and pharmacists that you are taking Peptazol 40

If you take pantoprazole for a long period of time, e.g. over 1 year, you will need to see your doctor regularly so that he/she can monitor your condition.

Tell your doctor if you do not feel better while taking pantoprazole.

Things you must not do

Do not give this medicine to anyone else, even if their symptoms seem similar to yours.

Do not take your medicine to treat any other complaints unless your doctor or pharmacist tells you to.

Do not stop taking your medicine, or change the dosage, without checking with your doctor.

Things to be careful of

Be careful driving or operating machinery until you know how Peptazol 40 affects you.

Things that may help your condition

Some self help measures suggested below may help your condition. Talk to your doctor or pharmacist about these measures and for more information.

- Alcohol: your doctor may advise you to limit your alcohol intake.

- Aspirin and many other medicines used to treat arthritis period pain, headaches – these medicines may irritate the stomach and may make your condition worse. Your doctor or pharmacist may suggest other medicines you can take.

- Caffeine: your doctor may advise you to limit the number of drinks which contain caffeine, such as coffee, tea, cocoa and cola drinks, because they contain ingredients that may irritate your stomach.

- Eating habits: eat smaller, more frequent meals. Eat slowly and chew your food carefully. Try not to rush at meal times.

- Smoking –your doctor may advice you to stop smoking or at least cut down.

- Weigh: your doctor may suggest losing some weight to help your condition.

Side effects

Tell your doctor or pharmacist as soon as possible if you do not feel well while you are taking Peptazol 40.

Like other medicines Peptazol 40 can cause some side effects. Most are likely to be minor and temporary.

However, some may be serious and need medical attention.

Ask your doctor or pharmacist to answer any questions you may have.

Tell your doctor if you notice any of the following and they worry you:

- headache
- dizziness
- diarrhoea
- nausea or vomiting
- stomach pain
- excessive gas in the stomach or bowel
- indigestion
- constipation
- dry mouth
- metallic taste
- weakness or tiredness
- increased sweating
- blurred vision
- skin problems, such as itchiness and rash

These are the more common side effects of pantoprazole. Some of these side effects may be due to the combination of other medicines you are taking with pantoprazole

Tell your doctor as soon as possible if you notice any of the following:

- nausea, vomiting, loss of appetite, feeling generally unwell, fever, itching, yellowing of the skin and eyes, and dark coloured urine
- Skin problems such as itchiness and rash, or swelling, blistering or peeling the of the skin
- Swelling of the face, lips, mouth, tongue or throat which may cause difficulty in swallowing or breathing
- Frequent infections such as fever, severe chills, sore throat or mouth ulcers
- Chest pain
- Shortness of breath
- High blood pressure
- Swelling of the legs
- Bleeding or bruising more easily than normal
- Depression, confusion or anxiety

These may be serious side effects and you may need urgent medical attention. Serious side effects are rare.

Other side effects not listed above may occur in some people. Tell your doctor if you notice anything that is making you feel unwell when you are taking, or soon after you have finished taking Peptazol 40.

Storage and disposal of Peptazol 40

Storage

Keep your tablets in the blister pack until it is time to take them.

If you take your tablets out of the box or blister pack they will not keep well.

Keep Peptazol 40 in a place where the temperature stays below 30°C

Heat and dampness can destroy some medicines. Do not leave Peptazol 40 in the car on hot days.

Do not store Peptazol 40 or any other medication in the bathroom or near a sink.

Keep Peptazol 40 where young children cannot reach it.

A locked cupboard at least one and a half metres above the ground is a good place to store medicines.

Disposal

If your doctor tells you to stop taking Peptazol 40 ask your pharmacist what to do with any tablets that are left over.

Product description

What it looks like

Peptazol 40 enteric coated tablets come as white round biconvex enteric coated tablets.

A box contains 15 and 30 enteric coated tablets.

Active Ingredient:

Pantoprazole 40 mg

Other Ingredients:

Calcium stearate
Povidone
Crospovidone
Sodium Carbonate
Mannitol
Opadry AMB white (OY-B-28920)
Suretic white (YAE-6-18107)
Simethicone

MAL No.: MAL11110003A

Manufacturer

Peptazol 40 is manufactured by Química Montpellier S.A. Virrey Liniers 673, Buenos Aires, Argentina.

Date of revision

This leaflet was prepared in 09/03/2017

THE ZYFAS MEDICAL CO,
NO.7 JALAN MOLEK 3/10,
TAMAN MOLEK,
81100 JOHOR BAHRU.

Marketing authorisation Holder
The Zyfas Medical Co, JB

PEPTAZOL 40 – Enteric Coated Tablets

Pantoprazole 40 mg

RISALAH MAKLUMAT UBAT PENGGUNA

Sila baca maklumat ini dengan teliti sebelum memulakan rawatan Peptazol 40.

Kandungan Risalah Ini

Risalah ini mengandungi jawapan untuk beberapa soalan umum mengenai Peptazol 40 enteric coated tablets. Risalah ini tidak mengandungi kesemua maklumat mengenai tablet ini. Jika perlu maklumat yang lebih lanjut, sila rujuk kepada doktor ataupun pakar farmasi.

Semua ubat-ubatan mempunyai manfaat dan juga risiko tersendiri. Memandangkan doktor anda sudah pun membuat keputusan untuk memberi Peptazol 40 sebagai salah satu rawatan, doktor anda telah pun menimbang manfaat dan juga risiko kepada anda.

Arahan mengenai Peptazol 40 enteric coated tablets daripada doktor dan juga pakar farmasi harus dipatuhi dengan teliti.

Jika anda memerlukan sebarang tindak balas mengenai ubat ini, sila rujuk kepada doktor atau pakar farmasi.

Apakah Kegunaan Peptazol 40?

Peptazol 40 mengandungi bahan aktif pantoprazole (sodium sesquihydrate). Ia adalah digunakan untuk merawat dan membantu menyembuhkan duodenum dan ulser gastrik. Bergantung kepada kedudukan ulser, ianya dinamakan gastrik ataupun ulser duodenum. Ulser gastrik berlaku di dalam duodenum, iaitu saluran tiub yang mengalir keluar daripada perut. Ini disebabkan terlalu banyak asid yang dikeluarkan perut. Peptazol 40 juga boleh digunakan untuk mencegah ulser yang dikaitkan dengan penggunaan ubat "non-steroidal anti-inflammatory". Peptazol 40 juga digunakan untuk merawat refluks atau penyakit refluks. Ini boleh disebabkan oleh refluks "washing back" atau makanan dan asid yang daripada perut ke dalam paip makanan, juga dikenali sebagai esophagus. Refluks boleh menyebabkan rasa membara di dada yang meningkat hingga ke tekak, juga dikenali sebagai pedih ulu hati. Peptazol 40 juga digunakan untuk menghalang penyakit refluks esofagus datang kembali.

Doktor anda mungkin telah menetapkan ubat ini untuk anda atas sebab-sebab yang lain. Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai mengapa ubat ini telah ditetapkan untuk anda, sila bertanya kepada doktor anda. Peptazol 40 hanya boleh didapati dengan preskripsi daripada doktor.

Bagaimana Peptazol 40 Berfungsi

Peptazol 40 mengandungi bahan aktif pantoprazole, yang menghalang "pam" yang menghasilkan asid perut. Oleh itu, ia mengurangkan jumlah asid di dalam perut.

Sebelum Mengambil Peptazol 40

Bila Tidak Boleh Mengambil Peptazol 40
Jangan mengambil ubat Peptazol 40 jika anda alergic kepada pantoprazole atau mana-mana

bahan yang disenaraikan pada akhir risalah ini. Beberapa tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk: sesak nafas, bunyi berdehrit atau kesukaran bernafas, bengkak muka, bibir, lidah, tekak atau bahagian-bahagian lain badan, sakit otot atau lembut atau sakit sendi atau ruam, gatal-gatal atau gatal-gatal pada kulit.

Jangan mengambil ubat Peptazol 40 jika anda menghadapi penyakit hati yang teruk atau sirosis

Jangan mengambil ubat Peptazol 40 bersama dengan ubat antibiotik atau dengan mana-mana perubatan yang lain jika:

Anda alergic kepada sebarang antibiotik atau ubat yang telah diberi oleh doktor bersama Peptazol 40.

Anda menghadapi penyakit hati atau buah pinggang yang sederhana hingga ke paras teruk. **Jangan mengambil Peptazol 40 dalam kombinasi dengan atazanavir (ubat anti virus)**

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh luput (EXP) yang telah dicetak pada bungkusannya. Jika anda mengambil ubat ini selepas tarikh luput, ubat ini mungkin tidak berfungsi dengan baik.

Jangan mengambil ubat ini sekiranya terdapat sebarang tanda kerosakan di bungkusannya ini.

Jika ubat ini telah tamat tempohnya, pulangkan kepada doktor atau pakar farmasi untuk dibuang.

Sebelum Mula Mengambil Peptazol 40

Beritahu doktor anda jika:

1. Anda alergic kepada:

Pantoprazole

Bahan-bahan yang lain seperti makanan, pengawet atau pewarna.

2. Anda mengalami atau pernah mengalami sebarang penyakit

3. Anda merancang untuk hamil atau menyusui.

Doktor anda akan membincangkan risiko dan manfaat mengambil pantoprazole semasa mengandung atau semasa menyusukan bayi. Jika anda tidak memberitahu doktor anda mengenai mana-mana di atas, memberitahu mereka sebelum anda mula mengambil ubat ini.

Jika Mengambil Ubat-ubatan Lain

Beritahu doktor atau pakar farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat-ubatan yang lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, kedai pasar raya atau kedai-kedai lain.

Terdapat sesetengah ubat yang boleh terjejas oleh Peptazol 40 atau mungkin menjejaskan fungsinya. Ini mungkin termasuk:

Ubat yang digunakan untuk menghalang darah beku (anticoagulants) dan ubat-ubatan yang mempunyai aktiviti yang bergantung pada keasidan perut contohnya, ketoconazole.

Doktor dan ahli farmasi anda boleh memberitahu anda jika anda sedang mengambil ubat-ubatan ini. Doktor dan ahli

farmasi anda mungkin mempunyai maklumat lanjut mengenai ubat-ubatan yang harus anda berhati-hati atau mengelak semasa mengambil pantoprazole. Interaksi yang lain yang tidak disenaraikan di atas juga boleh berlaku.

Cara Menggunakan Peptazol 40

Ikut segala arahan yang telah diberikan kepada anda oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Arahan itu mungkin berbeza dengan maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami isi kandungan ini, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapat bantuan.

Berapa Banyak Harus Diambil

Dos yang lazim untuk Peptazol 40 ialah satu biji tablet setiap hari. Doktor anda akan menetapkan dos yang tepat untuk anda. Dos dan kekerapan Peptazol 40 yang telah ditetapkan bergantung kepada kondisi anda. Doktor boleh menukar dos anda jika tahap kondisi anda berubah.

Bagaimana Perlu Diambil

Telan Peptazol 40 secara keseluruhan bersama sedikit air. Peptazol 40 boleh diambil selepas dan juga sebelum makan. Jangan menghancurkan atau mengunyah tablet. Peptazol 40 mempunyai salutan khas untuk melindungi ia daripada asid perut anda. Untuk mendapat hasil yang berkesan, salutan ini tidak boleh dipecahkan.

Bila Perlu Diambil

Makanlah Peptazol 40 di waktu yang sama setiap hari kerana ini akan menghasilkan kesan yang lebih baik dan juga membolehkan anda mengingat waktu untuk memakannya dengan mudah.

Berapa Lama Untuk Mengambil

Anda harus mengambil Peptazol 40 selamalamanya yang doktor anda tetapkan.

Jika Terlupa mengambil

Jika anda terlepas untuk memakan satu dos, ambil lah ubat ini dengan segera. Jika waktu sudah pun mendekati untuk mengambil dos yang seterusnya, jangan mengambil 2 dos dengan sekali gus. Anda hanya perlu memakan 1 dos sahaja.

Jika anda kurang pasti, sila rujuk kepada doktor atau pakar farmasi anda. Jika anda mendapati kesukaran untuk mengingat jadual pemakanan dos anda, sila rujuk kepada doktor atau pakar farmasi anda untuk keterangan lanjut.

Jika Mengambil berlebihan (Terlebih Dos)

Jika anda telah memakan terlebih dos dari apa yang telah diberikan doktor,

Date of revision

This leaflet was prepared in 09/03/2017

Marketing authorisation Holder
The Zylas Medical Co., JB

sila pergi ke hospital yang berdekatan atau pusat toksikologi dengan segera.

Semasa Menggunakan Peptazol 40

Perkara yang harus dilakukan

- ☐ Mengambil Peptazol 40 seperti mana yang telah diberitahu oleh doktor anda dan juga mengambil ujian darah jika perlu oleh doktor
- ☐ Beritahu doktor anda jika anda hamil semasa mengambil Peptazol 40.
- ☐ Beritahu pada semua doktor, jururawat, pakar gigi dan juga pakar farmasi bahawa anda sedang mengambil Peptazol 40.

Jika anda mengambil Peptazol 40 untuk jangka masa yang panjang contohnya, buat selama setahun, anda perlu berjumpa doktor supaya doktor anda boleh memantau kondisi anda dengan rapi. Beritahu doktor anda jika anda tidak merasa lebih baik ketika mengambil pantoprazole.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Anda tidak harus memberi ubat anda kepada orang lain, walaupun orang itu mengalami sakit yang serupa. Peptazol 40 tidak harus dimakan untuk rawatan lain melainkan diberitahu oleh doktor anda. Jangan berhenti memakan Peptazol 40 tanpa izin doktor.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa memandu ataupun sedang mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana Peptazol 40 mempengaruhi anda.

Perkara yang boleh membantu kondisi anda

Beberapa langkah mencegah yang disyorkan di bawah boleh membantu keadaan anda. Berbincanglah dengan doktor atau ahli farmasi anda mengenai langkah-langkah ini dan untuk maklumat lanjut.

- Alkohol: Doktor anda mungkin menasihatkan anda untuk menghadkan pengambilan alkohol anda.
- Aspirin dan ubat-ubat lain yang digunakan untuk merawat penyakit arthritis, sakit kepala: Ubat-ubat ini boleh merengsakan perut dan boleh membuat keadaan anda lebih teruk. Doktor atau ahli farmasi anda boleh mencadangkan ubat-ubatan yang lain yang anda boleh ambil.
- Kafein: Doktor anda mungkin menasihatkan anda untuk menghadkan bilangan minuman yang mengandungi kafein, seperti kopi, the, koko dan minuman cola, kerana mereka mengandungi bahan-bahan yang boleh merengsakan perut anda.
- Tabiat makan: makan lah bahagian yang kecil tetapi kerap. Makan perlahan-lahan dan kunyah dengan betul. Jangan tergesa-gesa apabila waktu makan.
- Merokok: Doktor anda boleh menasihati anda supaya berhenti atau mengurangkan merokok.
- Berat badan: Doktor anda boleh mencadangkan untuk mengurangkan berat badan anda untuk membantu memulihkan kondisi anda.

Kesan-kesan Sampingan

Beritahu doktor atau pakar farmasi anda dengan segera jika anda rasa tidak sihat selepas mengambil Peptazol 40.

Seperti ubat lain, Peptazol 40 boleh menyebabkan kesan sampingan. Kebanyakan

daripada kesan sampingan ini adalah tidak serius dan hanya lah buat sementara. Tetapi, ada segelintir yang serius dan memerlukan rawatan dengan segera.

Anda boleh bertanya kepada doktor atau pakar farmasi anda jika anda ada beberapa pertanyaan. Beritahu doktor anda jika anda dapati salah satu daripada berikut yang berlaku dan membimbangkan:

- ☐ Sakit kepala
- ☐ Pening
- ☐ Gigit-birit
- ☐ Moya atau muntah-muntah
- ☐ Sakit perut
- ☐ Gas berlebihan di dalam perut atau usus
- ☐ Penak
- ☐ Sembelit
- ☐ Kulit kering
- ☐ Rasa logam
- ☐ Demam atau keletihan
- ☐ Berpeluh berlebihan
- ☐ Penglihatan kabur
- ☐ Masalah kulit seperti gatal-gatal dan ruam
- Terdapat lebih banyak lagi kesan sampingan pantoprazole. Sebahagian daripada kesan-kesan ini boleh disebabkan kombinasi bersama ubat-ubatan yang lain bersama pantoprazole. Katakan kepada doktor anda segera jika anda melihat salah satu daripada yang berikut:
- ☐ Rasa loya, muntah-muntah, hilang selera makan, rasa kurang sihat, demam, gatal, kuning kulit dan mata, dan air kencing berwarna gelap
- ☐ Masalah kulit seperti gatal-gatal dan ruam, atau bengkak, melepuh atau pengelupasan kulit
- ☐ Bengkak muka, bibir, mulut, lidah atau tekak yang mungkin menyebabkan kesukaran menelan atau bernafas
- ☐ Kerap jangkitan seperti demam, teruk seram sejuk, sakit tekak atau ulser di dalam mulut
- ☐ Sakit dada
- ☐ Sesak nafas
- ☐ Tekanan darah tinggi
- ☐ Bengkak kaki
- ☐ Pandaran atau lebam lebih mudah daripada normal
- ☐ Kemurungan, kekeliruan atau kebimbangan

Terdapat kesan sampingan yang lebih serius yang memerlukan perhatian doktor. Kesan sampingan yang lebih serius jarang didapati di kalangan pesakit.

Kesan sampingan lain tidak disenaraikan di atas mungkin boleh terjadi pada beberapa pesakit. Katakan kepada doktor anda jika anda mendapati sebarang perkara yang membuat anda kurang sihat semasa, atau sebaik saja anda habes mengambil Peptazol 40.

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Peptazol 40

Simpanan Peptazol 40

Simpan tablet anda dalam pakej blister sampai adalah masa untuk menggunakannya. Jika anda mengeluarkan tablet daripada kotak atau pakej blister, tablet akan menjadi kurang baik.

Simpan Peptazol 40 di bawah suhu 30°C

Kepanasan dan kelembapan boleh memusnahkan beberapa ubat-ubatan. Jangan tinggalkan Peptazol 40 di dalam kereta pada hari yang terik. Jangan simpan Peptazol 40 atau ubat yang lain di dalam bilik mandi atau berhampiran wastafel. Jauhkan Peptazol 40 daripada kanak-kanak. Hanya lebih baik jika anda meletakkan kesemua ubat-ubatan disebuah peti yang terletak satu setengah meter dari atas lantai.

Pembuangan

Jika doktor anda memberitahu anda untuk berhenti memakan Peptazol 40, sila rujuk kepada pakar farmasi anda untuk langkah-langkah yang harus dibuat pada sisa-sisa tablet yang ada.

Maklumat Lanjut

Rupa bentuk dan warna Peptazol 40

Tablet enteric coated Peptazol 40 berbentuk bulat biconvex, berwarna putih dan disaluti "enteric".

Satu kotak mengandungi 15 dan 30 tablet yang telah disaluti "enteric".

Bahan Aktif:

Pantoprazole 40 mg

Bahan Yang Lain:

Calcium stearate
Povidone
Croscopovidone
Sodium carbonate
Mannitol
Opadry AMB white (OY-B-28920)
Suretic white (YAE-6-18107)
Simethicone

Nombor

MAL: MAL11110003A

Pengilang

Peptazol 40 adalah pengeluaran oleh Quimica Montpeller S.A. Virrey Liners 673, Buenos Aires, Argentina.

The Zylas Medical Co
No 7, Jalan Molek 3/10
Taman Molek 81100
Johor Bahru

Marketing authorisation Holder
The Zylas Medical Co, B

Date of revision

This leaflet was prepared on 09/03/2017