

MUCERA SYRUP

Ambroxol Hydrochloride (15 mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan MUCERA SYRUP
2. Bagaimana MUCERA SYRUP berfungsi
3. Sebelum menggunakan MUCERA SYRUP
4. Cara menggunakan MUCERA SYRUP
5. Semasa menggunakan MUCERA SYRUP
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan MUCERA SYRUP
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan MUCERA SYRUP

MUCERA SYRUP digunakan untuk keadaan di mana terlalu banyak mukus yang likat di dalam saluran pernafasan.

Bagaimana MUCERA SYRUP berfungsi

MUCERA SYRUP mengandungi ambroxol hydrochloride yang membantu mencairkan kahak dan menyingkirkan kahak dengan lebih mudah.

Sebelum menggunakan MUCERA SYRUP

- Bila tidak boleh menggunakan
Jangan mengambil MUCERA SYRUP jika anda atau anak anda mempunyai alahan kepada ambroxol hydrochloride atau sebarang bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat Lanjut).

- Sebelum menggunakan MUCERA SYRUP

Dapatkan nasihat doktor anda jika anda atau anak anda mengalami/mempunyai:

- Kegagalan fungsi buah pinggang
- Ketidakupayaan untuk menghadamkan gula fruktosa.
- Mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak. Penggunaan MUCERA SYRUP pada tiga bulan pertama kehamilan dan ibu yang sedang menyusu adalah tidak digalakkan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor dan ahli farmasi sekiranya anda mengambil sebarang ubat lain termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Ubat-ubatan yang boleh mengganggu MUCERA SYRUP adalah seperti antibiotik (Amoxycillin, Cefuroxime, Erythromycin, Doxycycline).

Cara menggunakan MUCERA SYRUP

- Berapa banyak harus digunakan

Kanak-kanak sehingga 2 tahun: 2.5 ml, untuk diambil 2 kali sehari.

Kanak-kanak 2 - 5 tahun: 2.5 ml, untuk diambil 2 - 3 kali sehari.

Kanak-kanak 5 - 12 tahun: 5 ml, untuk diambil 2 - 3 kali sehari.

Untuk diambil selepas makan.

- Bila perlu digunakan

Ambil 2 - 3 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan MUCERA SYRUP mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor.

MUCERA SYRUP tidak digalakkan untuk tempoh rawatan yang panjang tanpa pengawasan perubatan.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan MUCERA SYRUP

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan MUCERA SYRUP.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi MUCERA SYRUP kepada sesiapa walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Sebagai ubat-ubatan lain, MUCERA SYRUP boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan sampingan ringan yang kadang-kadang berlaku termasuk:

- Loya
- Cirit-birit
- Ketidakhadaman atau rasa kembung
- Muntah
- Sakit perut
- Pedih ulu hati
- Deria rasa berubah
- Kebas tekak
- Tekak kering
- Mulut kering

MUCERA SYRUP boleh menyebabkan alahan yang teruk dan reaksi kulit yang serius. Hentikan penggunaan MUCERA SYRUP dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang simptom seperti berikut:

1. Alergi teruk: kesukaran bernafas, pening, bengkak kulit atau ruam.

MUCERA SYRUP

Ambroxol Hydrochloride (15 mg/5ml)

2. Reaksi kulit yang teruk: kemerahan kulit, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan MUCERA SYRUP

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Jauhi daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

MUCERA SYRUP adalah larutan berwarna merah, dengan rasa manis dan sedikit pahit serta berbau strawberi.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:
Ambroxol hydrochloride.
- Bahan tidak aktif:
Sodium benzoate, PEG 4000, sucralose, sodium chloride, citric acid anhydrous, sorbitol solution, Eurocert Raspberry Red, propylene glycol, flavour strawberry 52311C, sodium EDTA, sugar EEC-1, purified water.

- Nombor MAL:

MAL12050010X

Pengilang

Pt Otto Pharmaceutical Industries
Jl. Dr Setiabudhi KM12.1
40391 Indonesia

Pemegang Pendaftaran Produk

The Zyas Medical Co.
No. 15, Jalan Mega 1/5
Taman Perindustrian Nusa Cemerlang
79200 Iskandar Puteri,
Johor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

12/07/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)120724/00091