

LUKAKLINE TABLETS 10MG

Montelukast Sodium (10 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Lukakline
2. Bagaimana Lukakline berfungsi
3. Sebelum mengambil Lukakline
4. Cara menggunakan Lukakline
5. Semasa menggunakan Lukakline
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Lukakline
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Lukakline

- mencegah dan merawat asma bagi orang dewasa yang berumur 15 tahun dan ke atas.
- melegakan gejala-gejala siang dan malam rinitis alergi bermusim dikalangan orang dewasa yang berumur 15 tahun dan ke atas.

Bagaimana Lukakline berfungsi

Ubat ini ialah antagonis kepada reseptor leukotriena. Ia menghalang bahan yang terdapat dalam peparu yang dikenali sebagai leukotriena yang menyebabkan saluran pernafasan menjadi sempit dan membengkak. Penyekatan leukotriena akan melegakan tanda-tanda asma dan membantu mengelakkan serangan asma. Lukakline juga memperbaiki gejala-gejala rinitis alergi.

Sebelum mengambil Lukakline

Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda alah pada montelukast atau pada mana-mana bahan eksipien
- anda sedang mengambil ubat yang mengandungi montelukast
- anda tiada toleransi terhadap galaktosa, mempunyai penyakit Lapp kurang laktosa atau penyerapan glukosa-galaktosa tidak cekap

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor jika:

- anda hamil atau merancang untuk hamil
- anda sedang menyusukan bayi atau merancang untuk menyusukan bayi.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda sedang mengambil apa-apa ubat lain, dalam apa-apa bentuk yang dibeli atau didapati tanpa preskripsi. Seseengah ubat boleh mengganggu fungsi bahan aktif yang terdapat pada Lukakline.

Antaranya:

- ubat lain yang mengandungi montelukast
- *fenobarbital*
- *fenitoin*
- *rifampisin*

Interaksi lain yang tidak tersenarai mungkin berlaku. Rujuk kepada doktor atau pegawai farmasi jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

Cara menggunakan Lukakline

Berapa banyak harus diambil

Dewasa berumur 15 tahun dan ke atas: ambil 1 biji tablet 10 mg sehari pada waktu petang. Telan tablet dengan secawan air.

Bila perlu diambil

Ambil ubat ini pada waktu petang. Ubat ini boleh diambil sebelum atau selepas makan.

Berapa lama perlu diambil

Teruskan mengambil Lukakline selama mana yang diarahkan oleh doktor anda.

Jika terlupa mengambil

Jangan gantikan dos bagi menggantikan dos yang tertinggal.

Sekiranya terlupa, ambil dos tersebut sebaik sahaja teringat. Sekiranya telah hampir waktu untuk dos seterusnya, tinggalkan dos tersebut

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Lukakline

Perkara yang perlu dilakukan

Pastikan anda mengambil ubat seperti yang diarahkan oleh doktor; walaupun gejala asma sudah terkawal dan semasa penyakit asma anda bertambah teruk.

Pastikan anda atau anak anda mengambil ubat seperti yang diarahkan oleh doktor; walaupun gejala asma sudah terkawal dan juga semasa anda mengalami serangan asma. Sentiasa bersedia dengan alat sedut sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya serangan asma berlaku. Lukakline tidak sesuai

LUKAKLINE TABLETS 10MG

Montelukast Sodium (10 mg)

digunakan untuk serangan asma yang mendadak (akut). Beritahu doktor anda jika anda hamil atau mula mengambil ubat baru

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berikan ubat ini kepada orang lain walaupun mereka mengalami gejala-gejala yang sama seperti anda. Jangan ambil ubat ini untuk merawat penyakit lain kecuali dimaklumkan oleh doktor atau pegawai farmasi. Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah dos tanpa merujuk kepada doktor.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Ambil perhatian:

- jika tanda-tanda yang dialami semakin teruk, hubungi doktor dengan segera
- jangan menggantikan ubat ini dengan ubat-ubatan lain yang dipreskripsikan oleh doktor untuk merawat asma
- jangan mengambil aspirin atau ubat anti radang bukan steroid (NSAID) jika ia menyebabkan asma menjadi teruk
- anda mungkin akan berasa pening apabila memandu kenderaan atau mengendalikan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Maklumkan kepada doktor dengan segera jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan yang tidak diingini semasa mengambil ubat ini.

Kesan sampingan yang biasa dialami:

- Sakit kepala
- lemah atau keletihan yang luar biasa
- batuk

- sakit gigi
- pening
- pedih ulu hati
- demam
- radang perut dan usus
- hidung tersumbat
- ruam
- degupan jantung yang cepat
- cirit-birit, mulut kering, senak, loya, muntah
- peningkatan kecenderungan untuk berdarah
- sakit sendi atau otot, kekejangan otot

Kesan sampingan yang amat jarang berlaku:

- sindrom Churg-Strauss, sejenis penyakit radang salur darah

Maklumkan kepada doktor dengan segera jika anda perasan ada perubahan yang berkaitan dengan tingkah laku dan angin (mood) seperti berikut:

- Gejala obsesif-kompulsif

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Lukakline

Penyimpanan

Jauhkan daripada kanak-kanak. Simpan dibawah 30°C. Lindungi daripada cahaya dan kelembapan.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan

atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Segi empat bulat, tablet bersalut filem, berwarna coklat, bercetak "MTS" pada satu sisi dan "10" pada sebelah lagi.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

- Montelukast sodium 10mg

Bahan-bahan tidak aktif:

Lactose Monohydrate
Cellulose, microcrystalline
Croscarmellose sodium
Hydroxypropylcellulose/klucel
Cellulose, microcrystalline
Magnesium stearate
Opadry brown
Purified water

Nombor MAL

MAL12075069ACZ

Pengilang

Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
Survey No.41, Bachupally
Village, Bachupally Mandal,
Medchal Malkajgiri, District
Telangana 500090, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

THE ZYFAS MEDICAL CO.,
No.7 Jalan Molek 3/10,
Taman Molek,
81100 Johor Bahru.

Tarikh kemaskini RIMUP

Nov 2022

Nombor Siri

NPRA(R2/1)230118/1003