

Presartan H 50/12.5mg Film Coated Tablet

Losartan Potassium, 50mg & Hydrochlorothiazide Tablets, 12.5mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Presartan H 50
2. Bagaimana Presartan H 50 berfungsi
3. Sebelum mengambil Presartan H 50
4. Cara menggunakan Presartan H 50
5. Semasa menggunakan Presartan H 50
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk

Apakah kegunaan Presartan H 50

Presartan H 50 digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi (essential hypertension).

Presartan H 50 adalah kombinasi reseptor angiotensin II antagonist (losartan) dan sejenis ubat diuretik (menggalakan proses penghasilan air kencing oleh buah pinggang).

Bagaimana Presartan H 50 berfungsi

Presartan H 50 adalah sejenis ubat untuk merawat tekanan darah tinggi. Losartan merehatkan salur darah anda, sekaligus merendahkan tekanan darah, dimana hydrochlorothiazide berfungsi untuk menggalakan buah pinggang mengeluarkan lebih air dan garam (air kencing).

Sebelum mengambil Presartan H 50

Bila tidak boleh mengambil

Anda tidak boleh mengambil ubat ini jika:

- Anda alah pada losartan, hydrochlorothiazide, atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.
- Jika anda alah pada bahan yang diperolehi dari sulfonamide (seperti bahan thiazide yang lain, sesetengah ubat antibakteria seperti co- trimoxazole, tanya doktor jika anda tidak pasti).
- Jika anda, atau jika anda rasa anda mungkin atau merancang untuk hamil.
- Jika buah pinggang anda tidak menghasilkan air kencing.
- Jika anda pernah muntah dan cirit-birit yang teruk
- Jika anda ada kegagalan jantung
- Jika anda ada salur darah arteri yang sempit ke buah pinggang (renal artery stenosis)
- Jika anda pernah mengalami bengkak muka, bibir, tekak dan lidah.
- Jika anda mengambil ubat diuretik.
- Jika anda ada alahan, asma atau keadaan yang menyebabkan sakit sendi, ruam kulit, dan demam (systemic lupus erythematosus)
- Jika anda mengalami penyempitan injap jantung (aortic or mitral valve stenosis) atau penebalan otot jantung (hypertrophic cardiomyopathy)
- Jika anda mengalami kandungan kalsium tinggi atau kandungan kalium rendah, atau jika anda mengamalkan diet rendah kalium.
- Jika anda akan menjalani ujian untuk menguji fungsi parathyroid.
- Jika fungsi hati anda terjejas.
- Jika fungsi buah pinggang anda terjejas.

Maklumkan pembekal penjagaan kesihatan anda sebelum mengambil Presartan H 50 jika anda menghidap kanser kulit atau jika anda mengalami luka kulit yang tidak dijangka semasa rawatan. Rawatan dengan hydrochlorothiazide, terutamanya penggunaan jangka panjang dengan dos yang tinggi, boleh meningkatkan risiko beberapa jenis kanser kulit dan bibir (kanser kulit bukan melanoma). Lindungi kulit anda daripada pendedahan matahari dan sinaran UV semasa mengambil Presartan H 50.

Sebelum mula mengambil

Periksa dengan doktor sebelum anda mengambil tablet losartan dan hydrochlorothiazide:

- Jika anda ada kencing manis
- Jika anda ada gout

Sila beritahu doktor jika anda ada mengambil sebarang ubat lain,

Presartan H 50/12.5mg Film Coated Tablet

Losartan Potassium, 50mg & Hydrochlorothiazide Tablets, 12.5mg

termasuk ubat yang diperolehi atau dibeli tanpa preskripsi doktor, ubat herba dan ubat komplementari, atau jika anda alah pada mana-mana ubat. Beritahu doktor anda jika anda alah pada mana-mana bahan, seperti makanan, bahan awet dan pewarna.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Presartan H 50 dan sesetengah ubat mungkin boleh berinteraksi. Sila beritahu doktor jika anda mengambil, atau pernah mengambil ubat, termasuk ubat yang diperolehi tanpa preskripsi, vitamin dan makanan tambahan berunsurkan herba.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil:

- Lithium (ubat untuk merawat kemurungan/depresi)
- Kalium tambahan, garam yang mengandungi kalium, atau ubat diuretik yang mengekalkan kalium.
- Ubat untuk menurunkan tekanan darah yang lain
- Ubat tahan sakit dan ubat artritis (sakit sendi).
- Resin untuk kolestrol tinggi seperti colestyramine, colestipol
- Ubat yang merehatkan otot
- Steroid
- Bahan kimia 'pressor amine' (boleh meningkatkan tekanan darah) seperti adrenaline atau bahan lain yang dalam kumpulan yang sama.
- Ubat untuk diabetes (ubat makan, insulin)
- Barbiturat, narkotik.

- Ubat untuk merawat jangkitan fungus/kulat.

Cara menggunakan Presartan H 50

Berapa banyak harus diambil

Dos Presartan H 50 untuk kebanyakan pesakit tekanan darah tinggi adalah 1 tablet sehari bagi mengawal tekanan darah mereka pada jangka masa 24-jam. Dos ini boleh dinaikkan sehingga dos maksimum 2 tablet sehari sekali.

Dos untuk orang tua mungkin akan dikurangkan, terutama jika terdapat kerosakan buah pinggang. Jika terdapat kerosakan hati, selalunya akan diberikan dos yang lebih rendah.

Bila perlu diambil

Presartan H 50 boleh diambil sebelum atau selepas makan. Doktor anda akan menetapkan dos yang perlu diambil, bergantung pada kondisi kesihatan anda, dan sama ada anda mengambil ubatan lain. Ambil ubat seperti yang diarahkan oleh doktor.

Berapa lama perlu diambil

Ambil ubat ini selama yang diarahkan doktor. Adalah penting untuk meneruskan pengambilan ubat ini selama yang doktor sarankan, untuk memastikan tekanan darah anda sentiasa terkawal.

Jika terlupa mengambil

Jika anda tertinggal satu dos, ambil dos yang terlupa setelah anda ingat. Namun, jika telah hampir waktu untuk mengambil dos yang seterusnya, jangan ambil dos tertinggal itu. Teruskan mengambil

dos seperti biasa (jangan ambil dua dos).

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda terlebih ambil dos, berlaku tanda-tanda seperti tekanan darah menurun, degupan jantung tidak normal, nadi perlahan, kurang elektrolit dalam badan, dan dehidrasi.

Jika anda (atau orang lain) menelan terlalu banyak tablet pada satu masa, sila hubungi doktor dengan segera supaya rawatan dapat diberikan serta-merta.

Semasa menggunakan Presartan H 50

Perkara yang perlu dilakukan

- Simpan Presartan H 50 di tempat selamat dan jauh dari kanak-kanak.
- Jangan guna tablet Presartan H 50 selepas tarikh luput yang tertera pada bekas ubat. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir pada bulan tersebut.
- Simpan tablet ini dalam pek original.
- Maklumkan pada doktor jika anda hamil atau merancang untuk hamil atau menyusukan anak.

Dapatkan nasihat doktor:

- Jika terdapat sebarang pertanyaan tentang ubat ini.
- Jika anda ada mengambil sebarang ubatan lain.
- Jika terdapat mana-mana kesan sampingan yang bertambah seris, atau jika

Presartan H 50/12.5mg Film Coated Tablet

Losartan Potassium, 50mg & Hydrochlorothiazide Tablets, 12.5mg

anda dapati terdapat kesan sampingan yang tidak tersenarai dalam risalah ini.

- Jika anda hamil ketika mengambil tablet kalium losartan dan hydrochlorothiazide, sila beritahu doktor anda dengan segera. Anda mungkin perlu mengambil rawatan alternatif selain rawatan ini jika anda merancang untuk hamil.
- Jika anda terlebih ambil dos lebih dari yang disarankan doktor, sila beritahu doktor anda dengan segera.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Ketika mula menjalani rawatan ini, anda tidak boleh melakukan aktiviti yang memerlukan tumpuan atau perhatian yang khusus (seperti memandu atau menggunakan mesin) sehingga anda tahu kesan ubat tersebut terhadap anda.
- Jangan berhenti mengambil ubat ini tanpa nasihat dari doktor anda.
- Ingatlah yang ubat ini dibekalkan untuk kegunaan anda sahaja. Jangan beri ubat ini pada orang lain. Ia mungkin akan memudaratkan orang lain, walaupun jika mereka mempunyai simptom yang sama seperti anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Anda dinasihatkan untuk tidak meminum minuman beralkohol

ketika mengambil ubat ini: interaksi antara alkohol dan kalium losartan dan hydrochlorothiazide tablet mungkin akan menambahkan kesan masing-masing.

Kesan-kesan sampingan

Seperti kebanyakan ubat lain, tablet Presartan H 50 boleh mengakibatkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mengalaminya.

Kesan sampingan yang paling biasa dengan pengambilan tablet kalium losartan dan hydrochlorothiazide adalah sakit bahagian abdomen, bengkak, degupan jantung laju dan tidak normal (palpitation), sakit belakang, pening kepala, batuk2, hidung tersumbat, sesema dan ruam.

Beritahu doktor jika terdapat kesan sampingan atau jika anda risau terdapat kesan sampingan yang tidak tersenarai di dalam risalah ini. Untuk senarai yang lengkap, sila tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Tablet kalium losartan dan hydrochlorothiazide mungkin mengakibatkan kesan sampingan yang serious seperti berikut:

- Kecelakaan atau kematian bayi dalam kandungan.
- Kesan alahan yang teruk (ruam, kegatalan, bengkak muka, bibir, mulut dan tekak yang

menyebabkan kesukaran untuk menelan atau bernafas), berhenti mengambil tablet Presartan H 50 dan beritahu doktor atau pergi ke hospital berdekatan dengan segera.

- Tekanan darah rendah (hypotension). Tekanan darah rendah boleh membuatkan anda pingsan atau pening kepala. Baring jika anda rasa pening atau pitam. Hubungi doktor anda dengan segera.
- Keadaan bertambah teruk, iaitu systemic lupus erythematosus.

Kekerapan 'tidak diketahui': Kanser Kulit dan bibir ((kanser kulit bukan melanoma)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan

- Penyimpanan

Simpan dibawah 30°C di tempat yang kering.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dibuang dalam sistem air kumbahan atau sisa buangan rumah. Tanya ahli farmasi

Presartan H 50/12.5mg Film Coated Tablet

Losartan Potassium, 50mg & Hydrochlorothiazide Tablets, 12.5mg

tentang cara terbaik untuk
melupuskan ubat yang tidak lagi
diperlukan. Langkah ini boleh
membantu melindungi alam sekitar.

No 15, Jalan Mega 1/5,
Taman Perindustrian
Nusa Cemerlang,
79200 Iskandar Puteri,
Johor, Malaysia

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet berwarna kuning, bujur,
biokonvek, bersalut filem. Blister
mengandungi 14 tablet, 2 blister
dalam 1 kotak bersama dengan
risalah.

Tarikh kemaskini risalah

26/03/2024

Nombor Siri

NPRA(R2/1)230307/1022

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Losartan Potassium 50mg
Hydrochlorothiazide 12.5mg

- Bahan tidak aktif

Quinoline yellow lake
PEG 6000 /Macrogol 6000
Titanium Dioxide BP
Colloidal anhydrous silica BP
Purified Talc B.P.
Lactose Monohydrate BP
Corn starch/Maize starch
Magnesium Stearate BP
Hydroxy Propyl Methyl
Cellulose 15 CPS
Pregelatinised Starch B.P.
Microcrystalline Cellulose BP
Purified water

Nombor MAL

MAL11040023AZ

Pengilang

IPCA LABORATORIES LTD.
Plot No. 255/1, Village Athal
Union Territory of Dagra & Nagra Haveli
396230 Silvassa India.

Pemegang pendaftaran produk

THE ZYFAS MEDICAL CO.,