

CETYREC-AP FILM-COATED TABLET 5MG

Levocetirizine dihydrochloride (5 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Cetyrec-AP
2. Bagaimana Cetyrec-AP berfungsi
3. Sebelum menggunakan Cetyrec-AP
4. Cara menggunakan Cetyrec-AP
5. Semasa menggunakan Cetyrec-AP
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Cetyrec-AP
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Cetyrec-AP

Cetyrec-AP digunakan untuk rawatan gejala yang berkaitan dengan alahan rhinitis (termasuk alahan rhinitis berterusan) dan urtikaria kronik (ruam gatal).

Bagaimana Cetyrec-AP berfungsi

Cetyrec-AP mengandungi bahan aktif Levocetirizine dihydrochloride. Cetyrec-AP adalah ubat anti alahan yang bertindak menghalang sejenis bahan semulajadi (histamine) yang dihasilkan oleh badan semasa reaksi alahan.

Sebelum menggunakan Cetyrec-AP

-Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan mengguna Cetyrec-AP:
- Jika anda hipersensitif kepada bahan aktif, Levocetirizine atau mana-mana bahan lain dalam Cetyrec-AP atau Cetirizine.
 - Jika anda mempunyai kemerosotan fungsi buah pinggang yang teruk dengan pelepasan creatinine dibawah 10ml/mim atau menjalani hemodialisis.

Mengandung dan menyusukan bayi Keselamatan penggunaan semasa kehamilan belum dapat dipastikan. Levocetirizine dirembeskan dalam susu ibu. Penggunaan levocetirizine pada ibu yang menyusukan tidak digalakkan.

-Sebelum mula menggunakan

Bercakap dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Cetyrec-AP:

- Jika anda mempunyai kesukaran untuk mengosongkan pundi kencing anda (disebabkan oleh kelukaan saraf tunjang atau pembesaran kelenjar prostat).
- Jika anda mempunyai intoleransi terhadap sesetengah gula.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi dan jika anda menggunakan sebarang ubat lain. Ubat lain akan mempengaruhi keberkesanan antara satu sama lain.

Cara menggunakan Cetyrec-AP

-Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa ambil ubat ini sama seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Dos yang biasa

- Dewasa dan remaja berumur 12 tahun ke atas: 1 tablet sekali sehari.
- Kanak-kanak berumur 6-12 tahun: 1 tablet sekali sehari.
- Warga tua: Pelarasan dos disyorkan pada pesakit tua yang mempunyai masalah buah pinggang yang sederhana hingga teruk.
- Kemerosotan buah pinggang: Selang dos mesti disesuaikan mengikut fungsi buah pinggang.
- Kemerosotan hati: Tiada pelarasan dos diperlukan pada pesakit dengan kemerosotan hati semata-mata. Pada pesakit yang mengalami kemerosotan hati dan kemerosotan buah pinggang, pelarasan dos adalah disyorkan.

Dos yang Disyorkan

Levocetirizine dihydrochloride, 5 mg, mesti ditelan keseluruhan dengan cecair dan boleh diambil dengan atau tanpa makanan. Adalah disyorkan untuk mengambil dos harian dalam satu pengambilan.

Tempoh penggunaan

Rinitis alahan sekejap-sekejap (gejala <4 hari/minggu atau kurang daripada 4 minggu setahun) perlu dirawat mengikut penyakit dan sejarahnya; ia boleh dihentikan sebaik sahaja gejala hilang dan boleh dimulakan semula apabila gejala muncul semula. Dalam kes rinitis alahan yang berterusan (gejala >4 hari/minggu atau lebih daripada 4 minggu setahun), terapi berterusan boleh dicadangkan kepada pesakit semasa tempoh pendedahan kepada alergen. Terdapat pengalaman klinikal dengan penggunaan levocetirizine untuk tempoh rawatan sekurang-kurangnya 6 bulan. Dalam urtikaria kronik dan rinitis alergi kronik, terdapat pengalaman klinikal penggunaan cetirizine (racemate) sehingga satu tahun.

-Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Cetyrec-AP harus diambil secara oral dan boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

-Berapa lama perlu digunakan

Terus mengambil Cetyrec-AP sebagaimana yang diarahkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya berlebihan berlaku, hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda

CETYREC-AP FILM-COATED TABLET 5MG

Levocetirizine dihydrochloride (5 mg)

mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Gejala dos berlebihan mungkin termasuk mengantuk pada orang dewasa dan awalnya kegelisahan dan kegelisahan, diikuti dengan mengantuk pada kanak-kanak.

Semasa menggunakan Cetyrec-AP

-Perkara yang berlu dilakukan

Ambil ubat anda sepertimana yang diarahkan oleh doktor. Beritahu semua doktor, doktor pergigian dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Cetyrec-AP. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa sedang mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda. Jangan berkongsi Cetyrec-AP dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Anda perlu berhati-hati jika mengambil Cetyrec-AP dan alcohol pada masa yang sama. Pada orang yang sensitif, boleh menyebabkan penurunan kewaspadaan dan penurunan prestasi. Jangan melebihi dos yang disyorkan dan anda harus mengambil kira bagaimana ubat ini akan mempengaruhi anda jika anda berhasrat untuk memandu, melakukan aktiviti yang berpotensi berbahaya atau mengendalikn mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Cetyrec-AP boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan sampingan yang diperhatikan berkaitan dengan penggunaan Cetyrec-AP disenaraikan di bawah:
Gastrointestinal: Sembelit, Cirit-birit, Gigi yang menyakitkan
Neurologi: Asthenia, Pernafasan
Somnolence: Nasopharyngitis, Pharyngitis, Xerostomia
Lain-lain: Keletihan, Demam
Gastrointestinal: Constipation, Diarrhea, Painful teething
Neurologic: Asthenia, Somnolence
Respiratory: Nasopharyngitis, Pharyngitis, Xerostomia
Other: Fatigue, Fever

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Storage and Disposal of Cetyrec-AP

-Penyimpanan

Jauhi dari kanak-kanak. Tarikh luput pek ini dicetak pada kotak. Jangan gunakannya selepas tarikh ini. Jangan simpan di atas 30°C.

-Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet bersalut filem biconvex, bujur, putih. Satu sisi mempunyai skor dan huruf "L" dan "C" di setiap sisi. Bahagian lain mempunyai angka "5". Bentuk dos: Tablet bersalut filem. Pembungkusan: 10 tablet dalam blister Aluminium-Aluminium, yang

dibungkus dalam kotak kadbod 5 blister.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif
Setiap tablet bersalut filem mengandungi 5mg levocetirizine dihydrochloride.
Bahan tidak aktif
Colloidal silicon dioxide, Granulated lactose, Microcrystalline cellulose PH 102, PVP-CL, Magnesium stearate, HPMC E15, HPMC E50, Talcum, Titanium dioxide, Propylene glycol

MAL number:

MAL23056024AZ

Pengilang

COMMUNITY PHARMACY
PUBLIC COMPANY LIMITED
1 Soi Khubon 11, Ramintra,
Kannayao, Bangkok 10230, Thailand

Pemegang Pendaftaran Produk

STADPHARM
E-9-01, Oasis Square, Ara Damansara,
No.2 Jalan PJU 1A/7A, 47301
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

03/01/2025

Nombor Siri

NPRA (R2)22/042