

ACYCLOVIR AUXILTO CREAM

Acyclovir (5% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Acyclovir Auxilto Cream.
2. Bagaimana Acyclovir Auxilto Cream berfungsi.
3. Sebelum menggunakan Acyclovir Auxilto Cream.
4. Cara menggunakan Acyclovir Auxilto Cream
5. Semasa menggunakan Acyclovir Auxilto Cream
6. Kesan-kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Acyclovir Auxilto Cream.
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP.
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Acyclovir Auxilto Cream

Acyclovir Auxilto Cream digunakan untuk merawat kudis selesema dan jangkitan genital yang disebabkan oleh virus herpes simpleks.

Bagaimana Acyclovir Auxilto Cream berfungsi

Acyclovir Auxilto Cream mengandungi sejenis ubat yang dikenali sebagai acyclovir. Ia tergolong dalam satu kumpulan ubat yang dikenali sebagai antivirus.

Acyclovir Auxilto Cream berfungsi dengan membunuh atau menghentikan pertumbuhan virus yang menyebabkan kudis selesema atau herpes genital.

Sebelum menggunakan Acyclovir Auxilto Cream

– Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna Acyclovir Auxilto Cream jika:

- anda alah terhadap acyclovir, valacyclovir atau bahan lain yang disenaraikan di akhir risalah ini

– Sebelum menggunakan Acyclovir Auxilto Cream

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika:

- anda mempunyai satu keadaan di mana sistem imun anda tidak berfungsi dengan baik dan badan anda kurang mampu untuk melawan jangkitan (cth. jika anda mempunyai human

immunodeficiency virus (HIV) atau AIDS atau jika anda telah menjalani pemindahan sumsum tulang)

Kehamilan dan penyusuan anak

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk nasihat sebelum menggunakan sebarang ubat.

– Jika mengguna ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil atau baru-baru ini telah mengambil sebarang ubat. Ini termasuk produk tradisional atau ubat-ubat yang dibeli tanpa preskripsi

Cara menggunakan Acyclovir Auxilto Cream

– Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa menggunakan Acyclovir Auxilto Cream seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Tanya doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Dewasa dan kanak-kanak

- Sapu satu lapisan nipis krim pada bahagian yang terjejas lima kali sehari.
- Anda harus selangkan setiap sapuan Acyclovir Auxilto Cream selama 4 jam. Masa yang dicadangkan ialah: 7am, 11am, 3pm, 7pm dan 11pm
- Jika kudis selesema anda tidak sembuh selepas 4 hari, atau kudis herpes genital anda tidak sembuh selepas 5 hari, anda boleh menggunakan krim ini untuk 5 hari lagi
- Jika bahagian terjejas masih tidak sembuh selepas ini, berhenti menggunakan krim ini dan beritahu doktor anda

Sapuan krim

- Acyclovir Auxilto Cream tidak harus digunakan di dalam mulut, mata atau faraj anda
- Anda tidak harus campurkan Acyclovir Auxilto Cream dengan apa-apa sebelum anda menggunakannya, walaupun air
- Sentiasa mencuci tangan anda sebelum dan selepas anda menggunakan krim ini

– Bila perlu digunakan

Guna seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

– Berapa lama perlu digunakan

Terus menggunakan Acyclovir Auxilto Cream untuk jangka masa yang diarahkan oleh doktor anda. Jika kudis selesema anda tidak sembuh selepas 4 hari, atau kudis herpes genital anda tidak sembuh selepas 5 hari, anda boleh menggunakan krim ini untuk 5 hari lagi.

– Jika terlupa menggunakan

Gunakannya sebaik sahaja anda teringat, namun, jika sudah hampir masa sapuan seterusnya, abaikan sapuan yang terlupa.

Jangan gunakan dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa.

– Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda menggunakan terlalu banyak Acyclovir Auxilto Cream. Acyclovir Auxilto Cream hanya untuk digunakan pada kulit sahaja, sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda tertelan krim ini.

Semasa menggunakan Acyclovir Auxilto Cream

– Perkara yang perlu dilakukan

Berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat anda dan menggunakannya seperti yang dipreskripsikan oleh doktor anda.

– Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan mengguna sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda
- Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai tanda atau

– Perkara yang perlu diberi perhatian

Acyclovir Auxilto Cream tidak harus digunakan di dalam mulut, mata atau faraj. Acyclovir Auxilto Cream mungkin menyebabkan iritasi kulit.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua

ACYCLOVIR AUXILTO CREAM

Acyclovir (5% w/w)

orang mendapatkannya. Kesan-kesan sampingan berikut mungkin berlaku dengan ubat ini:

Reaksi alahan

Jika anda mengalami reaksi alahan, berhenti mengambil Acyclovir Auxilto Cream dan jumpa doktor dengan segera, tandatanda termasuk

- ruam, kegatalan atau gatal- gatal pada kulit anda
- bengkak pada muka, bibir, lidah atau bahagian badan anda yang lain
- kesesakan nafas, berdehit atau kesukaran bernafas
- demam panas yang tidak dapat dijelaskan (suhu tinggi) dan rasa pengsan, terutamanya semasa berdiri

Kesan-kesan sampingan lain termasuk:
Tidak lazim berlaku

- sensasi pedih atau terasa mencucuk selepas menyapu krim yang hilang dengan sendiri
- kulit kering atau mengelupas yang ringan
- kegatalan

Jarang-jarang sekali berlaku

- kemerahan kulit anda
- ruam kulit

Jika mana-mana kesan sampingan ini bertambah serius, atau jika anda mendapati sebarang kesan sampingan yang tidak tersenarai dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui web npa.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)* or *Vaccines (AEFI)*]

Cara penyimpanan dan pelupusan Acyclovir Auxilto Cream

– Penyimpanan

Jauhkan daripada kanak-kanak. Mesti disimpan dalam pek asal di bawah suhu 30°C.

Jangan gunakan Acyclovir Auxilto Cream selepas tarikh luput yang tercetak pada karton.

– Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah.

Tanya ahli farmasi anda mengenai cara yang betul. Amalan ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

– Rupa dan warna produk

Acyclovir Auxilto Cream adalah krim licin, putih, dengan bau ciri, bebas daripada gumpalan, atau benda asing

– Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Acyclovir.

Bahan Tidak Aktif:

Cetostearyl alcohol, Liquid paraffin, Propylene glycol, Sodium laurilsulfate, Poloxamer 407, White soft paraffin, Purified water

– Nombor MAL

MAL23086015ACZ

Manufacturer

Medinfar Manufacturing, S.A
Parque Industrial Armando Martins
Tavares
Rua Outeiro da Armada, 5
Condeixa-a-Nova, 3150-194 Sebal
Portugal

Pemegang Pendaftaran Produk

STADPHARM SDN BHD
E-9-01, Oasis Square, Ara Damansara
No: 2, Jalan PJU 1A/7A 47301 Petaling
Jaya, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

09/11/2023

Nombor Siri

NPRA (R2) 23/049