

PARTAMOL TAB. TABLETS 500MG

Paracetamol 250mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Partamol Tab. Tablets 500mg
2. Bagaimana Partamol Tab. Tablets 500mg berfungsi.
3. Sebelum menggunakan Partamol Tab. Tablets 500mg.
4. Cara menggunakan Partamol Tab. Tablets 500mg.
5. Semasa menggunakan Partamol Tab. Tablets 500mg.
6. Kesan-kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Partamol Tab. Tablets 500mg.
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk.
11. Tarikh kemaskini RiMUP.
12. Nombor Siri

Apakah kegunaan Partamol Tab. Tablets 500mg

Paracetamol adalah analgesik ringan dan antipiretik, dan disyorkan untuk rawatan sakit dan demam, contohnya, sakit kepala termasuk migrain dan sakit kepala tegang, sakit gigi, sakit pinggang, sakit reumatik dan otot, dismenorea, sakit tekak, dan untuk melegakan demam, sakit dan sakit selsema dan selesema. Juga disyorkan untuk melegakan simptom kesakitan akibat arthritis yang tidak serius.

Bagaimana Partamol Tab. Tablets 500mg

Paracetamol adalah analgesik dan antipiretik. Mekanisme tindakan mungkin serupa dengan aspirin dan bergantung pada perencatan sintesis prostaglandin. Perencatan ini adalah secara terpilih.

Sebelum menggunakan Partamol Tab. Tablets 500mg

• Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan jika anda alah kepada paracetamol atau mana-mana bahan lain dalam produk ini.

Jangan gunakan ubat ini jika anda mengambil sebarang ubat preskripsi atau bukan preskripsi lain yang mengandungi paracetamol untuk merawat sakit, demam, simptom selsema dan selesema, atau untuk membantu tidur.

Jangan ambil PARTAMOL TAB. TABLETS 500MG jika anda hamil, cuba hamil atau fikir anda mungkin hamil.

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil sebarang ubat.

-Sebelum mula menggunakan

Sila beritahu doktor jika:

- mempunyai masalah hati atau buah pinggang.
- berat badan yang kurang atau kekurangan zat makanan.
- kerap minum alkohol.

Anda mungkin perlu mengelak daripada menggunakan produk ini sama sekali atau menghadkan jumlah paracetamol yang anda ambil. Semak dengan doktor anda sebelum digunakan jika:

- anda mempunyai jangkitan yang teruk kerana ini boleh meningkatkan risiko asidosis metabolik. Tanda-tanda asidosis metabolik termasuk: nafas cetek, cepat, sukar bernafas, berasa sakit (loya), sakit (muntah), hilang selera makan. Hubungi doktor dengan segera jika anda mendapat gejala-gejala ini.

Sila berjumpa doktor anda jika simptom anda tidak bertambah baik. Anda boleh mengambil produk ini dengan ulser perut. Anda boleh mengambil produk ini semasa menyusui.

-Jika mengguna ubat-ubat lain

Semak dengan doktor anda sebelum digunakan jika anda mengambil warfarin atau ubat-ubatan yang serupa yang digunakan untuk menipiskan darah.

Sentiasa baca dan ikut label.

Jauhkan ubat dari pandangan dan capaian kanak-kanak.

Tempoh maksimum penggunaan berterusan tanpa nasihat perubatan: 3 hari.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil apa-apa ubat lain, termasuk apa-apa ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan. Sesetengah ubat dan produk ini boleh mengganggu satu sama lain.

Cara menggunakan Partamol Tab. Tablets 500mg

• Berapa banyak harus digunakan

- Dewasa (termasuk warga tua) dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas: 1 hingga 2 tablet diambil setiap 4 hingga 6 jam mengikut keperluan. Dos harian maksimum: 4000mg.
- Kanak-kanak, 6 hingga 11 tahun: ½ - 1 tablet setiap 4 hingga 6 jam mengikut keperluan. Dos harian maksimum: 2000mg. Jangan melebihi dos yang dinyatakan. Dos terendah yang diperlukan untuk mencapai keberkesanan harus digunakan. Jangan ambil lebih kerap daripada setiap 4 jam. Ikuti semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan berhati-hati. Ia mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan bantuan.

-Bila perlu digunakan

Diambil setiap 4 hingga 6 jam mengikut keperluan.

Dewasa (termasuk warga tua) dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas: Dos harian maksimum 4000mg (8 tablet dalam 24 jam).

Kanak-kanak 6 hingga 11 tahun: Dos harian maksimum 2000mg (4 tablet dalam 24 jam).

Selang dos minimum: 4 jam.

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan pengambilan PARTAMOL TAB. TABLETS 500MG selama yang disyorkan oleh doktor anda.

Jika gejala berterusan selama lebih daripada 3 hari, sila berjumpa doktor anda

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda tentang perkara yang perlu anda lakukan jika anda terlupa menggunakannya.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Jika hampir tiba masanya untuk dos seterusnya, tunggu sehingga kemudian untuk mengambil ubat dan langkau dos yang terlepas. Jangan ambil dos berganda untuk menebus dos yang terlepas.

PARTAMOL TAB. TABLETS 500MG

Paracetamol 250mg

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil lebih banyak ubat daripada anda perlu mendapatkan nasihat perubatan dengan segera. Terlebih dos paracetamol boleh menyebabkan kegagalan hati.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda jika anda fikir anda atau orang lain mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Semasa menggunakan Partamol Tab. Tablets 500mg

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda betul-betul seperti yang diberitahu oleh doktor anda atau mengikut arahan pada pek. Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Partamol Effervescent Granules 250mg. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan melebihi dos yang dinyatakan. Jangan mengambil lebih daripada 4000mg paracetamol setiap hari (dewasa dan kanak-kanak melebihi 12 tahun).

Jangan mengambil lebih daripada 2000mg paracetamol setiap hari (kanak-kanak, 6 hingga 11 tahun). Tidak disyorkan untuk kanak-kanak di bawah umur 6 tahun.

Jangan ambil selama lebih daripada 3 hari tanpa bertanya kepada doktor anda. Jangan berhenti mengambil ubat melainkan dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor anda. Jangan berikan PARTAMOL TAB. TABLETS 500MG kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda. Jangan ambil dengan mana-mana produk lain yang mengandungi paracetamol.

-Perkara yang perlu diberiperhatian

AMARAN

Ubat ini mengandungi PARACETAMOL. Jangan mengambil ubat lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama.

Amaran alergi: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Antara gejala-gejalanya termasuk kemerahan pada kulit, lepuh atau ruam. Gejala-gejala seperti di atas menunjukkan tandatanda keadaan yang serius. Sekiranya tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan ubat ini dan dapatkan bantuan dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Berhenti mengambil ubat ini dan beritahu doktor anda dengan segera jika:

- anda mengalami reaksi alahan seperti ruam kulit atau gatal-gatal, kadangkala dengan masalah pernafasan atau bengkak pada bibir, lidah, tekak atau muka.
- anda mengalami ruam kulit atau mengelupas, atau ulser mulut.
- anda pernah mengalami masalah pernafasan dengan aspirin atau anti-radang bukan steroid sebelum ini, dan mengalami reaksi yang sama dengan produk ini.
- anda mengalami lebam atau pendarahan yang tidak dapat dijelaskan

Reaksi ini jarang berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)* or *Vaccines (AEFI)*]

Cara penyimpanan dan pelupusan Partamol Tab. Tablets 500mg

• Penyimpanan

Jauhkan daripada capaian.

Simpan dalam bekas tertutup baik, di tempat yang kering, lindungi daripada cahaya.

Jangan simpan melebihi 30°C.

Jangan gunakan PARTAMOL TAB.

TABLETS 500MG selepas tarikh luput yang dinyatakan pada karton.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda mengenai cara yang betul. Amalan ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

• Rupa dan warna produk

Tablet putih, berbentuk bulat, terukir "PARACETAMOL" pada satu bahagian dan garisan boleh pecah di bahagian lain.

• Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:
Paracetamol

Bahan Tidak Aktif:
Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Povidone K90, Magnesium stearate.

• Nombor MAL

MALXXXX

Manufacturer

STELLAPHARM J.V. CO., LTD. - BRANCH 1

(A Joint Venture Company of Auxilto GmbH, Germany)

No. 40 Tu Do Avenue, Vietnam-Singapore Industrial Park, An Phu Ward, Thuan An, Binh Duong Province, Vietnam.

Pemegang Pendaftaran Produk

STADPHARM SDN BHD

E-9-01, Oasis Square, Ara Damansara No: 2, Jalan PJU 1A/7A 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

15/07/2024

Nombor Siri

NPRA (R2) 24/097