

M-BREX

Methyl Salicylate (5000mg/100ml) / Menthol (5200mg/100ml) / Camphor (5200mg/100ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan M-Brex.
2. Bagaimana M-Brex berfungsi.
3. Sebelum menggunakan M-Brex.
4. Cara menggunakan M-Brex.
5. Semasa menggunakan M-Brex.
6. Kesan-kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan M-Brex.
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk.
11. Tarikh kemaskini RiMUP.

Apakah kegunaan M-Brex

Ketegangan, sakit otot, sakit sendi, lenguh anggota badan, lebam, terseliuh, sakit pinggang dan radang dingin (bengkak kecil yang gatal yang disebabkan oleh kesejukan).

Bagaimana M-Brex berfungsi

M-Brex mengandungi bahan-bahan aktif berikut iaitu methyl salicylate, menthol dan camphor (kapur barus). Methyl salicylate ialah analgesik topikal (penahan sakit) manakala menthol dan kapur barus mempunyai kesan penyejukan pada kulit yang mengalihkan tumpuan anda daripada rasa sakit pada otot dan sendi anda..

Sebelum menggunakan M-Brex

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan ubat ini jika :
-anda mempunyai alahan terhadap Methyl salicylate, Menthol, Camphor atau mana-mana bahan yang lain di dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).

-Sebelum mula menggunakan

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandungi, merancang untuk mengandungi atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

-Jika mengguna ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Berhati-hati semasa menggunakan ubat ini jika anda mengambil warfarin. (Sapuan berlebihan boleh meningkatkan risiko pendarahan)

Cara menggunakan M-Brex

Untuk kegunaan luaran sahaja.

-Berapa banyak harus digunakan

Sapukan pada kawasan yang sakit dengan secukupnya.

-Bila perlu digunakan

Sapukan 2 hingga 3 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan M-Brex untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi.

-Jika terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan bantuan perubatan segera.

Semasa menggunakan M-Brex

-Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor. Beritahu doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan M-Brex.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini. Basuh tangan selepas menyapu ubat untuk mengelakkan sebarang kerengsaan pada mata.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

-Elakkan daripada terkena pada mata. Bilas dengan air secukupnya jika terkena mata.

-Jangan sapukan pada luka atau kulit yang rosak.

-Jangan berikan M-Brex kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama

seperti anda.

-Perkara yang perlu diberiperhatian

Kulit mungkin akan kelihatan merah pada mulanya, terutama apabila digunakan oleh individu yang mempunyai kulit sensitif, tetapi ini akan segera hilang. Elakkan sapuan terus ke dalam lubang hidung kanak-kanak. Ini adalah kerana ubat ini mengandungi kapur barus. Walaupun kuantiti yang sedikit digunakan dengan cara ini boleh menyebabkan sawan. Perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak apabila menggunakan ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Ruam, kemerahan, bengkak dan kegatalan mungkin berlaku

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers ➔ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan M-Brex

-Penyimpanan

Jauhkan daripada kanak-kanak. Simpan di bawah suhu 30°C.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Cecair jernih dalam penutup botol plastik putih dengan aplikator getah span.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Methyl Salicylate, Menthol, Camphor
- Bahan tidak aktif
Vanillylamide and ethyl alcohol (95 %)

- Nombor MAL:

M-BREX

Methyl Salicylate (5000mg/100ml) / Menthol (5200mg/100ml) / Camphor (5200mg/100ml)

Manufacturer

MacroPhar Co.,Ltd
89 Soi Pattanakarn 20 Yaek 4,
Pattanakarn Road., Suan Luang,
Bangkok 10250, Thailand.

Pemegang Pendaftaran Produk

STADPHARM SDN BHD
E-9-01, Oasis Square, Ara Damansara
No: 2, Jalan PJU 1A/7A 47301 Petaling
Jaya, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

18/09/2024

Nombor Siri

NPRA (R2) 24/108