

SAFERCARE HAND SANITIZER WITH CHG

Isopropyl Alcohol 75%v/v, Chlorhexidine Gluconate 0.5%w/v

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan SaferCare
2. Bagaimana SaferCare berfungsi
3. Sebelum menggunakan SaferCare
4. Cara menggunakan SaferCare
5. Semasa menggunakan SaferCare
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan SaferCare
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan SaferCare

SaferCare ialah untuk kebersihan dan antiseptik.

Bagaimana SaferCare berfungsi

Chlorhexidine digluconate ialah biguanida kationik yang boleh memberi kesan maut pada sel bakteria melalui interaksi tidak spesifik dengan fosfolipid berasid membran sel manakala isopropil alkohol adalah antiseptik spektrum luas yang cepat bertindak bakteria dan bertindak cepat tetapi tidak dianggap berterusan. Mekanisme tindakannya kelihatan seperti denaturasi protein.

Sebelum menggunakan SaferCare

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna sekiranya anda alah terhadap sebarang bahan kandungan dalam SaferCare.

- Sebelum menggunakan

SaferCare mengandungi *chlorhexidine*. Maklumkan kepada pengamal perubatan anda jika anda alah terhadap *chlorhexidine*.

Berhenti menggunakan produk ini dan meminta bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami ruam, gatal-gatal, bengkak, sesak nafas, pening atau degupan jantung yang cepat.

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Alkohol tidak boleh bersentuhan dengan beberapa vaksin dan suntikan ujian kulit (ujian tampalan). Jika ragu-ragu, rujuk literatur pengilang vaksin.

Cara menggunakan SaferCare

- Berapa banyak harus digunakan

Sapu jumlah yang mencukupi pada tapak tangan. Sapukan dan gosok ke belakang tangan dan hujung jari sehingga kering.

Untuk kegunaan luar sahaja.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Teruskan menggunakannya seperti yang diarahkan oleh doktor anda atau ikut arahan pada label pek.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Tidak ada laporan mengenai kejadian ini dan sifat produk menjadikannya tidak mungkin.

Semasa menggunakan SaferCare

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi tentang ubat lain yang anda sedang ambil.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Tanya pengamal perubatan anda apa-apa soalan yang anda mungkin ada tentang bagaimana untuk menggunakan SaferCare.

Kesan-kesan sampingan

Gangguan sistem imun.

Kekerapan tidak diketahui:

Hipersensitiviti termasuk *anaphylactic shock*.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan atau laman web npra.moh.gov.my [Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan SaferCare

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C, jauhkan daripada tempat yang panas, api dan cahaya matahari. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah.

Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Deskripsi Produk

- Rupa dan warna produk

Larutan jernih tanpa warna dengan bau flora and alkohol.

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Chlorhexidine Gluconate Solution, isopropyl alcohol
- Bahan tidak aktif
Glycerin, fragrance, purified water

- Nombor MAL:

MALXXXXXX

Pengilang

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Hana Medic Sdn Bhd
No. 3, Jalan Nilam 3/1, Kaw.
Perindustrian Nilai Utama, 78100 Nilai,
Negeri Sembilan.

Tarikh kemaskini RiMUP

10.01.2023

Nombor Siri

NPRA (R2) 22/172