

THREE LEGS YELLOW LOTION

Acriflavine 0.1%w/v

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Three Legs Yellow Lotion
2. Bagaimana Three Legs Yellow Lotion berfungsi
3. Sebelum menggunakan Three Legs Yellow Lotion
4. Cara menggunakan Three Legs Yellow Lotion
5. Semasa menggunakan Three Legs Yellow Lotion
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Three Legs Yellow Lotion
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Three Legs Yellow Lotion

Ubat ini digunakan sebagai antiseptic bagi kecederaan kulit seperti lukat, melecet, luka bernanah dan luka akibat terbakar.

Bagaimana Three Legs Yellow Lotion berfungsi

Ia mengandungi acriflavine sebagai antiseptik yang bertindak lambat.

Sebelum menggunakan Three Legs Yellow Lotion

- Bila tidak boleh menggunakan
Jangan guna sekiranya anda alah terhadap acriflavine.

Tidak boleh dimakan. Untuk kegunaan luar sahaja. Jika symptoms berlarutan, sila rujuk kepada doktor anda.

Berhenti sapu jika berlaku iritasi.

Penggunaan ubat ini untuk jangkamasa yang panjang akan melambatkan penyembuhan luka.

- Sebelum menggunakan Ubat Serbuk Cap Kaki Tiga

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan ahli farmasi atau doctor anda sekiranya anda ada mengambil ubat yang lain.

Cara menggunakan Three Legs Yellow Lotion

- Berapa banyak harus digunakan

Bersihkan bahagian terlibat dan sapu ubat ini 2 hingga 3 kali sehari.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Sekiranya anda lupa untuk menggunakannya, gunakannya sebaik sahaja anda mengingatkan. Teruskan menggunakannya seperti yang diarahkan oleh doktor anda atau ikut arahan pada label pek

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan.

Semasa menggunakan Three Legs Yellow Lotion

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan ahli farmasi atau doctor anda semua ubat yang anda sedang ambil.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Three Legs Yellow Lotion dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama..

Kesan-kesan sampingan

Aplikasi acriflavine boleh menyebabkan photosensitivity.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami

sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Three Legs Yellow Lotion

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya dan kelembapan. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair berwarna oren merah dan tanpa bau.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Acriflavine

- Bahan tidak aktif
Air deionised

- Nombor MAL

MAL19970106XZ

Dikilang oleh Pemegang Pendaftaran Produk

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

10/10/2018

Nombor Siri

NPRA(R2/1)210113/596