

THREE LEGS YELLOW BALSEM

Methyl Salicylate 13.5%w/w, Menthol 7.5%w/w, Camphor 7%w/w

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Three Legs Yellow Balsem
2. Bagaimana Three Legs Yellow Balsem berfungsi
3. Sebelum menggunakan Three Legs Yellow Balsem
4. Cara menggunakan Three Legs Yellow Balsem
5. Semasa menggunakan Three Legs Yellow Balsem
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Three Legs Yellow Balsem
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Three Legs Yellow Balsem

Ia digunakan untuk melegakan sakit otot, sakit reumatik dan sakit urat.

Bagaimana Three Legs Yellow Balsem berfungsi

Methyl salicylate, *menthol* dan *camphor* adalah analgesik luaran yang merangsang rasa kehangatan dan/ atau sejuk. Ini menghasilkan tindakbalas yang merengsa yang memberikan kelegaan sementara sakit ringan pada otot dan sendi yang berkaitan dengan sakit belakang, artritis, ketegangan dan seliuh.

Sebelum menggunakan Three Legs Yellow Balsem

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna sekiranya anda mempunyai alahan terhadap sebarang bahan kandungan dalam Three Legs Yellow Balsem.

- Sebelum menggunakan

Pada mulanya sapu kuantiti yang kecil pada kawasan kulit yang terhad dan memperhatikan sama ada ketidakselesaan atau kegatalan berlaku sebelum sapu pada kawasan kulit yang

luas. Jika iritasi kulit berlaku, sila berhenti menggunakannya.

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Mengandung dan menyusukan anak

Jangan guna sekiranya anda sedang mengandung atau sedang menyusui.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, Jika anda sedang mengambil warfarin, sila rujuk kepada doktor anda sebelum menggunakan produk ini.

Cara menggunakan Three Legs Yellow Balsem

- Berapa banyak perlu digunakan

Sapu pada bahagian terbabit 2 hingga 3 kali sehari.

Untuk kegunaan luar sahaja. Tidak boleh dimakan.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Teruskan menggunakannya seperti yang diarahkan oleh doktor anda atau ikut arahan pada label pek.

- Jika mengambil berlebihan

(terlebi dos)

Keracunan salisilat kronik ringan atau salisilisme biasanya berlaku hanya selepas penggunaan berulang

kali dengan dos yang besar.

Salisilisme juga boleh berlaku berikutan penggunaan salisilat topikal yang berlebihan. Gejala termasuk pening, tinitus, pekak, sumpah, mual dan muntah, sakit kepala dan kekeliruan. Ini boleh dikawal dengan mengurangkan dos.

Semasa menggunakan Three Legs Yellow Balsem

- Perkara yang perlu dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ubat ini boleh menyebabkan sawan. Ubat ini tidak sesuai untuk bayi di bawah umur 2 tahun dan perhatian perlu diberikan kepada kanak- kanak berumur 2 tahun ke atas apabila menggunakannya. Sapu ubat yang mengandungi camphor pada hidung kanak- kanak adalah merbahaya kerana boleh menyebabkan pengsan.

Jauhkan dari bahagian mata dan membran mukus. Jangan guna pada luka atau kulit yang rosak. Jangan gunakan secara meluas pada bahagian badan atau membalut.

Tanya penjagaan perubatan kesihatan anda apa- apa soalan yang anda mungkin ada tentang bagaimana untuk menggunakan Three Legs Yellow Balsem

Kesan-kesan sampingan

Iritasi kulit, kemerahan, bengkak, rasa pedih berlaku Reaksi buruk jarang berlaku, symptom pening, loya boleh berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan atau laman web npra.gov.my

THREE LEGS YELLOW BALSEM

Methyl Salicylate 13.5%w/w, Menthol 7.5%w/w, Camphor 7%w/w

[Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Three Legs Yellow Balsem

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.
Lindungi daripada cahaya. Jauhkan
daripada capaian kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan
melalui air buangan atau sisa isi
rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi
anda mengenai cara yang betul untuk
melupuskan ubat yang tidak
diperlukan lagi. Langkah-langkah ini
dapat membantu melindungi alam
sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Salap yang berwarna kuning dan
berbau menthol.

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Menthol, camphor, methyl salicylate

- Bahan tidak aktif

*Clove oil, eucalyptus oil, vanillin
powder, beta carotene, white soft
paraffin, hard paraffin*

- Nombor MAL:

MAL20013176X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

06/06/2025

Nombor Siri

NPRA(R2/1)200703/476