

WINLYKAH ANTI- ITCH CREAM

Menthol 6.5%w/w, Methyl Salicylate 6%w/w, Camphor 5%w/w

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Anti-Itch Cream
2. Bagaimana Anti-Itch Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Anti-Itch Cream
4. Cara menggunakan Anti-Itch Cream
5. Semasa menggunakan Anti-Itch Cream
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Anti-Itch Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Anti- Itch Cream

Ia digunakan untuk menenangkan dan melegakan kegatalan yang disebabkan oleh gigitan nyamuk dan serangga.

Bagaimana Anti- Itch Cream berfungsi

Ia mengandungi mentol, camphor dan metil salisilat. Kamfor adalah perangsang, rubefasien, antipruritik dan antiseptik lemah. Apabila digabungkan dengan ramuan lain seperti mentol, metil salisilat, ia menjadi sesuai untuk neuralgia dan kawasan-kawasan lain yang sakit. Menthol dilat saluran darah dan menyebabkan sensasi kesejukan, diikuti dengan kesan analgesik. Mentol juga bertindak sebagai penambah penembusan, meningkatkan penembusan ubat-ubatan apabila digunakan pada kulit, untuk memberi permulaan tindakan yang lebih cepat. Metil salisilat adalah derivatif asid salisilik. Salisilat menghalang siklooksigenase, dengan itu mengurangkan pembentukan prostaglandin dan menyebabkan disfungsi platelet. Metil salisilat digunakan secara topikal sebagai perengsa lawan. Selepas aplikasi, ia diserap melalui kulit dan digunakan untuk melegakan kesakitan reumatik dan kesakitan otot atau sendi.

Sebelum menggunakan Anti- Itch Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna sekiranya anda alah terhadap sebarang bahan kandungan lain dalam Anti-Itch Cream ini.

Boleh menyebabkan konvulsi. Ubat ini tidak sesuai untuk kanak- kanak di bawah umur 2 tahun dan perhatian perlu diberikan kepada kanak- kanak berumur 2 tahun ke atas apabila menggunakannya. Sapu ubat yang mengandungi camphor pada hidung kanak- kanak adalah berbahaya kerana boleh menyebabkan pengsan.

- Sebelum menggunakan

Pada mulanya sapu kuantiti yang kecil pada kawasan kulit yang terhad dan memerhati sama ada ketidakselesaan atau gatal berlaku sebelum sapu pada kawasan kulit yang lebih besar. Jika iritasi kulit berlaku, sila berhenti menggunakannya.

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi tentang ubat lain yang anda sedang ambil.

Penyapuan yang berlebihan oleh pesakit yang mengambil warfarin mungkin meningkatkan risiko pendarahan.

Cara menggunakan Anti- Itch Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan krim pada bahagian yang berkenaan dengan lembut. Diulangi sekiranya perlu. Basuhkan tangan secara menyeluruh sebelum dan selepas guna.

Untuk kegunaan luar sahaja. Tidak boleh dimakan.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Sekiranya anda lupa untuk menggunakannya, gunakannya sebaik sahaja anda mengingat. Teruskan menggunakannya seperti yang diarahkan oleh doktor anda atau ikut arahan pada label pek.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Simptom dos berlebihan metil salisilat Intoksikasi salisilat boleh berlaku selepas pengingesan atau aplikasi topikal metil salisilat. Keracunan salisilat kronik yang ringan atau salisimisme biasanya berlaku hanya selepas penggunaan berulang dalam dos yang besar. Salisimisme juga boleh berlaku ikutan aplikasi topical salisilat yang berlebihan. Simptom termasuk kepeningan, tinitus, kepekakan, berpeluh, loya dan muntah, sakit kepala dan kekeliruan dan boleh dikawal dengan mengurangkan dos. Simptom keracunan yang lebih teruk atau keracunan akut diikuti dengan dos berlebihan termasuk hiperventilasi, demam, keresahan, ketosis dan alkalosis respiratori dan asidosis metabolik. Depresi SSP boleh menyebabkan koma; Keruntuhan kardiovaskular dan kegagalan pernafasan juga mungkin berlaku.

Simptom dos berlebihan kamfor/ mentol

Pengambilan kuantiti yang banyak telah dilaporkan boleh menyebabkan simptom seperti sakit perut yang teruk, loya, muntah, vertigo, ataksia, mengantuk dan koma; Bayi akan pengsan segera selepas aplikasi mentol atau kamfor ke lubang hidung mereka.

Penyitaan mungkin adalah tanda klinikal yang pertama untuk ketoksikan kamfor yang teruk; Walau bagaimanapun, penyitaan biasanya terhad kepada diri sendiri. Ketoksikan kamfor yang teruk boleh mengakibatkan delirium, halusinasi visual, edema serebrum dan status epileptikus. Ketoksikan sistemik termasuk hipotensi, takikardia, kegagalan pernafasan dan kematian.

Rawatan

Perut harus dikosongkan dengan lavaj gaster atau pengambilan arang diaktifkan secara oral. Pengurusan bendalir dan elektrolit adalah sangga rawatan untuk pembetulan asidosis, hiperpireksia,

WINLYKAH ANTI- ITCH CREAM

Menthol 6.5%w/w, Methyl Salicylate 6%w/w, Camphor 5%w/w

hipokalemia dan penyahhidratan jika hadir.

Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

Semasa menggunakan Anti- Itch Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Elakkan bersentuhan dengan mata dan membran mukus. Jangan memohon kepada luka atau kulit yang rosak. Elakkan penggunaan yang berlebihan semasa kehamilan dan penyusuan. Jangan gunakan secara meluas pada bahagian badan atau membalut.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Basuh tangan anda selepas menggunakan ubat.

Tanya pengamal perubatan kesihatan anda apa-apa soalan yang anda mungkin ada tentang bagaimana untuk menggunakan Anti-Itch Cream.

Kesan-kesan sampingan

Sakit kepala, pening, loya dan muntah, kerengsaan kulit, dermatitis sentuh, ruam, kegatalan, kemerahan atau pembengkakan, pembakaran atau rasa menyengat mungkin berlaku. Boleh menyebabkan tindak balas hipersensitifan / alergi pada sesetengah individu yang mempunyai masalah kulit sensitif.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78825490, atau laman web npra.moh.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Anti- Itch Cream

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Jauhkan daripada pancarun terus matahari.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Product Description

- Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih, mudah disapu, melekit dan mempunyai bau cirian.

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Menthol, camphor, methyl salicylate
- Bahan tidak aktif
Citronella oil, cetostearyl alcohol, cetomacrogol, white soft paraffin, liquid paraffin, chlorocresol, purified water

- Nombor MAL:

MALXXXXXXC

Pengilang

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

28/11/2019

Nombor Siri

NPRA (R2) 19/208