

UHC GLUCOSAMINE CHONDROITIN MSM KAPSUL

Glukosamina Sulfat 314mg, Kondroitin Sulfat 200mg, Methylsulfonylmethane 100mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan UHC Glucosamine Chondroitin MSM Kapsul
2. Bagaimana UHC Glucosamine Chondroitin MSM Kapsul berfungsi
3. Sebelum menggunakan UHC Glucosamine Chondroitin MSM Kapsul
4. Cara menggunakan UHC Glucosamine Chondroitin MSM Kapsul
5. Semasa menggunakan UHC Glucosamine Chondroitin MSM Kapsul
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan UHC Glucosamine Chondroitin MSM Kapsul
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Glucosamine Chondroitin MSM Kapsul

Ia digunakan sebagai terapi adjuvant untuk osteoarthritis (sakit sendi).

Bagaimana Glucosamine Chondroitin MSM Kapsul berfungsi

Ia mengandungi glucosamine yang boleh merangsang pengeluaran sebatian rawan-bangunan, memulihkan sel-sel rawan sendi dan mempunyai kebolehan anti-radang. Ia juga mengandungi kondroitin yang diperlukan untuk pembuatan sebatian rawan-rawan dan membantu menjaga kesihatan tulang rawan dengan menyerap dan mengekalkan air di dalam sendi serta MSM yang boleh membantu membentuk tisu penghubung.

Sebelum menggunakan UHC Glucosamine Chondroitin MSM Kapsul

- Bila tidak boleh menggunakan
Jangan guna sekiranya anda alah terhadap sebarang bahan kandungan dalam kapsul ini.

Jangan gunakan jika anda alah terhadap makanan laut.

- Sebelum menggunakan

Bukti yang ada tidak dapat disimpulkan atau digunakan pada wanita hamil atau menyusukan anak. Sehingga maklumat lanjut boleh didapati, produk ini hanya boleh digunakan di bawah penyeliaan perubatan semasa kehamilan dan ibu yang menyusukan anak jika potensi manfaat kepada ibu membenarkan risiko berpotensi untuk janin.

Pengambilan semasa 3 bulan pertama kehamilan mesti dielakkan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi tentang ubat lain yang anda sedang ambil.

Cara menggunakan UHC Glucosamine Chondroitin MSM Kapsul

- Berapa banyak harus diambilkan
Paling baik diambil pada perut kosong (30 minit sebelum makan).

Gejala osteoarthritis ringan atau sederhana:
2 kapsul yang diambil dua kali sehari untuk sekurang-kurangnya 6 minggu (atau mengikut preskripsi perubatan).

Gejala osteoarthritis yang teruk:
Terapi awal: 2 kapsul yang diambil 3 kali sehari disyorkan untuk sekurang-kurangnya 8 minggu

Ikuti semua arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan berhati-hati. Ia mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan bantuan.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Terapi penyelenggaraan perlu diikuti selama 3-4 bulan (atau mengikut preskripsi perubatan) dengan pengambilan 2 kapsul dua kali sehari.

Rawatan perlu diulangi setiap 6 bulan atau kurang mengikut preskripsi perubatan.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda telah menggunakan terlalu banyak UHC Glucosamine Chondroitin MSM Kapsul, hubungi doktor anda, jabatan kecemasan atau pusat keracunan dengan segera.

Semasa menggunakan UHC Glucosamine Chondroitin MSM Kapsul

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi tentang ubat lain yang anda sedang ambil.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan UHC Glucosamine Chondroitin MSM Kapsul kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

Kesan-kesan sampingan

Kardiovaskular: Edema peripheral (pengumpulan cecair menyebabkan bengkak), takikardia (jantung berdegup lebih cepat daripada biasa) dilaporkan dalam beberapa pesakit. Hubungan sebab akibat belum diwujudkan.

System saraf pusat: Rasa mengantuk, sakit kepala, insomnia (sukar untuk tidur) telah dilaporkan secara jarang semasa terapi (kurang daripada 1%).

Gastrointestinal: loya, muntah, cirit-birit, dipepsia (senak) atau sakit epigastric, sembelit, pedih ulu hati dan tiada selera makan telah dilaporkan secara jarang semasa terapi oral glukosamina.

Kulit: Reaksi kulit seperti eritema (kulit kemerahan) dan pruritus (kulit gatal) telah dilaporkan dalam pengambilan terapatik glukosamina.

UHC GLUCOSAMINE CHONDROITIN MSM KAPSUL

Glukosamina Sulfat 314mg, Kondroitin Sulfat 200mg, Methylsulfonylmethane 100mg

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web npra.moh.gov.my [Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Nombor Siri
NPRA(R2/1)190923/248

Cara penyimpanan dan pelupusan UHC Glucosamine Chondroitin MSM Capsule

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya dan kelembapan. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Product Description

- Rupa dan warna produk

Serbuk berwarna putih diisi dalam kapsul keras.
Warna kapsul: maroon- maroon.
Saiz kapsul 0
Tiada tanda pada kapsul.

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Glukosamina sulfat, kondroitin sulfat, MSM

- Nombor MAL:

MAL14115014X

Pengilang

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

01/08/2019