

# GENESSA FILM COATED TABLETS

Gefitinib (250mg)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Genessa
2. Bagaimana Genessa berfungsi
3. Sebelum mengambil Genessa
4. Cara menggunakan Genessa
5. Semasa menggunakan Genessa
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan & pelupusan Genessa
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Genessa

Genessa digunakan untuk merawat *non-small cell lung cancer*, yang merupakan salah satu jenis kanser paru-paru. Genessa digunakan untuk kanser pada peringkat lanjutan.

## Bagaimana Genessa berfungsi

Genessa mengandungi bahan aktif gefitinib. Gefitinib menghalang protein yang dikenali sebagai '*epidermal growth factor receptor*' (EGFR). Protein ini terlibat dalam pertumbuhan dan penyebaran sel-sel kanser.

## Sebelum mengambil Genessa

### - Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Genessa tablet jika ada alergik (hipersensitif) terhadap gefitinib atau mana-mana bahan kandungan Genessa tablet yang lain (Sila rujuk senarai bahan kandungan). Jika anda fikir anda mungkin alah, minta nasihat daripada doktor anda.

Genessa tidak digalakkan untuk penggunaan kanak-kanak atau remaja.

### - Sebelum mula mengambil

Sebelum mengambil Genessa:

- Beritahu doktor anda jika anda mempunyai atau pernah mengalami sebarang penyakit

paru-paru yang lain, selain daripada kanser paru-paru anda. Sebahagian daripada mereka mungkin menjadi lebih teruk semasa rawatan dengan Genessa.

- Beritahu doktor anda jika anda hamil atau mencuba untuk hamil. Anda harus mengelak daripada menjadi hamil semasa rawatan dengan Genessa.
- Beritahu doktor anda jika anda menyusukan bayi. Untuk keselamatan bayi anda, anda perlu berhenti menyusu semasa rawatan dengan Genessa.

### - Jika mengambil ubat-ubat lain

**Sila maklumkan kepada doktor anda** jika anda mengambil atau telah mengambil apa-apa ubat-ubatan (termasuk ubat-ubatan yang diambil masa lalu), walaupun ianya tidak dipreskripsi. Doktor anda terutamanya perlu tahu:

- jika anda mengambil mana-mana ubat-ubat berikut: phenytoin, carbamazepine, rifampicin, barbiturates, St John's Wort atau itraconazole, atau mana-mana ubat-ubat yang mengurangkan keasidan pada perut anda, seperti ranitidine. Ubat-ubatan ini boleh menjejaskan cara Genessa berfungsi.
- jika anda mengambil warfarin (untuk mengelakkan darah beku), kerana Genessa boleh mempengaruhinya. Doktor anda mungkin perlu memeriksa darah anda lebih kerap.

## Cara menggunakan Genessa

### - Berapa banyak harus digunakan & bila perlu digunakan

Ambil satu 250mg tablet, sekali sehari, sebaik-baiknya pada masa yang sama setiap hari. Anda boleh ambil Genessa dengan atau tanpa makanan.

Genessa tablet mesti diambil secara berterusan untuk ianya berkesan. Terus mengambil Genessa walaupun terdapat tanda-tanda pemulihan. Jangan berhenti

mengambil Genessa tablet melainkan jika diarahkan oleh doktor anda.

Bagi orang yang hanya mampu menelan cecair, tablet itu boleh dilarut dalam air. Tablet ini perlu dimasukkan ke dalam setengah gelas air minuman (tidak berkarbonat), tanpa dihancurkan, dan air dikacau sehingga tablet telah tersebar (kira-kira 15 minit) dan kandungan kemudiannya diminum serta-merta. Gelas perlu dibilas dengan setengah gelas air lagi dan kandungannya diminum.

Cecair ini juga boleh digunakan melalui satu tiub nasogastrik.

### - Berapa lama perlu digunakan

Ambil Genessa seperti yang diarahkan oleh pakar kesihatan anda.

### - Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil satu dos, ambil dos tertinggal sebaik saja anda ingat, selagi ianya sekurang-kurangnya 12 jam sebelum dos seterusnya.

Jika ianya kurang dari 12 jam sebelum dos seterusnya, jangan ambil dos yang tertinggal. Jangan mengambil dua dos pada masa yang sama untuk mengganti dos yang terlupa.

### - Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda ambil lebih daripada bilangan tablet yang diarahkan, hubungi doktor atau ahli farmasi dengan segera. Peningkatan kekerapan dan keterukan sebilangan kesan sampingan diperhatikan, terutamanya ciri- birit dan ruam.

## Semasa menggunakan Genessa

### - Perkara yang perlu dilakukan

Anda mesti terus ambil Genessa setiap hari mengikut arahan doktor anda. Arahan pada label patut mengingatkan anda tentang apa yang dipesan oleh doktor.

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

# GENESSA FILM COATED TABLETS

Gefitinib (250mg)

Jangan berhenti mengambil dos anda tanpa berbincang dengan pakar kesihatan anda.

Jangan gunakan Genessa tablet untuk merawat sebarang keadaan lain melainkan jika doktor memberitahu anda untuk berbuat demikian.

Jangan memberi atau mengesyorkan Genessa tablet kepada orang lain walaupun mereka mengalami keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

## Memandu & menggunakan mesin

Semasa rawatan dengan Genessa, kekurangan tenaga dan kekuatan dilaporkan dan orang yang mengalami simptom ini perlu berhati-hati apabila memandu atau menggunakan mesin.

## Kesan-kesan Sampingan

Sama seperti ubat-ubatan lain, Genessa mempunyai kesan sampingan. Ini biasanya ringan hingga sederhana. Jangan terkejut dengan senarai kesan sampingan. Anda mungkin tidak mempunyai mana-mana kesan sampingan.

Hubungi doktor anda tanpa berlembang-lembang jika mana-mana yang berikut berlaku kepada anda, kerana anda mungkin memerlukan pemeriksaan atau rawatan lanjut:

- Sesak nafas yang serius, atau sesak nafas secara tiba-tiba dan menjadi lebih teruk, mungkin dengan batuk atau demam. Sesetengah orang yang mendapat Genessa mendapatkan radang paru-paru yang dipanggil *interstitial lung disease*. Kesan sampingan ini adalah perkara biasa, dan beberapa orang telah meninggal dunia akibatnya.
- Pendarahan yang tidak dijangka, jika anda juga mengambil warfarin.
- Sesetengah orang mengalami

dehidrasi berikutan cirit-birit yang berterusan atau teruk, muntah-muntah, loya atau hilang selera makan.

- Masalah mata yang baru atau bertambah teruk, seperti sakit, kemerahan, mata berair, kepekaan cahaya atau perubahan kepada penglihatan anda. Sesetengah orang telah mengalami ulser pada permukaan mata (kornea), kadang-kadang dengan bulu mata tumbuh dalam mata; kesan sampingan ini tidak biasa.
- Tindak balas kulit yang teruk yang menjejaskan sebahagian besar badan anda termasuk kemerahan, kesakitan, ulser, lepuh, kulit mengelupas atau penglibatan bibir dan membran mukus (*toxic necrolysis epidermis, Stevens Johnson syndrome, erythema multiforme*). Tindak balas kulit jenis ini jarang berlaku.

Beritahu doktor anda jika apa-apa kesan sampingan yang berikut mengganggu anda:

Kesan-kesan sampingan yang sangat biasa:

- Cirit-birit
- Loya
- Reaksi kulit misalnya ruam yang kelihatan seperti jerawat, kadang-kadang gatal dengan kulit kering dan / atau kulit retak
- Muntah
- Hilang selera makan
- Kelemahan
- Mulut merah dan sakit

Kesan-kesan sampingan yang biasa:

- Mulut kering
- Masalah kuku
- Kehilangan rambut
- Mata kering
- Mata merah dan gatal
- Kelopak mata merah dan sakit

- Hidung berdarah dan darah dalam air kencing anda
- Demam
- Protein dalam air kencing anda (ditunjukkan dalam ujian air kencing)
- *Cystitis* (rasa pedih semasa kencing, dan keperluan mendesak dan kerap untuk membuang air kecil)
- Reaksi alahan, termasuk bengkak bibir, muka, lidah atau tekak dan geligata atau ruam netel

Kesan-kesan sampingan yang tidak biasa:

- Keradangan pankreas, dengan gejala seperti sakit yang amat teruk di bahagian atas kawasan perut dan loya teruk dan muntah-muntah
- Keradangan hati. Gejala termasuk berasa tidak sihat, kemungkinan dengan atau tanpa jaundis (kekuningan kulit dan mata). Ini kesan sampingan yang tidak biasa, namun sesetengah orang telah meninggal dunia disebabkan.
- Penembusan gastrousus
- Reaksi kulit di telapak tangan dan telapak kaki termasuk kesemutan, kebas, sakit, bengkak atau kemerahan (dikenali sebagai sindrom *palmar-plantar erythrodysaesthesia* atau sindrom tangan dan kaki)

Kesan-kesan sampingan yang jarang berlaku:

- Keradangan saluran darah di kulit. Ini boleh memberi kesan lebam atau tompok ruam pada kulit yang tidak akan hilang walaupun ditekan.
- *Cystitis* berdarah

Kesan-kesan sampingan yang berikut juga boleh berlaku dengan Genessa, dan ianya diperhatikan apabila ujian darah diambil:

- Perubahan paras enzim hati dan bilirubin. Jika tahap ini menjadi sangat tinggi, doktor anda mungkin perlu menghentikan

# GENESSA FILM COATED TABLETS

Gefitinib (250mg)

rawatan.

- Perubahan kepada tahap enzim hati yang dikenali sebagai *alanine aminotransferase* (ALT) adalah sangat biasa
- Perubahan kepada tahap bilirubin dan enzim hati lain yang dikenali sebagai *aspartate aminotransferase* (AST) adalah biasa
- Perubahan kepada tahap kreatinin dalam darah anda, yang menunjukkan bagaimana buah pinggang anda bekerja. Kesan sampingan ini adalah biasa.

Jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disebut dalam risalah ini, sila maklumkan doktor anda atau ahli farmasi anda secepat mungkin.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npa.gov.my](http://npa.gov.my) [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

## Cara penyimpanan & pelupusan Genessa

### - Penyimpanan

- Jauhi daripada capaian dan pandangan kanak-kanak.
- Jangan simpan lebih daripada suhu 30°C.
- Jangan guna Genessa selepas tarikh luput pada pek papan lepuh.

### - Pelupusan

- Ingat untuk memulangkan ubat yang tidak digunakan kepada ahli farmasi anda.
- Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui sisa air atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana melupuskan ubat-

ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

## Nombor Siri

NPRA (R2) 23/050

## Maklumat lanjut

### - Rupa & warna produk

Tablet bulat, dwicembung, coklat, yang bersalut filem dan dinyahbos dengan 'GEF 250' pada satu bahagian dan kosong di sebelah lagi.

### - Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif  
Genessa 250mg Film Coated Tablet mengandungi 250mg gefitinib.
- Bahan tidak aktif  
Teras tablet:
  - *Lactose Monohydrate*
  - *Microcrystalline Cellulose*
  - *Crospovidone*
  - *Povidone*
  - *Sodium Lauryl Sulfate*
  - *Magnesium Stearate*

Salutan filem:

- *Opadry II Complete Film Coating System*  
85F565317 Brown

### - Nombor MAL:

MALXXXXXXXXXX

## Pengilang

Novugen Oncology Sdn. Bhd.  
No. 47, Jalan Lengkuk Teknologi 2,  
Taman Teknologi Enstek Fasa 1,  
71760 Bandar Baru Enstek,  
Negeri Sembilan, Malaysia.

## Pemegang Pendaftaran Produk

Novugen Oncology Sdn. Bhd.  
No. 3, Jalan Jururancang U1/21,  
Hicom Glenmarie Industrial Park,  
40150, Shah Alam,  
Selangor, Malaysia.

## Tarikh kemaskini RiMUP

11/05/2023