

BIOLIFE GLUCOSAMINE 750MG TABLET

Glucosamine sulfate 750 mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan BiO-LiFE Glucosamine 750mg Tablet
2. Bagaimana BiO-LiFE Glucosamine 750mg Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan BiO-LiFE Glucosamine 750mg Tablet
4. Cara menggunakan BiO-LiFE Glucosamine 750mg Tablet
5. Semasa menggunakan BiO-LiFE Glucosamine 750mg Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan BiO-LiFE Glucosamine 750mg Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini

Apakah kegunaan BiO-LiFE

Glucosamine 750mg Tablet

- BiO-LiFE Glucosamine 750mg Tablet digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit sendi.

Bagaimana BiO-LiFE Glucosamine 750mg Tablet berfungsi

BiO-LiFE Glucosamine 750mg Tablet memberi kelegaan kepada pesakit penyakit sendi dengan mengurangkan bengkak sendi dan melegakan kesakitan.

Sebelum menggunakan BiO-LiFE Glucosamine 750mg Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan ambil ubat ini jika anda alah kepada glucosamine, dan / atau alah kepada kerang atau eksipien lain.
- Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput yang tercetak pada pek atau bungkusan telah koyak.
- Jika anda tidak pasti sama ada anda patut mula mengambil ubat ini, bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Sebelum mula menggunakan

- Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda ada alahan terhadap apa-

apa ubat lain, makanan, pengawet atau pewarna.

- Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, bercadang untuk hamil atau anda sedang menyusukan bayi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

- Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang anda dapat tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai supplemen kesihatan.
- Ubat untuk diabetes boleh mengganggu fungsi produk ini.

Cara menggunakan BiO-LiFE

Glucosamine 750mg Tablet

Ikut semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti.

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak lebih 12 tahun:

Ambil satu tablet dua kali sehari dengan makanan atau seperti yang diarahkan oleh doktor dan ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ambil ketika/semasa gejala berlaku dengan makanan atau sejurus selepas makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Jumpa doktor atau ahli farmasi jika gejala-gejala tidak lega atau gejala baru muncul.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal dengan segera sebaik sahaja anda ingat. Walau bagaimanapun, abaikan dos yang tertinggal jika ianya hampir dengan masa untuk dos seterusnya. Jangan gantikan dos untuk menggantikan dos yang terlupa.

- Jika meengguna berlebihan (terlebih dos)

Dapatkan nasihat perubatan jika anda fikir anda atau orang lain mungkin telah mengambil BiO-LiFE

Glucosamine 750mg Tablet secara berlebihan.

Semasa menggunakan BiO-LiFE Glucosamine 750mg Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika simptom/gejala anda tidak bertambah baik.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil Bio-Life Glucosamine 750mg Tablet untuk merawat sebarang masalah lain kecuali jika diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan beri ubat anda kepada orang lain walaupun mereka mengalami masalah yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu kesan BiO-LiFE Glucosamine 750mg Tablet terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

- BiO-LiFE Glucosamine 750mg Tablet secara umumnya diterima dengan baik oleh orang ramai, bagaimanapun, kesan sampingan yang berikut jika berlaku, biasanya bersifat ringan dan sementara: mengantuk, sakit kepala, tidak dapat tidur, loya, muntah, cirit-birit, gangguan pencernaan, sembelit, pedih uluhati, kulit kemerahan, gatal-gatal, bengkak pada bahagian bawah anggota badan dan peningkatan kadar degupan jantung.
- Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835499, atau laman web npa.moh.gov.my [Consumer → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

**Cara penyimpanan dan pelupusan
BiO-LiFE Glucosamine 750mg
Tablet**

- Penyimpanan

- Simpan ubat anda di dalam bekas asal sehingga masa untuk diambil.
- Simpan ubat anda di tempat yang sejuk dan kering di mana suhu berada di bawah 30°C.
- Jangan simpan ubat di bilik mandi atau berhampiran sinki. Jangan biarkan ubat di tingkap atau dalam kereta. Haba dan kelembapan boleh merosakkan ubat.
- Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak

- Pelupusan

Tanya ahli farmasi anda apa yang perlu dilakukan dengan baki ubat, atau jika ubat telah luput tarikh.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet berbentuk kapsul disalut dengan filem putih.

- Bahan-bahan kandungan

Setiap tablet mengandungi:

Glucosamine sulfate 2KCL 1000mg
equivalent to:
Glucosamine sulfate 750 mg

Bahan tidak aktif ialah *Silica colloidal anhydrous, copovidone (PVP/VA copolymer), magnesium stearate, opadry II 85G58923 white, cellulose microcrystalline, acacia spray dried.*

- Nombor MAL:

MAL08032203XR

Pengilang

**MEGA LIFESCIENCES
(AUSTRALIA) PTY. LTD.**
(A.C.N. 076 713 392)
60, National Avenue, Pakenham,
Victoria 3810, Australia

**Pemegang Pendaftaran Produk
MEGA LIFESCIENCES SDN.
BHD.**

B-28-02, The Ascent, Paradigm,
No.1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor,
Malaysia.

Diedarkan oleh:

BiO-LiFE Marketing Sdn Bhd

Tarikh kemaskini RiMUP

6hb December 2019

Nombor siri:

NPRA(R4/1)280619/00179