

ZIRIN (CAPSULE)

Cetirizine dihydrochloride (10mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ZIRIN Capsule
2. Bagaimana ZIRIN Capsule berfungsi
3. Sebelum menggunakan ZIRIN Capsule
4. Cara menggunakan ZIRIN Capsule
5. Semasa menggunakan ZIRIN Capsule
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ZIRIN Capsule
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan ZIRIN Capsule

Bahan aktif dalam kapsul ZIRIN adalah cetirizine dihydrochloride, tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil antihistamina. Kapsul ZIRIN digunakan untuk melegakan simptom rinitis alahan bermusim, rinitis alahan perennial dan urtikaria idiopati kronik pada dewasa dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas.

Bagaimana ZIRIN Capsule berfungsi

Cetirizine dihydrochloride, bahan aktif ZIRIN, merupakan sejenis antihistamina. Ia menghalang kesankesan sejenis bahan yang dikenali sebagai histamina yang wujud secara semula jadi dalam badan. Histamina terlibat dalam reaksi alahan.

Antihistamina seperti ZIRIN melegakan gejala yang tidak menyenangkan dan ketidakselesaan yang berkaitan dengan keadaankeadaan ini, seperti bersin, rensa, hidung berair dan tersumbat, gatal,

Sebelum menggunakan ZIRIN Capsule

Jangan mengambil ZIRIN jika:

- Anda alah terhadap cetirizine dihydrochloride
- Anda alah terhadap mana-mana bahan kandungan ZIRIN

- Anda sedang menyusukan anak
 - Anda mempunyai kegagalan buah pinggang yang teruk (pembersihan kreatinina kurang daripada 10 ml/min)
 - Anda mempunyai masalah sekatan kencing
- Jika anda mengalami mana-mana yang tersebut di atas, beritahu dengan ahli farmasi anda.

Sebelum mula mengambil

Semak dengan ahli farmasi anda sebelum mengambil ZIRIN jika:

- Anda mempunyai masalah buah pinggang
- Anda mempunyai faktor-faktor kecenderungan mendapat sekatan kencing (seperti lesi saraf tunjang, hiperplasia prostat) kerana cetirizine meningkatkan risiko sekatan kencing.
- Anda menghadapi epilepsi atau berisiko diserang sawan.
- Jika anda hamil atau merancang untuk mengandung, tanya ahli farmasi anda untuk nasihat sebelum mengambil ZIRIN.

Jika mengambil ubat-ubat lain

- Sila beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Jika memandu atau menggunakan mesin

- Berhati-hati ketika memandu atau menggunakan mesin.

Cara menggunakan ZIRIN Capsule

Patuhi semua arahan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti.

-Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun kebawah: Ambil sebiji pil sekali sehari atau seperti yang diarahkan oleh boleh dicadangkan oleh ahli farmasi anda. Jangan ambil lebih daripada 1 biji sehari.

- Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doctor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Terus mengambil ZIRIN selama mana yang disyorkan oleh doktor anda.

Jika terlupa mneggunkannya

Jika anda terlupa mengambil satu dos, anda harus mengambil dos itu sebaik sahaja anda mengingatnya, tetapi tunggu sekurang-kurangnya 24 jam sebelum mengambil dos yang seterusnya.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jumpa doktor anda dengan segera jika anda terambil dos berlebihan.

Jika anda berhenti mengambil ZIRIN, ada kemungkinan anda mengalami rasa gatal atau urtikaria.

Semasa menggunakan ZIRIN Capsule

Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda seperti yang diarahkan oleh doctor anda.
- Elakkan minuman beralkohol semasa anda sedang mengambil ubat ini.
- Beritahu doctor anda atau ahli farmasi jika gejala anda tidak bertambah baik dalam beberapa hari.
- Maklumkan kepada semua doktor, doctor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan ZIRIN Capsule.
- Beritahu doctor anda dengan segare jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.
- Jika anda mempunyai sebarang persoalan mengenai pengambilan ubat ini, tanya ahli farmasi anda.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan mengambil ZIRIN Capsule untuk merawat sebarang aduan lain melainkan doktor atau ahli farmasi memberitahu anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berjumpa dengan doktor anda terlebih dahulu.

- Jangan beri ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda perlu menjalani ujian alahan, tanya doktor anda jika anda perlu berhenti mengambil ZIRIN Capsule untuk beberapa hari sebelum ujian. Ubat ini mungkin menjejaskan keputusan ujian alahan anda. Sesetengah orang melaporkan bahawa mereka rasa mengantuk atau pening semasa mereka sedang mengambil ZIRIN Capsule. Jika anda terjejas, jangan memandu atau mengendalikan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, ZIRIN Capsule boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan, tetapi bukan setiap orang mengalami mereka.

Kesan sampingan berikut amat jarang berlaku, tetapi anda mesti berhenti mengambil ubat ini dan berjumpa dengan doktor anda dengan segera jika anda mendapati gejala ini:

- Reaksi alahan yang teruk termasuk ruam, kegatalan dan demam, bengkak pada kerongkong, muka, kelopak mata atau bibir. Reaksi ini mungkin berlaku tidak lama selepas anda mula mengambil ubat ini, atau ia mungkin berlaku kemudian.

Kesan-kesan sampingan berikut juga telah dilaporkan.

Kesan-kesan sampingan biasa berlaku

- Keletihan, mengantuk, sakit abdomen, sakit kepala, pening, mulut kering, sakit tekak, loya, simptom-simptom selesema (kanak-kanak sahaja), cirit-birit (kanak-kanak sahaja)

Kesan-kesan sampingan tidak biasa berlaku

- Gatal dan ruam, kesemutan atau berasa kebas pada tangan atau kaki, cirit-birit, rasa gelisah, rasa lemah atau tidak sihat secara amnya

Kesan-kesan sampingan jarang-jarang sekali berlaku

- Hipersensitif, denyutan jantung yang pantas, Edema (bengkak menyeluruh disebabkan oleh penahanan air), keputusan ujian fungsi hati yang tidak normal (doktor anda tahu apa langkah yang harus diambil), sawan, peningkatan berat badan, keagresifan, kekeliruan, kemurungan, halusinasi (mendengar atau melihat benda), tidak dapat tidur, urtikaria (gatal-gatal)

Kesan-kesan sampingan sangat jarang-jarang sekali berlaku

- Bilangan platelet dalam darah yang rendah, reaksi alahan yang serius, penglihatan kabur, kesukaran pemfokusan, putaran mata yang tidak terkawal, gangguan deria rasa dalam mulut, pengsan, kencing tidur, sakit dan/atau kesukaran membuang air, getetar, tik (pergerakan tubuh yang tidak terkawal), pergerakan luar kawalan anggota badan, kekejangan otot, reaksi alahan yang serius yang menyebabkan bengkak pada muka atau tengkuk, ruam kecil yang bengkak and kemerahan pada kulit.

Kesan-kesan sampingan tidak

Diketahui- Peningkatan selera makan, Mimpi ngeri, Gayat, Inflamasi hati (hepatitis), Ruam yang kulit yang bernanah, Sakit sendi, Sekatan kencing (kesukaran membuang air kecil), Kulit berasa gatal bila pengambilan ZIRIN Capsule dihentikan.

Sesetengah kes hilang ingatan dan/atau kecelakaan juga turut dilaporkan. Dalam kes-kes yang sangat luar biasa, ada pesakit yang terfikir untuk membunuh diri dan jika anda berasa sebegini, berhenti mengambil ZIRIN dan jumpa doktor anda.

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi atau jururawat anda jika anda mendapat mana-mana kesan sampingan. Ini termasuk sebarang kesan sampingan yang tidak tersenarai di risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550 atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumers → Reporting of Side Effects to Medicines or Vaccines).

Cara penyimpanan dan pelupusan ZIRIN Capsule

penyimpanan

- Pastikan ubat anda dalam pakej asal sehingga tiba masa untuk diambil.
- Simpan ubat anda di tempat yang kering dan dingin pada suhu bawah below 30°C.
- Jangan simpan ubat dalam bilik mandi atau dekat sinki. Jangan tinggalkan ubat di ujuran tapak tingkap atau dalam kereta. Haba dan kelembapan boleh merosakkan sesetengah ubat.
- Jauhkan daripada capaian dan penglihatan kanak-kanak.
- Jangan gunakan ZIRIN Capsule selepas tarikh luput yang dinyatakan pada pek. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan itu.

Pelupusan

Ubat-Ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah - langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut PRODUCT DESCRIPTION

Rupa dan warna produk

Cecair tidak berwarna dan berminyak yang diisi dalam 10 minims, kapsul shell gelatin berbentuk bujur dan berwarna telus.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Setiap kapsul mengandungi:

Cetirizine dihydrochloride 10 mg

Bahan-bahan tidak aktif: *Polyethylene glycol 400, Sodium hydroxide, Gelatin, Glycerin, Purified water.*

Nombor pendaftaran
MALXXXXXXXXA

Pengilang

Dibuat oleh:
MEGA LIFESCIENCES LTD.
384, Moo 4, Soi 6, Pattana 3 Road,
Bangpoo Industrial Estate,
Samutprakarn 10280, Thailand

Pemegang Pendaftaran Produk

MEGA LIFESCIENCES SDN BHD
B-28-02, The Ascent, Paradigm.
No.1, Jalan SS7/16A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Malaysia.

Tarikh Kemaskini

24/02/2020

Serial Number:

NPRA (R1)20/003