BILADRIVE-20 TABLETS

Bilastine 20 mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Biladrive-20
2. Bagaimana Biladrive-20 berfungsi
3. Sebelum menggunakan Biladrive-20
4. Cara menggunakan Biladrive-20
5. Semasa menggunakan Biladrive-20
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Biladrive-20
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10.Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Biladrive-20

Biladrive-20 mengandungi bilastine iaitu sejenis antihistamine. Biladrive-20 digunakan untuk melegakan simptom demam jerami (bersin, hidung gatal, berair dan tersumbat, mata merah dan berair) dan bentuk rinitis alergi yang lain. Ia juga boleh digunakan untuk merawat ruam kulit yang gatal (geligata atau urticaria).

Bagaimana Biladrive-20 berfungsi

Bilastine ialah antihistamine yang tidak menyebabkan mengantuk dan bertindak lama yang membantu melegakan simptom alergi seperti bersin, hidung berair dan gatal. Ia menghalang kesan histamine, sejenis bahan kimia yang dihasilkan oleh tubuh sebagai tindak balas kepada bahan asing yang alergi pada tubuh.

Sebelum menggunakan Biladrive-20

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Biladrive-20 jika anda alergi (hipersensitif) kepada bilastine atau sebarang bahan kandungan lain Biladrive-20.

Jangan beri ubat ini kepada kanak-kanak di bawah 12 tahun. Rujuk doktor atau ahli farmasi anda tentang dos yang bersesuaian bagi kanak-kanak di bawah 12 tahun.

Selain daripada ubat ini, bilastine 10mg tablet orodispersible atau bilastine 2.5mg/ml larutan oral adalah lebih sesuai untuk kanak-kanak 6 hingga 11 tahun dengan berat badan sekurang-kurangnya 20kg.

Jangan beri ubat ini kepada kanak-kanak di bawah umur 6 tahun dengan berat badan dibawah 20kg memandangkan tiada data yang mencukupi.

- Sebelum mula menggunakan

Beritahu doktor jika anda mengalami gangguan buah pinggang yang sederhana atau teruk dan jika anda sedang mengambil ubat lain.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi yang anda sedang mengambil atau baru-baru ini mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang diperoleh tanpa preskripsi. Bincangkan dengan doktor anda terutamanya apabila anda mengambil ubat yang berikut:

- Ketoconazole (sejenis ubat antifungus)
- Erythromycin (sejenis antibiotik)
- Diltiazem (untuk merawat angina)
- Cyclosporine (untuk mengurangkan aktiviti sistem imun anda, oleh itu mengelakkan penolakan transplan atau mengurangkan aktiviti penyakit dalam gangguan autoimun dan alergi, seperti psoriasis, dermatitis atopik atau artritis reumatoid)
- Ritonavir (untuk merawat AIDS)
- Rifampicin (sejenis antibiotik)

Cara menggunakan Biladrive-20

Sentiasa ambil ubat ini sebagaimana yang telah diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda. Periksa dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Telan tablet dengan segelas air. Garis skor bukan untuk membahagikan tablet kepada dos yang sama besarnya. Ia boleh digunakan untuk memecahkan tablet supaya lebih mudah ditelan.

- Berapa banyak harus digunakan

Orang dewasa termasuk orang tua dan remaja berusia 12 dan ke atas: ambil satu tablet sehari.

- Bila perlu digunakan

Tablet perlu diambil ketika perut kosong, satu jam sebelum atau 2 jam selepas pengambilan makanan atau jus buah-buahan.

Tablet ini tidak boleh diambil bersama dengan makanan atau jus limau gedung atau jus buah- buahan yang lain, kerana ia akan mengurangkan kesan bilastine. Untuk mengelakkannya, anda boleh:

- ambil tablet dan tunggu satu jam sebelum mengambil makanan atau jus buah-buahan atau
- jika anda telah mengambil makanan atau jus buah-buahan, tunggu dua jam sebelum mengambil tablet.

- Berapa lama perlu digunakan

Pakar perubatan anda akan menentukan jenis penyakit yang anda hidapi dan akan menentukan berapa lama anda perlu mengambil Biladrive-20

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil dos pada masa yang sepatutnya, ambil sebaik sahaja anda teringat, dan teruskan dengan jadual dos anda yang biasa. Jika sudah terlalu hampir dengan masa untuk dos yang berikutnya, tunggu sehingga masa untuk mengambil dos tersebut. Jangan ambil dua dos untuk menggantikan dos yang anda terlepas. Jika anda ada apa-apa soalan selanjutnya tentang penggunaan ubat ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika anda, atau sesiapa sahaja, telah mengambil terlalu banyak Biladrive-20, hubungi doktor atau ahli farmasi anda dengan segera atau pergi ke jabatan kecemasan di hospital berdekatan. Jangan lupa untuk membawa pek ubat atau risalah pesakit ini bersama anda.

Semasa menggunakan Biladrive-20

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat seperti yang dipreskripsikan oleh doktor anda.

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami sebarang tindak balas alergi terhadap ubat ini.

Jika simptom berterusan, hubungi doktor anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil ubat melebihi dos yang disyorkan.

BILADRIVE-20 TABLETS

Bilastine 20 mg

Jangan benarkan sesiapa menggunakan ubat anda

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Hubungi doktor anda jika anda hamil, kemungkinan akan hamil atau menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil sebarang ubat.

Memandu dan menggunakan jentera

Bilastine telah menunjukkan untuk tidak menjejaskan prestasi memandu ke atas orang dewasa. Walau bagaimanapun, tindak balas pada setiap pesakit mungkin berbeza. Dengan itu, anda perlu memeriksa bagaimana ubat ini bertindak ke atas anda sebelum memandu atau menggunakan jentera.

Mengambil bilastine dengan alkohol pada dos yang disyorkan (20mg), tidak meningkatkan rasa mengantuk yang disebabkan oleh alkohol.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat lain, Biladrive-20 boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Jika anda mengalami simptom-simptom alergi seperti kesukaran bernafas, pening kepala, mahu pitam atau hilang kesedaran, bengkak pada muka, bibir, lidah atau tekak, dan/atau bengkak dan kemerahan pada kulit, berhenti mengambil ubat ini serta merta dan dapatkan rawatan serta-merta.

Kesan sampingan yang lain yang mungkin dialami oleh dewasa dan remaja ialah:

Kerap: boleh menjejaskan 1 hingga 10 dalam 100 pengguna

- Sakit kepala
- Mengantuk

Tidak kerap: boleh menjejaskan 1 dalam 100 pengguna

- Pengesanan jantung ECG luar biasa
- Ujian darah yang menunjukkan perubahan dalam cara hati berfungsi
- Pening kepala
- Sakit perut
- Keletihan
- Menaikkan selera
- Denyutan jantung tidak tetap
- Berat badan bertambah
- Loya (rasa sakit)
- Keresahan
- Hidung kering atau tidak selesa
- Cirit-birit
- Gastritis (Inflamasi dinding perut)
- Vertigo (rasa pening atau berpusing)
- Rasa lemah
- Dahaga
- Dispnea (kesukaran bernafas)
- Mulut kering
- Ketakcernaan
- Rasa gatal
- Kudis selesema (herpes oral)
- Demam
- Tinitus (bunyi berdesing dalam telinga)
- Kesukaran untuk tidur
- Ujian darah yang menunjukkan perubahan dalam cara buah pinggang berfungsi
- Lemak darah meningkat

Kekerapan tidak diketahui: tidak dapat dianggarkan dari data yang sedia ada

- berdebar-debar (terasa denyutan jantung)
- takikardia (laju denyutan jantung)
- muntah

Tidak kerap: boleh menjejaskan 1 dalam 100 pengguna

- iritasi mata
- pening kepala
- hilang kesedaran
- cirit-birit
- loya (rasa sakit)
- mulut bengkak
- urticaria (kegatalan)
- keletihan

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my *[Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]*.

Cara penyimpanan dan pelupusan Biladrive-20

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet berwarna putih atau putih kekuningan, berbentuk bujur dengan garisan tengah di 1 sisi dan kosong di sisi yang lain, dibekalkan dalam aluminium blister.

- Bahan-bahan kandungan

– Bahan aktif
Bilastine
– Bahan tidak aktif
Microcrystalline Cellulose, Sodium starch glycolate, Silica, colloidal Anhydrous, Magnesium stearate

- Nombor MAL:
MAL**********

Pengilang

Athena Drug Delivery Solutions Pvt. Ltd.
Plot A1-A5, MIDC, Chemical Zone,
Ambernath (West),
Maharashtra, 421 501,
India

Pemegang Pendaftaran Produk

Mega Lifesciences Sdn. Bhd.
B-28-02, The Ascent, Paradigm, No. 1,
Jalan SS 7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

26/08/2026

Nombor Siri

NPRA (R2) 26/026