

NORMATEN®

Atenolol (50mg, 100mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Normaten
2. Bagaimana Normaten berfungsi
3. Sebelum menggunakan Normaten
4. Cara menggunakan Normaten
5. Semasa menggunakan Normaten
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Normaten
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Normaten

Ia digunakan untuk:

- merawat tekanan darah tinggi (hipertensi).
- merawat denyutan jantung yang tidak teratur (dysrhythmias).
- mencegah sakit dada (angina).
- sebagai rawatan awal jantung selepas serangan jantung (myocardial infarction).

Bagaimana Normaten berfungsi

Atenolol adalah beta-blocker, yang melambatkan pengecutan jantung, mengurangkan tindak balas jantung terhadap tekanan dan senaman, serta mengurangkan tekanan darah.

Sebelum menggunakan Normaten

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan ambil ubat ini jika anda:
- alahan (hipersensitif) kepada atenolol atau bahan lain yang terkandung di dalam ubat ini.
 - mempunyai kesukaran untuk bernafas atau halangan pada salur pernafasan.
 - mengalami terlalu banyak asid di dalam darah (metabolic acidosis).
 - mempunyai denyutan jantung yang perlahan (bradycardia).
 - mempunyai masalah separa jantung tersumbat.
 - bekalan darah yang tidak mencukupi di dalam badan.
 - mempunyai kegagalan fungsi jantung.

- Sebelum menggunakan Normaten

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- mempunyai tumor pada kelenjar adrenal (phaeochromocytoma).
- mempunyai fungsi jantung yang lemah atau penyakit jantung.
- mempunyai kencing manis.
- mempunyai kelenjar tiroid yang terlalu aktif (hipertiroidisme).

- mempunyai salur darah tersumbat.
- mempunyai kegagalan buah pinggang.
- bekalan darah yang tidak mencukupi di dalam badan (cardiogenic shock).
- mempunyai masalah kesukaran bernafas atau halangan pada salur pernafasan.
- akan mengambil ubat bius.
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Normaten

- Berapa banyak harus digunakan

Hipertensi

50 hingga 100mg sekali sehari

Angina

50mg dua kali sehari atau 100mg sekali sehari

Dysrhythmias

50mg hingga 100mg sekali sehari.

Myocardial infarction

50mg dua kali sehari dan diikuti dengan 100mg sekali sehari.

Tidak disyorkan untuk kanak-kanak di bawah 12 tahun.

Doktor atau ahli farmasi akan preskrip kekuatan ubat yang bersesuaian, bergantung kepada keadaan anda, rawatan semasa dan risiko berlainan setiap individu.

- Bila perlu digunakan

Sekali atau dua kali sehari, mengikut dos yang dipreskrip oleh doktor atau ahli farmasi.

- Berapa lama perlu digunakan

Berdasarkan preskripsi doktor atau ahli farmasi. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil secepat mungkin apabila anda teringat. Jika dos seterusnya adalah hampir, ambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Simptom akibat dos berlebihan adalah sepertimana kesan-kesan sampingan yang dijangka. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda terambil secara berlebihan atau bimbang akan keadaan yang dialami.

Semasa menggunakan Normaten

- Perkara yang perlu dilakukan

Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil tablet. Makan tablet bersama air dan cuba mengambilnya pada waktu yang sama setiap hari.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan kunyah tablet. Telan tablet dengan air. Jangan ambil ubat ini tanpa preskripsi doktor atau ahli farmasi.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- alahan (hipersensitif) kepada atenolol atau bahan lain yang terkandung di dalam ubat ini.
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan bayi atau merancang untuk menyusu.
- mempunyai masalah ginjal, peredaran darah dan kelenjar tiroid.
- mempunyai diabetes.
- mengalami kesukaran bernafas.

Kesan-kesan sampingan

- Denyutan jantung yang perlahan.
- Tekanan darah rendah.
- Kegagalan jantung.
- Saluran darah tersumbat.
- Pening, keletihan dan gangguan mental.
- Gangguan penglihatan.
- Cirit-birit, loya dan muntah.

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah alahan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nppra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Normaten

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.
Lindungi dari cahaya dan kelembapan.
Jauhi dari kanak-kanak.
Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Normaten Tablet 50mg

Tablet bulat bersalut lapis dan berwarna putih. Terdapat dalam blister strips 14's di dalam kotak bungkusan 28 tablet.

Normaten Tablet 100mg

Tablet bulat bersalut lapis dan berwarna oren. Terdapat dalam blister strips 7's di dalam kotak bungkusan 28 tablet.

- Bahan-bahan kandungan

- *Normaten Tablet 50mg*

Mengandungi Atenolol 50mg.

Bahan-bahan kandungan lain ialah Starch, Titanium Dioxide, Sodium Starch Glycolate, Lactose, Dioctyl Sodium Sulphosuccinate, Polymethacrylate, Talcum Powder, Polyvinylpyrrolidone, Isopropyl Alcohol, Colloidal Sillicone Dioxide, Acetone, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Purified Water.

- *Normaten Tablet 100mg*

Mengandungi Atenolol 100mg.

Bahan-bahan kandungan lain ialah Starch, Titanium Dioxide, Sunset Yellow, Sodium Starch Glycolate, Lactose, Dioctyl Sodium Sulphosuccinate, Colloidal Sillicone Dioxide, Opaglos 6000 White, Eudragit E100, Polymethacrylate, Talcum Powder, Polyvinylpyrrolidone, Isopropyl Alcohol, Acetone, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Purified Water.

Pengilang

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka,
Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

GoodScience Sdn. Bhd.
No. 7, Jalan KPK 4/3,
Kawasan Perindustrian Kundang,
Kundang Jaya, 48020 Rawang,
Selangor, Malaysia.

Nombor pendaftaran

Normaten Tablet 50mg:
MAL19910864AZ

Normaten Tablet 100mg:
MAL19940026AZ

Tarikh kemaskini RiMUP

19 Februari 2026

Nombor Siri

NPRA(R2/1)200106/321