

T.O. PRAZOSIN TABLET

Prazosin Hydrochloride (1 mg, 2 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan T.O. Prazosin
2. Bagaimana T.O. Prazosin berfungsi
3. Sebelum menggunakan T.O. Prazosin
4. Cara menggunakan T.O. Prazosin
5. Semasa menggunakan T.O. Prazosin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan T.O. Prazosin
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan T.O. Prazosin

T.O. Prazosin biasanya digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi (hipertensi).

Ia juga boleh digunakan untuk merawat kegagalan jantung (berkaitan dengan ventrikel kiri), penyakit *Raynaud* (di mana jari-jari tangan menjadi pucat dan berasa sakit apabila sejuk) atau pembesaran kelenjar prostat (hiperplasia prostat benigna) pada lelaki.

T.O. Prazosin sering digunakan bersama-sama dengan ubat-ubatan lain untuk merawat tekanan darah tinggi atau kegagalan jantung.

Bagaimana T.O. Prazosin berfungsi

T.O. Prazosin mengandungi bahan aktif *Prazosin Hydrochloride*, iaitu salah satu daripada kumpulan ubat yang dikenali sebagai *alpha-blocker*.

Pada pesakit yang menghidap tekanan darah tinggi (hipertensi), T.O. Prazosin berfungsi dengan mengendurkan pembuluh darah supaya darah mengalir melaluinya dengan lebih mudah. Ia boleh digunakan secara berasingan atau dalam kombinasi dengan ubat lain yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi.

Pada pesakit yang mengalami kegagalan jantung, T.O. Prazosin berfungsi dengan mengendurkan pembuluh darah utama pada jantung, seterusnya membolehkan jantung mengepam darah dengan lebih mudah. T.O. Prazosin selalunya

digunakan untuk kegagalan jantung apabila ubat-ubatan lain tidak lagi berkesan atau tidak berkesan langsung.

Pada pesakit yang menghidap Penyakit *Raynaud*, rawatan ini mengendurkan pembuluh darah pada tangan supaya darah boleh sampai ke jari tangan dengan lebih mudah. Ini membantu mencegah kesejukan dan kekakuan.

Pada pesakit *Benign Prostatic Hyperplasia*, iaitu pembesaran kelenjar prostat, ubat ini diambil untuk merawat pembuangan air kecil yang lemah dan/atau kerap. Ini lazim berlaku pada pesakit yang mengalami pembesaran kelenjar prostat. Rawatan berfungsi dengan mengendurkan otot di sekeliling pundi kencing dan kelenjar prostat supaya air kencing boleh mengalir dengan lebih mudah.

Sebelum menggunakan T.O. Prazosin

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda alah kepada *Prazosin Hydrochloride*, atau kepada sebarang ubat yang serupa (dikenali sebagai ubat *quinazoline*) atau sebarang bahan lain yang disenaraikan dalam Maklumat Lanjut.
- anda berumur bawah 12 tahun.

- Sebelum menggunakannya

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan produk T.O. Prazosin.

Ubat-ubatan tidak semestinya sesuai untuk setiap orang. Doktor anda perlu tahu sebelum anda menggunakan T.O. Prazosin, sekiranya sebarang perkara berikut berkenaan dengan anda:

- anda mengalami kegagalan jantung disebabkan penyakit jantung yang lain, contohnya penyakit injap jantung atau serangan jantung baru-baru ini. Jika anda mengalami kegagalan jantung (berkaitan dengan ventrikel kiri), keberkesanan, T.O. Prazosin mungkin akan beransur-ansur berkurangan selepas beberapa bulan. Sekiranya ini berlaku, anda mungkin menyedari bahawa kaki

atau pergelangan kaki anda bengkak disebabkan penahanan bendalir. Ini dipanggil edema. Jika anda mengalami penambahan berat badan akibat edema, beritahu doktor anda kerana doktor anda mungkin perlu menukar dos T.O. Prazosin atau ubat-ubatan lain yang anda sedang ambil.

- anda pernah pengsan selepas membuang air kecil.
- anda menghidap penyakit hati atau buah pinggang.
- anda mengalami ketegangan zakar yang berterusan. Sekiranya keadaan ini berlanjutan melebihi 4 jam, sila dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Beritahu doktor anda bahawa anda sedang mengambil T.O. Prazosin, sekiranya anda menjalani sebarang ujian seperti ujian air kencing, kerana, T.O. Prazosin mungkin boleh menjejaskan keputusan ujian.

Sesetengah pesakit yang mengambil T.O. Prazosin untuk rawatan tekanan darah tinggi atau pembesaran prostat mungkin mengalami pening atau berasa pitam, yang mungkin disebabkan oleh tekanan darah yang rendah apabila duduk atau bangun dengan cepat. Sesetengah pesakit pernah mengalami simptom ini apabila mengambil ubat untuk mati pucuk—bersama T.O. Prazosin. Bagi mengurangkan kemungkinan simptom ini berlaku, anda perlu mengambil dos harian T.O. Prazosin secara tetap sebelum mula mengambil ubat untuk mati pucuk.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan T.O. Prazosin.

T.O. Prazosin boleh digunakan semasa hamil hanya sekiranya potensi manfaatnya mengimbangi potensi risiko kepada ibu dan janin.

T.O. Prazosin boleh meresap ke dalam susu ibu dalam jumlah yang kecil. Anda

T.O. PRAZOSIN TABLET

Prazosin Hydrochloride (1 mg, 2 mg)

hendaklah sentiasa berwaspada sekiranya T.O. Prazosin diberikan kepada ibu yang menyusukan anak.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan doktor anda sekiranya anda sedang mengambil atau baru-baru ini telah mengambil ubat lain. Ini termasuk ubat yang diambil tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat boleh menjejaskan cara T.O. Prazosin berfungsi. Sekiranya anda mengambil sebarang ubat-ubatan berikut, sila beritahu doktor anda sebelum memulakan rawatan:

- Ubat diuretik, juga dikenali sebagai “pil air” seperti frusemide.
- *calcium antagonist*, perencat *ACE inhibitor* atau *beta-blocker* yang biasanya diberikan untuk merawat angina dan/atau tekanan darah tinggi.
- ubat-ubat untuk mati pucuk.
- penggunaan dengan *PDE-5 inhibitor*.

Cara menggunakan T.O. Prazosin

- Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa ambil T.O. Prazosin dengan betul seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda tidak pasti.

Tablet T.O. Prazosin perlu diambil melalui mulut. T.O. Prazosin boleh diambil sebelum atau selepas makan. Telan tablet dengan segelas air.

T.O. Prazosin biasanya dimulakan pada dos serendah yang mungkin dan ditingkatkan secara beransur-ansur, bergantung pada respons anda kepada rawatan. Jangan ubah dos atau berhenti mengambil tablet tanpa merujuk kepada doktor anda terlebih dahulu. Sila pastikan anda mendapat preskripsi baru sebelum kehabisan tablet.

Tekanan darah tinggi (hypertensi)

Dos permulaan yang disyorkan ialah 0.5 mg sekali diambil sebelum tidur. Kemudian, 0.5 mg diberikan dua atau tiga kali sehari selama 3 hingga 7 hari. Dos ini kemudian biasanya ditingkatkan kepada 1 mg yang diambil dua atau tiga

kali sehari untuk 3 hingga 7 hari yang selanjutnya. Doktor anda mungkin akan menasihatkan anda supaya meningkatkan dos yang selanjutnya secara beransur-ansur (sehingga maksimum 20 mg setiap hari), bergantung pada respons tekanan darah anda kepada rawatan.

Jika anda sedang mengambil ubat diuretik atau sebarang ubat lain untuk merawat tekanan darah tetapi tekanan darah anda masih tidak dapat dikawal, doktor anda akan mengurangkan dos ubat tersebut kepada dos penyelenggaraan sebelum memulakan rawatan T.O. Prazosin.

Kegagalan jantung (Berkaitan Ventrikel Kiri)

Dos permulaan yang disyorkan ialah 0.5 mg yang diambil dua, tiga atau empat kali sehari. Doktor anda mungkin akan menasihatkan anda untuk meningkatkan dos yang selanjutnya (sehingga maksimum 20 mg setiap hari) bergantung pada respons anda kepada rawatan.

Fenomena/Penyakit Raynaud

Dos permulaan yang disyorkan ialah 0.5 mg, dua kali sehari selama 3 hingga 7 hari. Doktor anda mungkin akan menasihatkan anda supaya meningkatkan dos yang selanjutnya (sehingga 2 mg dua kali sehari), bergantung pada respons anda kepada rawatan.

Pembesaran prostat

Dos permulaan yang disyorkan ialah 0.5 mg, dua kali sehari selama 3 hingga 7 hari, dengan dos permulaan diambil pada waktu malam. Doktor anda mungkin akan menasihatkan anda supaya meningkatkan dos yang selanjutnya (sehingga 2 mg dua kali sehari), bergantung pada respons anda kepada rawatan.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil T.O. Prazosin selama yang disarankan oleh doktor

anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat sekiranya anda mengambil terlalu banyak tablet T.O. Prazosin. Sentiasa bawa bungkusan ubat yang berlabel bersama anda, sama ada terdapat lebihan T.O. Prazosin atau tidak.

Semasa menggunakan T.O. Prazosin

- Perkara yang perlu dilakukan

- Sentiasa mengikut arahan yang diberikan oleh doktor anda.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.
- Anda mungkin akan berasa pening, pitam atau pengsan, terutamanya jika anda mula mengambil T.O. Prazosin atau selepas dos anda ditambah. Jika anda berasa pening, pitam atau pengsan, bangun dengan perlahan-lahan apabila bangkit dari katil atau berdiri. Beritahu doktor anda jika keadaan ini berlarutan.
- Jika anda akan mula mengambil sebarang ubat baru, ingatkan doktor atau ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil T.O. Prazosin.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil T.O. Prazosin.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil T.O. Prazosin tanpa mendapatkan nasihat doktor anda.

Jangan guna T.O. Prazosin untuk merawat masalah kesihatan lain kecuali diarahkan oleh doktor anda.

T.O. PRAZOSIN TABLET

Prazosin Hydrochloride (1 mg, 2 mg)

Jangan ambil ubat lain tanpa berbincang dengan doktor anda terlebih dahulu. Ubat ini diberikan khas untuk anda. Jangan berikan kepada orang lain kerana ia mungkin tidak sesuai walaupun mempunyai simptom yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih atau sakit kepala, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubat lain, T.O. Prazosin boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Tindak balas paling biasa berlaku yang dikaitkan dengan terapi T.O. Prazosin adalah:

- kekurangan tenaga
- rasa lemah
- pening
- sakit kepala
- loya
- rasa degupan jantung yang kuat dan tidak menyelesaikan
- mengantuk

Sebagai tambahan, tindak balas berikut telah dikaitkan dengan terapi *Prazosin Hydrochloride*:

- ketegangan zakar yang berterusan
- sakit dada
- pengsan
- perkembangan tisu payudara yang tidak normal terutamanya pada lelaki
- sesak nafas
- hidung berdarah
- penglihatan kabur
- keradangan pada permukaan luar bahagian mata yang berwarna putih
- sakit sendi
- ketidakselesaan dan/atau rasa sakit pada abdomen

Perkara-perkara berikut telah diperhatikan pada pesakit yang dirawat untuk kegagalan ventrikel kiri dengan *Prazosin Hydrochloride* apabila digunakan bersama-sama *cardiac glycoside* dan diuretik:

- mulut kering
- pembengkakan
- tekanan darah yang turun mendadak disebabkan perubahan posisi badan
- rasa pening
- sakit kepala
- cirit-birit
- loya
- degupan jantung yang tidak normal
- mengantuk
- mati pucuk
- hidung tersumbat
- penglihatan kabur

Kesan sampingan yang paling biasa berlaku walaupun jarang dilaporkan dalam rawatan Fenomena/Penyakit *Raynaud* ialah:

- rasa pening yang ringan.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan T.O. Prazosin

- Penyimpanan

Jangan simpan melebihi suhu 30°C.

Simpan ubat dalam bungkusan asal untuk melindungi daripada haba, kelembapan dan cahaya.

Jangan simpan T.O. Prazosin atau ubat-ubat lain di dalam tandas, berdekatan dengan sinki atau ditinggalkan di tepi tingkap atau di dalam kereta.

Simpan ubat ini jauh daripada pandangan dan jangkauan kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

T.O. Prazosin 1 mg: Tablet berwarna jingga, berbentuk bulat dwicembung dengan garis pembelahan pada satu permukaan.

T.O. Prazosin 2 mg: Tablet berwarna putih, berbentuk bulat dwicembung dengan garis pembelahan dan tanda nombor "2" pada satu permukaan dan tanda "TOC" pada sebelah permukaan yang lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

T.O. Prazosin 1 mg: Setiap biji tablet mengandungi 1.095 mg Prazosin hydrochloride yang bersamaan dengan 1 mg Prazosin.

T.O. Prazosin 2 mg: Setiap biji tablet mengandungi 2.190 mg Prazosin hydrochloride yang bersamaan dengan 2 mg Prazosin.

- Bahan tidak aktif

Lactose, corn starch, povidone K-90, sodium starch glycolate, talcum, magnesium stearate polysorbate 80.

T.O. Prazosin 1 mg juga mengandungi "sunset yellow" sebagai bahan pewarna.

- Nombor MAL

T.O. Prazosin 1 mg
(MAL04112728ARZ)

T.O. Prazosin 2 mg
(MAL04112729ARZ)

T.O. PRAZOSIN TABLET

Prazosin Hydrochloride (1 mg, 2 mg)

Pengilang

Dibungkus dan dikeluarkan oleh

GoodScience Sdn. Bhd.

No. 7, Jalan KPK 4/3,

Kawasan Perindustrian Kundang,

Kundang Jaya, 48020 Rawang,

Selangor, Malaysia.

Dikilang oleh

T.O. Pharma Co., LTD.

120, Lat Phrao 128 Alley,

Khwaeng Phlabphia,

Khet Wang Thonglang,

Bangkok 10312, Thailand

Pemegang Pendaftaran Produk

GoodScience Sdn. Bhd.

No. 7, Jalan KPK 4/3,

Kawasan Perindustrian Kundang,

Kundang Jaya, 48020 Rawang,

Selangor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini

06/07/2026

Nombor Siri

NPRA (R2/1) 260622/00082