

ALOVASC TABLET

Amlodipine (5mg, 10mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Alovasc
2. Bagaimana Alovasc berfungsi
3. Sebelum mengambil Alovasc
4. Cara menggunakan Alovasc
5. Semasa menggunakan Alovasc
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Alovasc
8. Maklumat lanjut
9. Nama-Nama Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Alovasc

Ia digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi (hipertensi) dan keadaan di mana bekalan darah ke otot jantung berkurangan (*myocardial ischemia*).

Bagaimana Alovasc berfungsi

Amlodipine adalah ubat tergolong dalam kumpulan calcium antagonist. Ia mengembangkan saluran darah dengan mengurangkan ketegangan otot. Apabila saluran darah mengembang, darah dapat mengalir dengan mudah dan ini dapat meningkatkan bekalan darah ke otot jantung.

Sebelum menggunakan Alovasc

Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- alahan (hipersensitif) terhadap Amlodipine, dihydropyridines (kumpulan ubat calcium antagonis) atau bahan-bahan lain yang terkandung di dalam ubat ini.
- pernah mengalami kejutan kardiogenik (jantung tidak dapat membekalkan darah yang mencukupi ke badan).
- mempunyai masalah penyempitan injap aorta jantung (aortic stenosis).
- mengalami sakit dada yang tidak tetap (tidak termasuk angina Prinzmetal yang berlaku semasa rehat, dan biasanya tidak dapat diramal).

Sebelum menggunakan Alovasc

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi sekiranya anda:

- mengalami aortic stenosis yang serius.
- mengalami kegagalan fungsi jantung.
- kerosakan fungsi hati.
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusukan.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Alovasc

Berapa banyak harus digunakan

Dewasa

Dos permulaan 5 mg sekali sehari, di mana boleh ditambah kepada dos maksimum 10mg bergantung kepada respon pesakit.

Ubat ini tidak disyorkan untuk kanak-kanak.

Doktor atau ahli farmasi akan preskrip dos berlainan berdasarkan kepada keadaan individu.

Bila perlu digunakan

Diambil sebelum makan atau selepas makan. Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu digunakan

Ambil mengikut preskripsi doktor atau ahli farmasi. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

Jika terlupa menggunakannya

Ambil secepat mungkin sebaik sahaja anda teringat. Jika dos seterusnya adalah hampir, ambil dos yang seterusnya seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Tanda-tanda yang mungkin berlaku termasuk pengembangan salur darah berlebihan, denyutan jantung yang tidak normal dan penurunan tekanan darah secara mendadak.

Hubungi doktor atau ahli farmasi dengan segera sekiranya anda terambil pil secara berlebihan.

Semasa menggunakan Alovasc

Perkara yang perlu dilakukan

Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil tablet. Amalkan pengambilan tablet pada waktu yang sama setiap hari.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan kunyah tablet. Telan tablet dengan air.
- Jangan ambil ubat ini tanpa preskripsi doktor atau ahli farmasi.

- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi Alovasc dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Hati-hati ketika memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana kesan Alovasc terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

- Rasa mengantuk yang berlebihan
- Pening
- Sakit kepala
- Denyutan jantung yang tidak normal
- Kulit muka kemerahan
- Sakit perut
- Loya
- Buku lali bengkak
- Edema
- Keletihan.

Seperti ubat-ubatan lain, Alovasc boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Alovasc

Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

Maklumat Lanjut

Rupa dan warna produk

Alovasc Tablet 5mg

Tablet putih, berbentuk bujur cembung (8.5mm x 5.0mm), dengan ukiran “^V” dan

ALOVASC TABLET

Amlodipine (5mg, 10mg)

garis tengah pada satu belah dan tanpa garis pada sebelah yang lain. Tujuan garis tengah adalah untuk memudahkan tablet dipatahkan supaya mudah untuk ditelan dan bukan untuk dibahagikan kepada 2 dos yang sama.

Alovasc Tablet 10mg

Tablet putih, berbentuk bujur cembung (11.0mm x 6.0mm), dengan ukiran “^V” dan garis tengah pada satu belah dan tanpa garis pada sebelah yang lain. Tujuan garis tengah adalah untuk memudahkan tablet dipatahkan supaya mudah untuk ditelan dan bukan untuk dibahagikan kepada 2 dos yang sama.

Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif

Amlodipine

Bahan tidak aktif

Colloidal Silicone Dioxide, Maize Starch, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate.

Nombor MAL

Alovasc Tablet 5mg (MAL21036031ACRZ)

Alovasc Tablet 10mg (MAL21036032ACRZ)

Nama-Nama Pengilang

Dibungkus dan dikeluarkan oleh

GoodScience Sdn Bhd

No. 7, Jalan KPK 4/3,

Kawasan Perindustrian Kundang,

Kundang Jaya, 48020 Rawang,

Selangor, Malaysia

Dikilang oleh

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd

1-5 Cheng Industrial Estate, 75250 Melaka,

Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

GoodScience Sdn Bhd

No. 7, Jalan KPK 4/3,

Kawasan Perindustrian Kundang,

Kundang Jaya, 48020 Rawang,

Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

25/08/2023

Nombor Siri

NPRA(R2) 20/104