

CAVSAMIR

Sevelamer Carbonate Tablets 800mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Cavsamir
2. Bagaimana Cavsamir berfungsi
3. Sebelum mengambil Cavsamir
4. Cara menggunakan Cavsamir
5. Semasa menggunakan Cavsamir
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Cavsamir
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Cavsamir

Cavsamir digunakan untuk pesakit yang mempunyai buah pinggang yang tidak boleh berfungsi dengan baik. Mereka biasanya tidak dapat mengawal tahap fosforus dalam serum darah mereka. Ini boleh meningkatkan jumlah fosfat dalam serum (dikenali sebagai hiperfosfatemia). Peningkatan tahap fosforus dalam serum darah boleh menyebabkan pembentukan deposit keras dalam badan anda. Ia dikenali sebagai *calcification*. Deposit ini boleh mengentalkan saluran darah anda dan menjadikannya sukar untuk darah dipam ke seluruh badan. Penambahan serum fosforus juga boleh menyebabkan gejala-gejala seperti kegatalan kulit, mata menjadi merah, sakit tulang dan keretakan tulang.

Bagaimana Cavsamir berfungsi

Cavsamir mengandungi *sevelamer carbonate* yang digunakan sebagai bahan aktif. Ia mengikat fosfat dari makanan di dalam salur pencernaan dan mengurangkan serum fosforus dalam darah.

Sebelum mengambil Cavsamir

Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Cavsamir jika:

- Anda alah (hipersensitif) terhadap *sevelamer carbonate* atau mana-mana bahan-bahan lain dalam ubat ini.
- Tanda-tanda tindak balas alahan

termasuk: ruam, masalah menelan atau bernafas, bengkak di bahagian bibir, muka, tekak atau lidah

- Anda mempunyai tahap fosfat rendah dalam darah anda (dokter anda akan memeriksa keadaan ini)
- Anda mempunyai halangan usus.

Sebelum mula mengambil

Semak dengan doktor anda sebelum mengambil Cavsamir jika:

- Anda mempunyai masalah menelan
- Anda mempunyai masalah dengan motilitas (pergerakan) di dalam perut dan usus anda
- Anda kerap menjatuh sakit
- Anda mempunyai keradangan usus aktif
- Anda telah menjalani pembedahan utama di bahagian perut dan usus anda
- Anda mempunyai sembelit yang serius.

Rawatan tambahan:

Disebabkan oleh keadaan buah pinggang anda atau rawatan dialisis anda, anda mungkin:

- Mengalami tahap kalsium yang rendah atau tinggi dalam darah anda. Cavsamir tidak mengandungi kalsium, oleh itu, doktor anda mungkin menentukan tablet kalsium sebagai tablet tambahan untuk anda.
- Mempunyai jumlah vitamin D yang rendah dalam darah anda. Oleh itu, doktor anda boleh mengawasi tahap vitamin D dalam darah anda dan memberikan vitamin D sebagai rawatan tambahan jika diperlukan. Jika anda tidak mengambil suplemen multivitamin, anda juga boleh mempunyai tahap vitamin A, E, K dan asid folik yang rendah dalam darah anda. Oleh itu, doktor anda akan mengawasi tahap darah anda dan menentukan vitamin-vitamin tambahan jika diperlukan.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil, baru-baru ini telah mengambil atau mungkin mengambil apa-apa ubat-ubatan lain.

Cavsamir tidak boleh diambil serentak dengan *ciprofloxacin* (antibiotik).

Jika anda mengambil ubat-ubatan untuk masalah rentak jantung atau untuk epilepsi, anda perlu berbincang dengan doktor apabila anda mengambil Cavsamir.

Kesan ubat-ubatan seperti ciclosporin, mycophenolate mofetil dan tacrolimus (ubat yang digunakan untuk menahan sistem imun) mungkin dikurangkan oleh Cavsamir. Doktor anda akan menasihati anda jika anda mengambil ubat-ubat ini

Kekurangan hormon tiroid secara luar biasa boleh diperhatikan dalam di sebilangan pesakit yang mengambil *levothyroxine* (digunakan untuk rawatan tahap hormon tiroid yang rendah) dan Cavsamir. Oleh itu, doktor anda boleh mengawasi tahap hormone perangsang tiroid dalam darah anda dengan lebih teliti.

Cara menggunakan Cavsamir

Sentiasa mengambil Cavsamir tepat seperti yang doktor anda telah memberitahu anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

- Telan tablet anda secara oral dengan segelas air.
- Jangan menghancurkan, mengunyah atau memecahkan ubat anda kepada kepingan-kepingan.
- Anda perlu mengambil Cavsamir selepas makan.

Berapa banyak harus digunakan

Doktor anda akan menentukan dos kepada anda berdasarkan tahap fosforus dalam serum anda

Dos permulaan Cavsamir yang disyorkan untuk orang dewasa dan orang tua (> 65 tahun) ialah 1~ 2 tablet Cavsamir selepas makan, 3 kali sehari.

Dalam sesetengah kes, Cavsamir perlu diambil pada masa yang sama berserta dengan ubat-ubatan yang lain. Doktor anda mungkin menasihati anda

CAVSAMIR

Sevelamer Carbonate Tablets 800mg

untuk mengambil ubat ini 1 jam sebelum atau 3 jam selepas pengambilan Cavsamir, atau doktor mungkin mempertimbangkan untuk mengawasi tahap darah anda.

Cavsamir tidak digalakkan untuk digunakan pada kanak-kanak dan remaja di bawah 18 tahun.

Bila perlu digunakan

Ambil Cavsamir pada waktu yang sama setiap hari kecuali doktor anda memberitahu anda sebaliknya.

Berapa lama perlu digunakan

Teruskan pengambilan ubat selagi doktor anda memberitahu anda untuk meneruskannya.

Jika terlupa menggunakan

- Jika anda terlupa untuk mengambil tablet anda, mengabaikan dos yang terlepas dan mengambil tablet seterusnya pada masa yang biasa.
- Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan tablet yang terlupa.
- Jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut mengenai penggunaan produk ini, sila minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Tiada kes berkaitan dengan pengambilan dos berlebihan telah dilaporkan oleh pesakit. Jika anda mungkin mengambil dos berlebihan, anda perlu menghubungi doktor anda dengan segera. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Cavsamir

Perkara yang perlu dilakukan

Kehamilan dan menyusukan bayi
Minta nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini jika:

- Anda sedang mengandung, berfikir anda mungkin mengandung atau

merancang untuk mengandung. Ia tidak diketahui sama ada Cavsamir mempunyai apa-apa kesan terhadap bayi dalam kandungan anda.

- Anda ingin menyusukan bayi anda. Ia tidak diketahui sama ada Cavsamir boleh didapati dalam susu ibu dan akan menjejaskan bayi anda.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan memberikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.
- Jangan gunakan ubat ini untuk merawat sebarang aduan lain melainkan jika doktor anda memberitahu anda.
- Jangan berhenti mengambil Cavsamir, atau menukar dos, tanpa memeriksa dengan doktor anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin
Tiada kajian dijalankan ke atas kesan keupayaan untuk memandu dan menggunakan jentera. Jika anda terjejas, jangan teruskan pemanduan dan jangan menggunakan mana-mana alat atau jentera.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat-ubatan mempunyai beberapa kesan sampingan yang tidak diingini tetapi bukan semua orang akan mengalaminya.

Jangan terkejut dengan kesan-kesan sampingan yang mungkin dialami dalam senarai ini.

Anda berkemungkinan besar tidak akan mengalami apa-apa daripada mereka.

Beritahu doktor anda dengan segera
Kesan sampingan yang sangat biasa

- Muntah
- Sembelit
- Sakit abdomen atas
- Loya

Kesan sampingan biasa

- Cirit-birit
- Sakit di bahagian abdomen

- Ketidakhadaman
- Keflatulenan

Kes-kes seperti alah (hipersensitif), kegatalan, ruam, motilitas (pergerakan) usus secara perlahan / usus tersumbat dan penembusan di dalam dinding usus telah dilaporkan.

Sembelit merupakan salah satu gejala awal yang mungkin berkaitan dengan usus tersumbat. Jika ia berlaku, sila maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas boleh berlaku pada sesetengah orang

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Cavsamir

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30 Celsius. Simpan di dalam bekas. Lindungi dari kelembapan. Jauhkan daripada jangkauan dan penglihatan kanak-kanak

- Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bersalut filem berwarna putih hingga hampir putih, berbentuk bujur dengan permukaan kosong pada satu sisi dan ukiran "R789" pada sisi yang lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Sevelamer Carbonate

CAVSAMIR

Sevelamer Carbonate Tablets 800mg

- Bahan-bahan tidak aktif

Mannitol , Crospovidone Type B (XL-10), Hydroxypropyl Cellulose (Klucel LF), Colloidal Silicon Dioxide, Zinc Stearate, Opadry AMB Translucent (OY-B-29000), Purified water, Opacode Black S-1-17823

Nombor MAL:

MAL21066027AZ

Pengilang

Dr. Reddy's Laboratories Limited,
FTO SEZ - Process Unit 1,
Survey No.'s 57 to 59, 60, 62 & 72,
Sector No.'s 9 to 14 & 17 to 20,
Devunipalavalasa (V), Ranasthalam(M),
Srikakulam District - 532409,
Andhra Pradesh, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

GoodScience Sdn Bhd
No.7, Jalan KPK 4/3,
Kawasan Perindustrian Kundang,
Kundang Jaya, 48020 Rawang,
Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

09/06/2025

Nombor Siri

NPRA(R2) 20/116