

AKTIPROL TABLETS

Amisulpride (100mg, 400mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Aktiprol
2. Bagaimana Aktiprol berfungsi
3. Sebelum menggunakan Aktiprol
4. Cara menggunakan Aktiprol
5. Semasa menggunakan Aktiprol
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Aktiprol
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP
11. No. Siri

Apakah kegunaan Aktiprol

Aktiprol mengandungi ubat yang dipanggil amisulpride. Ini tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil 'antipsikotik'. Ia digunakan untuk merawat penyakit yang dipanggil skizofrenia. Ubat ini digunakan untuk merawat pegrhidap skizofrenia. Skizofrenia adalah penyakit mental yang dicirikan oleh gangguan mental dan tingkat laku, seperti halusinasi atau agitasi.

Bagaimana Aktiprol berfungsi

Aktiprol berfungsi dengan menyenangkan pemikiran, perasaan dan tingkah laku terganggu. Ia digunakan untuk merawat skizofrenia apabila ia bermula dan juga dalam jangka masa panjang.

Sebelum menggunakan Aktiprol

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Aktiprol:

- jika anda alah kepada amisulpride atau bahan-bahan lain ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat Lanjut); Ini adalah kerana ubat ini mungkin memberi kesan terhadap sel darah anda, contohnya mengurangkan bilangan sel darah putih. Masalah ini boleh diperhatikan daripada ujian darah
- jika anda mempunyai *pheochromocytoma* (pertumbuhan berlebihan kelenjar adrenal di sekitar buah pinggang, mengeluarkan bahan yang menyebabkan tekanan darah tinggi),
- pada kanak-kanak di bawah umur 15 tahun
- jika anda mempunyai tumor yang bergantung kepada prolaktin (prolaktin adalah hormon yang merangsang pengeluaran susu),

seperti kanser payudara atau gangguan pituitari,

- jika anda mengambil ubat lain. Sekiranya ini berlaku, pastikan penggunaan gabungan dengan Aktiprol tidak dikontraindikasikan

Jangan mengambil ubat ini jika mana-mana yang di atas berkenaan dengan anda. Jika anda tidak pasti, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Aktiprol.

- Sebelum menggunakan Aktiprol

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Aktiprol, Doktor anda mungkin meminta anda mengambil ujian elektrokardiogram (ECG) sebelum memulakan rawatan. Ubat ini boleh menyebabkan gangguan irama jantung. Ubat ini harus digunakan dengan berhati-hati dalam situasi berikut:

- Anda adalah warga tua, terutamanya jika anda mengalami demensia, kerana risiko penurunan tekanan darah dan mengantuk; jika pesakit mengalami kegagalan buah pinggang doktor anda boleh mengurangkan dos
- jika anda mempunyai faktor risiko untuk strok, yang berlaku apabila aliran darah terganggu secara tiba-tiba di bahagian otak
- Sekiranya anda atau ahli keluarga mempunyai sejarah darah beku, kerana mengambil ubat antipsikotik boleh menyebabkan pembentukan pembekuan darah
- jika anda mempunyai penyakit buah pinggang (kegagalan buah pinggang), doktor anda boleh mengurangkan dos,
- jika anda mempunyai epilepsi atau penyakit Parkinson
- jika anda mempunyai atau berisiko mengalami kencing manis (misalnya berat badan berlebihan atau sejarah kencing manis). Doktor anda harus memeriksa gula darah anda sebelum anda mula mengambil Aktiprol dan kerap semasa rawatan.
- Sekiranya anda mempunyai sejarah hiperprolaktinemia (terlalu banyak prolaktin dalam darah) atau tumor yang bergantung kepada prolaktin (prolaktin adalah hormon yang merangsang pengeluaran susu), misalnya penyakit kanser payudara atau pituitari. Jika ini berlaku, doktor

anda perlu memantau anda dengan teliti semasa rawatan.

Masalah hati yang serius telah dilaporkan dengan pengambilan Aktiprol. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami keletihan, kehilangan selera makan, loya, muntah, sakit perut, mata atau kulit menguning.

Berhenti rawatn dan beritahu doktor anda segera jika anda mengalami ketegaran otot atau kehilangan otot yang berkaitan dengan sakit otot (*rhabdomyolysis*), dan jika anda mempunyai peningkatan dalam tahap enzim otot creatine phosphokinase (CPK) dalam darah dan gangguan dalam kesedaran disertai dengan demam yang tidak dapat dijelaskan: hentikan rawatan anda dengan segera dan berjumpa dengan doktor anda dengan segera kerana ini boleh membawa maut.

Jika, anda mengalami gangguan visual atau sakit kepala semasa rawatan, beritahudoktor anda dengan segera.

Sekiranya anda mengalami jangkitan atau demam yang tidak dapat dijelaskan, doktor anda mungkin menjalani ujian darah dengan segera. Ini kerana ubat ini mungkin mempunyai kesan ke atas sel darah anda, iaitu mengurangkan jumlah sel darah putih. Masalah ini boleh dilihat dalam ujian darah.

Rawatan dengan ubat ini tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba kerana ini boleh menyebabkan sindrom "*withdrawal*". Ini dicirikan oleh tanda-tanda seperti insomnia, mual dan muntah. Pergerakan yang tidak normal juga boleh diperhatikan dan gangguan psikotik berulang.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Mengandung

Aktiprol tidak disyorkan semasa mengandung dan pada wanita yang berpotensi melahirkan anak yang tidak menggunakan kontraseptif yang berkesan. Jika anda menggunakan Aktiprol dalam tempoh tiga bulan terakhir kehamilan, bayi anda mungkin

AKTIPROL TABLETS

Amisulpride (100mg, 400mg)

mengalami pergolakan, ketegangan otot yang meningkat, badan menggeletar secara tidak sengaja, mengantuk, masalah pernafasan atau kesukaran untuk menyusu. Bincang dengan doktor anda, jika bayi anda mengalami mana-mana gejala ini.

Penyusuan susu ibu

Anda tidak harus menyusu semasa terapi dengan Aktiprol. Bincang dengan doktor anda tentang cara terbaik untuk menyusukan bayi anda jika anda mengambil Aktiprol.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Khususnya, jangan ambil ubat ini jika anda sedang menjalani rawatan dengan:

- Ejen-ejen sedatif yang boleh mempunyai kesan ketegangan tambahan pada sistem saraf pusat dan menyumbang kepada penurunan kewaspadaan: *Morphine derivatives* (analgesics, penahan batuk, dan rawatan pengganti), *neuroleptics*, *barbiturates*, *benzodiazepines*, *anxiolytics* bukan *benzodiazepine* (seperti *meprobamate*), *hypnotics*, ubat penenang antidepresan (*amitriptyline*, *doxepin*, *mianserine*, *mirtazapine*, *trimipramine*), sedatif *H1-antihistamine*, agen antihipertensi yang bertindak secara berpusat, *baclofen* dan *thalidomide*.
- Ubat-ubatan mungkin menyebabkan *torsades de pointes*
 - Diberi intravena *dolasteron*, *erythromycin*, *spiramycin*, dan *vincamine* boleh menyebabkan aritmia (*arrhythmia*). Menggunakan dua ubat *torsadogenik* (*torsadogenic*) bersama tidak dibenarkan.
 - *citalopram*, *escitalopram*, *domperidone*, *hydroxyzine* dan *piperaquine*
- Gabungan yang dikontraindikasi
 - Non-antiparkinsonian Agonis dopamin (*Dopamine agonists*) tidak termasuk *antiparkinson* (*cabergolin*, *quinagolide*)
 - *Citalopram*, *escitalopram*, *domperidone*, *hydroxyzine*, *piperaquine*, meningkatkan risiko aritmia ventrikel (*ventricular*

arrhythmias), terutamanya *torsades de pointes*

- Kombinasi yang tidak dinasihatkan
 - *Antiparasitics* (*chloroquine*, *halofantrine*, *lumefantrine*, *pentamidin*)
 - Ubat antiparkinson dopaminergic Antiparkinsonian dopamine agonist (*amantadine*, *apomorphine*, *bromocriptine*, *entacapone*, *lisuride*, *pergolide*, *piribedil*, *pramipexole*, *rasagiline*, *ropinirole*, *selegiline*)
 - Kelas IA *antiarrhythmics* (*quinidine*, *hydroquinidine*, *disopyramide*) dan kelas III *antiarrhythmics* (*amiodarone*, *dronedarone*, *sotalol*, *dofetilide*, *ibutilide*), dan ubat-ubatan lain seperti sebatian arsenik, *diphemanil*, *dolasetron* IV, *erythromycin* IV, *levofloxacin*, *mequitazine*, *mizolastine*, *prucalopride*, *vincamine* IV, *moxifloxacin*, *spiramycin* IV, *toremifene*, *vandetanib*
 - *Neuroleptics* lain (*chlorpromazine*, *cyamemazine*, *droperidol*, *flupenthixol*, *fluphenazine*, *haloperidol*, *levomepromazine*, *pimozide*, *pipamperone*, *pipotiazine*, *sertindole*, *sulpiride*, *sultopride*, *tiapride*, *zuclopenthixol*).
 - Penggunaan alkohol, *levodopa*, *methadone*, *natrium oxybate*, *hydrochloroquine*
- Kombinasi yang memerlukan langkah berjaga-jaga untuk digunakan untuk merawat penyakit Parkinson
 - *Anagrelide*, *Azithromycin*, *Ciprofloxacin*, *clarithromycin*, *levofloxacin*, *norfloxacin*, *roxithromycin*
 - *Beta-blocker* pada pesakit dengan kegagalan jantung (*bisoprolol*, *carvedilol*, *metoprolol*, *nebivolol*)
 - Agen *Bradycardia* (terutamanya *antiarrhythmics* kelas IA, *beta-blocker*, *antiarrhythmics* kelas III tertentu, *calcium channel blockers* tertentu, *digitalis glycosides*, *pilocarpine*, agen *Anticholinesterase*)
 - Agen mengurangkan kalium (diuretik yang mengurangkan kalium, bersendirian atau digabungkan, *laxative* perangsang, *glucocorticoids*, *tetracosactides* dan IV *amphotericin B*)

- Lithium, ondansetron
- Kombinasi yang perlu dipertimbangkan
 - Ubat sedative lain, *orlistat*

Cara menggunakan Aktiprol

- Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa mengambil Aktiprol tepat seperti yang doktor anda telah memberitahu anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti. Jangan berhenti rawatan sendiri. Ubat ini harus diambil melalui mulut. Menelan tablet dengan sedikit air.

Jumlah Aktiprol anda ambil akan bergantung kepada penyakit anda. Ikut arahan doktor anda dengan teliti.

Dewasa

Dos yang biasa ialah antara 50mg dan 800mg setiap hari. Doktor anda mungkin akan memulakan anda dengan dos yang lebih rendah jika perlu. Jika perlu, doktor anda boleh mempreskripsikan dos sehingga 1200mg setiap hari. Dos sehingga 400mg setiap hari boleh diambil sebagai dos tunggal. Ambil dos pada masa yang sama setiap hari. Dos melebihi 400mg perlu diambil sebagai separuh pada waktu pagi dan separuh pada waktu petang

Warga tua

Doktor anda perlu memberi lebih perhatian pada anda kerana anda lebih cenderung untuk mengalami tekanan darah rendah atau mengantuk dengan pengambilan ubat ini

Pesakit yang mengalami masalah buah pinggang

Doktor anda mungkin perlu memberi anda dos yang lebih rendah

Kanak-kanak dan remaja

Ubat ini tidak boleh diberikan kepada kanak-kanak di bawah umur 15 tahun. Penggunaan ubat ini tidak disyorkan untuk kanak-kanak berumur antara 15 hingga 18 tahun.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda. Jumlah
Telan Aktiprol dengan air minuman. Jangan mengunyah tablet anda. Jika anda rasa kesan ubat anda terlalu lemah atau terlalu kuat, jangan mengubah dos diri sendiri, tetapi bincang dengan doktor anda.

AKTIPROL TABLETS

Amisulpride (100mg, 400mg)

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil Aktiprol sehingga doktor anda memberitahu anda untuk berhenti. Jangan berhenti mengambil Aktiprol hanya kerana anda berasa lebih baik. Jika anda berhenti, penyakit anda boleh menjadi lebih teruk atau kembali. Melainkan jika doktor anda memberitahu anda sebaliknya, Aktiprol tidak harus dihentikan tiba-tiba.

Menghentikan rawatan tiba-tiba boleh menyebabkan gejala seperti susah tidur atau berasa amat resah, ketegangan otot atau pergerakan badan luar biasa atau keadaan asala anda mungkin Kembali

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil terlebih ubat daripada yang sepatutnya, hubungi doktor anda atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat dengan segera. Bawa bungkusan ubat bersama anda. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan rasa mengantuk, tenang (kesan relaks), penurunan tekanan darah, gejala *extrapyramidal* (terutamanya gementar dan kekejangan otot) atau anda mungkin coma.

Semasa menggunakan Aktiprol

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Aktiprol.

Jika anda akan mula mengambil sebarang ubat baru, beritahu doktor dan ahli farmasi bahawa anda sedang mengambil Aktiprol

Pengambilan Aktiprol boleh menjejaskan keputusan ujian darah dan air kencing. Ini termasuk ujian untuk mengukur hormon

yang dipanggil 'prolaktin' dan ujian hati. Jika anda akan menjalani ujian darah, adalah penting untuk memberitahu doktor anda bahawa anda sedang mengambil Aktiprol

Jika anda ada sebarang pertanyaan tentang ubat ini, sila rujuk doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan melainkan jika doktor anda memberitahu anda. Ini boleh meningkatkan risiko kesan sampingan. Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

Jangan gunakan ubat ini untuk merawat sebarang aduan lain melainkan jika doktor anda memberitahu anda.

Jangan minum alkohol ketika mengambil Aktiprol. Ini diebakkan ia akan menjejaskan cara ubat ini berfungsi.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Aktiprol mengandungi laktosa

Ubat ini mengandungi sejenis gula (laktosa) yang dipecah menjadi galaktosa dan glukosa. Anda tidak harus menggunakan ubat ini jika anda mempunyai intoleransi galaktosa, kekurangan Lapp laktase atau glukosa / sindrom kekurangan penyerapan galaktosa (penyakit keturunan yang jarang berlaku).

Sekiranya doktor anda memberitahu anda bahawa anda tidak bertoleransi terhadap gula tertentu, hubunginya sebelum mengambil ubat ini.

Memandu dan menggunakan mesin

Semasa rawatan dengan ubat ini, anda mungkin berasa mengantuk dan mempunyai penglihatan yang kabur. Jika ini berlaku, jangan memandu atau menggunakan sebarang alat atau mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Aktiprol boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Jika, semasa rawatan, anda mengalami kekejangan otot dan gangguan kesedaran, bersama-sama dengan demam yang tidak dapat dijelaskan, menghentikan rawatan serta-merta dan dapatkan rawatan perubatan segera.

Kesan sampingan berikut adalah sangat biasa (memberi kesan kepada lebih daripada 1 pesakit dalam 10):

- Pergerakan perlahan dan tidak disengajakan, tangan dan kepala menggeleng, pergerakan tegar, mimik muka menjadi kaku, ketegangan otot dan menghasilkan lebih banyak air liur daripada biasa.

Kesan sampingan berikut adalah sangat biasa (memberi kesan kepada lebih 1 pesakit dalam 10):

- Menggeletar, kekejangan otot, kekejangan, pergerakan yang tidak normal, menghasilkan lebih banyak air liur daripada biasa

Kesan sampingan berikut adalah biasa (memberi kesan kepada 1 hingga 10 pesakit dalam 100):

- leher kaku, krisis "oculogyric" (pergerakan yang tidak normal pada otot mata tertentu), penguncupan rahang,
- mengantuk
- insomnia, keresahan, kebimbangan
- sembelit, loya, muntah, mulut kering
- kekurangan keseronokan seksual pada Wanita
- hiperprolaktinemia (terlalu banyak prolaktin, hormon yang mendorong pengeluaran susu, dalam darah), yang boleh menyebabkan:
 - pada wanita: tempoh tiada haid, pengeluaran susu tidak normal, sakit payudara
 - pada lelaki: bengkak payudara, mati pucuk
- Peningkatan berat badan
- Tekanan darah rendah (hipotensi)
- Penglihatan kabur

Kesan sampingan berikut jarang berlaku (memberi kesan kepada 1 hingga 10 persakit dalam 1000):

- Pergerakan sukarela daripada lidah dan/atau muka
- sawan (secara tidak sengaja kontraksi satu atau lebih otot)
- hiperglisemia (terlalu banyak gula dalam darah)
- hipertriglisieridemia (banyak lemak (triglisierida) dalam darah)
- hiperkolesterolemia (terlalu banyak kolesterol dalam darah)
- degupan jantung perlahan
- peningkatan tahap enzim hati tertentu, terutamanya transaminase
- kecederaan tisu hati

AKTIPROL TABLETS

Amisulpride (100mg, 400mg)

- mengurangkan ketumpatan tulang atau perubahan dalam struktur tulang (osteopenia, osteoporosis), melemahkan tulang
- tindak balas alahan
- kekeliruan
- hidung tersumbat
- gangguan paru-paru (pneumonia aspirasi) yang mungkin muncul sebagai keradangan, kesukaran bernafas, jangkitan, batuk (terutamanya digabungkan dengan ubat lain dengan kesan penekan saraf pusat),
- peningkatan tekanan darah
- kesukaran membuang air kecil
- *leukopenia, neutropenia*

Kesan sampingan berikut jarang berlaku (memberi kesan kepada 1 hingga 10 persakit dalam 10000):

- agranulositosis (tahap rendah sel darah putih)
- tumor pituitari benigna, yang boleh menyebabkan tanda-tanda sedemikian sebagai gangguan penglihatan atau sakit kepala
- penurunan dalam jumlah natrium
- dalam darah (hyponatremia), sindrom tidak sesuai hormon antidiuretik rembesan
- demam yang tidak dapat dijelaskan dengan umum dan gangguan saraf
- pengsan yang serius (kehilangan kesedaran), irama jantung gangguan yang mungkin menyebabkan kematian
- bengkak, sakit dan kemerahan daripada bahagian kaki. Ini adalah kerana darah beku dalam urat (terutama di bahagian kaki) boleh bergerak melalui saluran darah untuk mencapai paru-paru, menyebabkan sakit dada dan kesukaran pernafasan
- muka bengkak secara tiba-tiba dan/atau leher yang boleh membawa kepada kesukaran bernafas dan mungkin mengancam nyawa (angioedema), merah, gatal tompok pada kulit (gatal).

Kesan sampingan berikut mungkin berlaku, tetapi kekerapan tidak diketahui:

- sindrom “*withdrawal*” pada bayi baru lahir
- sindrom kaki gelisah (perasaan tidak selesa di kaki yang sementara dilepaskan oleh pergerakan, dan lebih buruk pada penghujung hari).

- peningkatan kepekaan kulit apabila terdedah kepada sinar matahari dan cahaya ultraviolet.
- jatuh kerana kehilangan keseimbangan yang mungkin melibatkan patah tulang.
- pemusnahan serat otot dan sakit otot (*rhabdomyolysis*)
- peningkatan tahap creatine phosphokinase dalam darah (ujian darah menunjukkan kecederaan otot).

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami:

- Peningkatan paras gula dalam darah dan/atau symptom gula darah tinggi (cth. Peningkatan dahaga, peningkatan rasa lapar dan kerap membuang air kecil)
- Sensasi kaki yang tidak menyenangkan dan keinginan yang kuat untuk mengerakkan kaki (sindrom kaki resah)
- Kesukaran atau ketidakupayaan untuk membuang air kecil (retensi air kencing)

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika ada kesan-kesan sampingan yang serius atau berterusan lebih lama daripada beberapa hari, atau jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Aktiprol

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak. Jangan gunakan ubat ini selepas tempoh tarikh tamat yang dinyatakan pada kotak itu. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut. Simpan di bawah suhu 30°C di dalam bungkusan asalnya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet Aktiprol 100mg: Tablet berwarna putih, berbentuk bulat dan rata dengan diameter 9.5 mm dan timbul perkataan ‘MC’ pada satu sisi.

Tablet Aktiprol 400mg: Tablet cembung berbentuk kapsul dan berwarna putih, dengan garisan skor di kedua-dua belah, dengan dimensi 19 x 10 mm. Garisan skor hanya untuk mempermudah pecahan tablet supaya memudahkan penelanan ubat dan bukan untuk pembahagian dos yang sama.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Tablet 100mg dan 400mg mengandungi bahan aktif Amisulpride

- Bahan tidak aktif

Aktiprol 100mg: Sodium starch glycolate (Type A), Hypomellose 2910, Microcrystalline cellulose PH101, Lactose Monohydrate

Aktiprol 400mg: Lactose monohydrate 230 mesh, Sodium starch glycolate type A, Hypomellose 2910 E5, Microcrystalline cellulose 101, Magnesium stearate

- Nombor MAL

Aktiprol 100mg Tablet
MAL*****AZ

Aktiprol 400mg Tablet
MAL24056073AZ

Pengilang

Medochemie Ltd (Central Factory), Konstantinopoleos 1-10, Limassol, 3011 Cyprus

Pemegang Pendaftaran Produk

Komedic Sdn Bhd, 4, Jalan PJS 11/14, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor

Tarikh kemas kini RiMUP

10/06/2025

No. Siri

NPRA(R2)25/023

AKTIPROL TABLETS

Amisulpride (100mg, 400mg)
