

MEDIRUB LINIMENT 25%v/v

Methyl Salicylate (25%v/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Medirub Liniment 25%v/v
2. Bagaimana Medirub Liniment 25%v/v berfungsi
3. Sebelum mengambil Medirub Liniment 25%v/v
4. Cara mengambil Medirub Liniment 25%v/v
5. Semasa mengambil Medirub Liniment 25%v/v
6. Kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan Medirub Liniment
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Medirub Liniment 25%v/v

Medirub Liniment 25%v/v digunakan untuk melegakan kesakitan termasuk reumatisme, arthritis, sakit belakang, bengkak, terseliuh dan ketegangan otot, akibat kecederaan sukan.

Bagaimana Medirub Liniment 25%v/v berfungsi

Medirub Liniment 25%v/v mengandungi Methyl Salicylate yang mempunyai kesan analgesik dan rubefasen. Ia meningkatkan aliran darah, memberikan rasa hangat dan melegakan kesakitan yang cepat.

Sebelum mengambil Medirub Liniment 25%v/v

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil jika anda alah kepada Methyl Salicylate atau mana-mana bahan-bahan lain dalam produk ini.

- Sebelum mula mengambil

Elakkan penggunaan atas luka terbuka.

Persediaan ini mengandungi benzyl alcohol, penggunaannya harus dielakkan pada kanak-kanak di bawah 2 tahun.

Tidak boleh digunakan pada neonat.

- Jika mengambil ubat- ubatan lain

Bagi pesakit yang mengambil Warfarin, aplikasi yang berlebihan ke atas kulit untuk sakit otot atau sendi boleh meningkatkan risiko pendarahan.

Cara mengambil Medirub Liniment 25%v/v

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan sedikit minyak berubat pada bahagian yang berkenaan dan urut dengan pengguling secara lembut selama 1 minit.

- Bila perlu diambil

Gunakannya apabila perlu.

- Berapa lama perlu diambil

Ulangi 2 hingga 3 kali sehari atau menggunakannya mengikut keperluan untuk mendapatkan kelegaan.

- Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa ambil Medirub Liniment 25%v/v, ambilkannya apabila anda teringat.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Overdos tidak mungkin berlaku. Sekiranya termakan secara tidak sengaja, pesakit perlu dihantar ke hospital yang terdekat untuk mendapatkan nasihat perubatan.

Semasa mengambil Medirub Liniment 25%v/v

- Perkara yang perlu dilakukan

Periksa dengan doktor anda jika simptom berlarutan atau bertambah teruk.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil ubat ini untuk keadaan lain kecuali diarahkan oleh doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Bagi pesakit yang mempunyai kulit sensitif, kulit yang disapu mungkin kelihatan merah tetapi ia akan hilang tidak lama kemudian.

Kesan Sampingan

Kadang-kadang sensitif pada kulit boleh berlaku kepada sesetengah orang yang sensitif. Ruam kulit, gatal-gatal dan kemerahan juga telah dilaporkan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (Consumer → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF or Vaccines (AEFI))).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Medirub Liniment

Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Pastikan penutup tertutup rapat selepas dibuka.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

- Pelupusan

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Medirub Liniment 25%v/v adalah cecair yang jelas kekuningan.

- Bahan-bahan

- Bahan-bahan aktif
Methyl Salicylate 25%v/v

- Bahan-bahan tidak aktif
Menthol, Eucalyptus Oil, Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Isopropyl Myristate, N-Methyl-2-Pyrrolidone, Arachis Oil, Propylene Glycol, Isopropyl Alcohol.

- MAL Number:

MALxxxxxxxxx

Pengilang

WINWA MEDICAL SDN. BHD.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

WORLD MEDICARE SUPPLIES SDN. BHD.

PT5740 (1st Floor), Jalan TS 2/1E,
Taman Semarak 2, 71800 Nilai,
Negeri Sembilan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

29/01/2020

Nombor siri:

NPRA(R2)20/009