

# MEDIZINE SYRUP 5MG/5ML

Cetirizine hydrochloride (5mg/5ml)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Medizine Syrup
2. Bagaimana Medizine Syrup berfungsi
3. Sebelum mengguna Medizine Syrup
4. Cara menggunakan Medizine Syrup
5. Semasa menggunakan Medizine Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Medizine Syrup
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Medizine Syrup

Medizine Syrup digunakan untuk merawat orang dewasa dan kanak-kanak 2 tahun dan keatas yang mempunyai demam alergi (rhinitis alergi bermusim) seperti debu atau alahan haiwan (rinitis alergi perennial) dan urtikaria (bengkak, kemerahan dan kegatalan kulit).

## Bagaimana Medizine Syrup berfungsi

Bahan aktif ubat ini adalah cetirizine. Ia tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai antihistamina. Ia berfungsi dengan menyekat bahan semulajadi tertentu (histamina) yang dihasilkan oleh badan anda semasa tindak balas alergi.

## Sebelum menggunakan Medizine Syrup

### - Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Medizine Syrup jika anda:

- hipersensitif terhadap cetirizine, hydroxyzine, piperazine atau mana-mana bahan kandungan lain seperti yang dinyatakan pada akhir risalah ini.
- mempunyai masalah buah pinggang teruk (pembersihan kreatinin kurang daripada 10ml/min).

### *Kanak-kanak*

Tidak disarankan digunakan pada kanak-kanak di bawah umur 2 tahun.

### - Sebelum mula mengguna

Anda perlu menyemak dengan doktor anda jika anda mempunyai:

- masalah buah pinggang sederhana atau teruk.
- kesukaran membuang air kecil.
- sawan
- konvulsi

### *Mengandung dan penyusuan bayi*

Beritahu doktor anda jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusukan bayi.

Ia tidak digalakkan untuk wanita hamil dan ibu menyusu kecuali manfaat yang dijangka melebihi potensi risiko.

Tiada bukti mencukupi yang menunjukkan penggunaannya adalah selamat dalam tempoh kehamilan ibu mengandung ataupun tahap kesuburan. Langkah berjaga-jaga perlu diambil apabila menyusukan anak kerana cetirizine meresap ke dalam dalam susu ibu.

### - Jika mengambil ubat-ubat lain

Tiada interaksi yang dikenali dengan ubat lain. Walau bagaimanapun, cetirizine harus digunakan dengan berhati-hati jika mengambil bersama alkohol atau agen depresi sistem saraf pusat (CNS) yang lain.

## Cara menggunakan Medizine Syrup

### - Berapa banyak harus digunakan

Anda perlu mengambil Medizine Syrup tepat seperti yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Jumlah yang anda ambil setiap hari bergantung kepada keadaan anda. Jangan mengambil lebih atau kurang daripada apa yang doktor anda menetapkan.

Pengambilan oral.

Dewasa: Dos awal 5mg diambil bergantung pada simptom-simptom jika mencapai kawalan yang memuaskan atau 10mg sekali sehari.

Kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas: 10mg, sekali sehari.

Kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun: 5mg, dua kali sehari.

Kanak-kanak dari usia 2 hingga 6 tahun: 2.5mg, dua kali sehari.

*Dos disyorkan untuk orang dewasa dengan masalah buah pinggang dan hati*

Tahap	Aras Creatinine (ml/min)	Dos
Normal	≥80	10 mg (10ml) sekali sehari
Amat Sederhana	50-79	10 mg (10ml) sekali sehari
Sederhana	30-49	5 mg (5ml) sekali sehari
Teruk	< 30	5 mg (5ml) sekali selang 2 hari
Tahap akhir penyakit buah pinggang –Orang dewasa mengambil rawatan dialisis	< 10	Tidak disyorkan

Bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah buah pinggang, dos akan disesuaikan berdasarkan pembersihan ginjal, usia dan berat badan.

### - Bila perlu digunakan

Gunakan Medizine Syrup apabila diperlukan dan mengikut preskripsi doktor.

### - Berapa lama perlu digunakan

Ia adalah penting untuk mengambil Medizine Syrup untuk tempoh yang ditetapkan oleh doktor.

### - Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

### - Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Simptom pengambilan dos berlebihan termasuk deprasi pada sistem saraf pusat (CNS), kecelaruan, cirit-birit, pening, keletihan, sakit kepala, lesu, anak mata mengembang, gelisah, sedatif, mengantuk sampai boleh membawa seseorang ke koma, kebas, kadar dengupan jantung cepat, menggigil dan kesukaran untuk mengeluarkan air kencing.

## Semasa menggunakan Medizine Syrup

### - Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Medizine Syrup.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Jangan berkongsi Medizine Syrup dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan mesin. Jika ubat ini membuat anda berasa mengantuk, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Elakkan pengambilan alkohol.

**Kesan-kesan Sampingan**

Seperti semua ubat, Medizine Syrup boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan, tetapi bukan setiap orang mengalami mereka. Kesan sampingan berikut amat jarang berlaku, tetapi anda mesti berhenti mengambil ubat ini dan berjumpa dengan doktor anda dengan segera jika anda mendapati gejala ini:

- Reaksi alahan yang teruk termasuk ruam, kegatalan dan demam, bengkak pada kerongkong, muka, kelopak mata atau bibir. Reaksi ini mungkin berlaku tidak lama selepas anda mula mengambil ubat ini, atau ia mungkin berlaku kemudian.

Kesan-kesan sampingan berikut juga telah dilaporkan.

*Kesan-kesan sampingan lazim:*

- Keletihan, mengantuk
- Sakit abdomen
- Sakit kepala
- Pening
- Mulut kering
- Sakit tekak
- Loya
- Simptom-simptom selesema (kanak-kanak sahaja)
- Cirit-birit (kanak-kanak sahaja)

*Kesan-kesan sampingan tidak lazim:*

- Gatal dan ruam
- Kesemutan atau berasa kebas pada tangan atau kaki
- Cirit-birit
- Rasa gelisah
- Rasa lemah atau tidak sihat secara amnya

*Kesan-kesan sampingan jarang-jarang sekali berlaku (menjejaskan kurang daripada 1 dalam 1000 orang):*

- Hipersensitif
- Denyutan jantung yang pantas
- Edema (bengkak menyeluruh disebabkan oleh penahanan air)

- Keputusan ujian fungsi hati yang tidak normal (doktor anda tahu apa langkah yang harus diambil)
- Sawan
- Peningkatan berat badan
- Keagresifan, kekeliruan, kemurungan, halusinasi (mendengar atau melihat benda), tidak dapat tidur
- Urtikaria (gatal-gatal)

*Kesan-kesan sampingan sangat jarang-jarang sekali berlaku:*

- Bilangan platelet dalam darah yang rendah
- Reaksi alahan yang serius
- Penglihatan kabur, kesukaran pemfokusan
- Putaran mata yang tidak terkawal
- Gangguan deria rasa dalam mulut
- Penganan
- Kencing tidur, sakit dan/atau kesukaran membuang air
- Geletar, tik (pergerakan tubuh yang tidak terkawal)
- Pergerakan luar kawalan anggota badan
- Kekejangan otot
- Reaksi alahan yang serius yang menyebabkan bengkak pada muka atau tengkuk
- Ruam kecil yang bengkak and kemerahan pada kulit

Kesan-kesan sampingan tidak diketahui

- Peningkatan selera makan
- Mimpi ngeri
- Gayat
- Inflamasi hati (hepatitis)
- Ruam yang kulit yang bernanah
- Sakit sendi
- Sekatan kencing (kesukaran membuang air kecil)
- Kulit berasa gatal bila pengambilan dihentikan

Sesetengah kes hilang ingatan dan/atau keceklaan juga turut dilaporkan. Dalam kes-kes yang sangat luar biasa, ada pesakit yang terfikir untuk membunuh diri dan jika anda berasa sebegini, berhenti mengambil Medizine Syrup dan jumpa doktor anda.

Jika anda mendapat mana-mana kesan sampingan, beritahu doktor atau ahli farmasi atau jururawat anda. Ini termasuk sebarang kesan sampingan yang tidak tersenarai di risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan adwers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adwers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

**Cara penyimpanan dan pelupusan Medizine Syrup**

- Penyimpanan

Simpan pada atau dibawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

**Maklumat lanjut**

- Rupa dan warna produk

Sirap putih jernih berperisa pisang.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
  - Cetirizine HCl
- Bahan tidak aktif
  - Citric Acid
  - Saccharin Sodium
  - Sodium Benzoate
  - Glycerine
  - Banana Flavour
  - Coarse Sugar
  - Deionised water

- Nombor MAL

MAL

**Pengilang**

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.  
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman Perindustrian Tampoi Indah, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

**Pemegang Pendaftaran Produk**

World Medicare Supplies Sdn.Bhd  
PT.5740 (1<sup>st</sup>.Floor), Jalan TS 2/1E,  
Taman Semarak 2, 71800 Nilai,  
Negeri Sembilan, Malaysia.

**Tarikh Kemaskini RiMUP**

23/10/2020

**Nombor Siri**

NPRA (R2) 20/045