

MEDINAZINE ORAPASTE

0.1% W/W

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Dexamethasone(1.0mg dalam setiap gram)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Medinazine*
2. Bagaimana *Medinazine* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Medinazine*
4. Cara menggunakan *Medinazine*
5. Semasa menggunakan *Medinazine*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Medinazine*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Medinazine*

Medinazine (*Dexamethasone*) digunakan untuk rawatan *stomatitis* (radang di dalam mulut) sukar dikawal atau *glositis* (keradangan lidah) yang berkaitan dengan hakisan atau ulser.

Bagaimana *Medinazine* berfungsi

Dexamethasone adalah sejenis kortikosteroid yang mencegah pelepasan bahan-bahan dalam tubuh yang menyebabkan keradangan.

Sebelum menggunakan *Medinazine*

- Bila tidak boleh menggunakan

Anda tidak boleh menggunakan ubat ini jika anda alah kepada dexamethasone, atau jika anda mempunyai jangkitan kulit pada tubuh.

- Tidak sesuai untuk keadaan *phenylketonurics*.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan guna *Medinazine* jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan guna *Medinazine* jika anda sedang menyusukan anak.

- Sebelum mula menggunakan *Medinazine*

Sebelum anda mula menggunakan ubat ini, beritahu doktor anda jika:

- Anda mempunyai sebarang masalah kesihatan lain

- Anda mempunyai tekanan yang luar biasa, seperti penyakit yang serius, demam atau jangkitan, atau jika anda baru menjalani pembedahan atau kecemasan perubatan.
- Anda berniat untuk mengambil sebarang vaksin semasa rawatan anda dengan ubat ini.
- Anda mempunyai apa-apa penyakit atau jangkitan dalam beberapa minggu sebelum ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan *Medinazine*

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan *Medinazine*

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil *Medinazine*.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi *Medinazine* kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan berada berhampiran orang yang sakit atau mempunyai jangkitan.

Elakkan minum alcohol semasa anda mengambil dexamethasone.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Medinazine* boleh menyebabkan kesan sampingan,

MEDINAZINE ORAPASTE 0.1% W/W

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Dexamethasone(1.0mg dalam setiap gram)

walaupun bukan semua orang
mengalaminya.

Tiada kesan sampingan yang serius
timbul daripada penggunaan kecuali
pemberhentian penggunaan dari seorang
pesakit yang mengadu kebas pada
bahagian penggunaan ubat ini.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda
dengan segera jika anda mengalami
sebarang kesan sampingan selepas
menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan
sampingan atau kesan advers ubat
kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers
Ubat Kebangsaan melalui laman web
npra.gov.my [Consumers→ Reporting
Side Effects to Medicines (ConSERF)
or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Medinazine

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-
kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C. Jangan
simpan di peti sejuk.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan
melalui air buangan atau sisa isi
rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi
mengenai cara yang betul untuk
melupuskan ubat yang tidak
diperlukan lagi. Langkah ini dapat
membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Salap orabase berwarna putih dan
berbau strawberi.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Dexamethasone

- Bahan tidak aktif
*Light liquid paraffin, white
petrolatum, butylated*

*hydroxytoluene, aspartame,
strawberry flavor, sodium
polyacrylate dan ethanol
0.04% w/w.*

- Nombor MAL

Pengilang

Yuan Chou Chemical and
Pharmaceutical Co. Ltd.
No. 272, Nangang 3rd Rd, Nantou City,
Nantou County 54067, Taiwan.

Pemegang Pendaftaran Produk

World Medicare Supplies Sdn. Bhd.
Pt 5740 (1st floor) Jalan TS 2/1E,
Taman Semarak 2, 71800 Nilai, Negeri
Sembilan.

Tarikh kemaskini RiMUP

Januari 2022

Nombor Siri

NPRA (R2) 21/064