

MEDINAZOLE PLUS CREAM

Econazole Nitrate / Triamcinolone Acetonide (1%w/w / 0.1%w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Medinazole Plus Cream
2. Bagaimana Medinazole Plus Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Medinazole Plus Cream
4. Cara menggunakan Medinazole Plus Cream
5. Semasa menggunakan Medinazole Plus Cream
6. Kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan Medinazole Plus Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Medinazole Plus Cream

Medinazole Plus Cream digunakan untuk rawatan jangkitan kulat pada kulit (masalah kegatalan dan kerengsaan).

Bagaimana Medinazole Plus Cream berfungsi

Medinazole Plus Cream ialah produk gabungan yang mengandungi econazole nitrate (menyekat pembiakan kulat) dan triamcinolone acetonide (sejenis kortikosteroid yang berkesan bagi menangani simptom keradangan).

Sebelum mengguna Medinazole Plus Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Medinazole Plus Cream:

- jika anda alah (hipersensitif) kepada econazole nitrate, triamcinolone acetonide atau kepada mana-mana bahan lain dalam Medinazole Plus Cream.
- jika anda mengalami rosacea (kulit bengkak dan merah pada hidung atau bahagian lain) atau keradangan kulit di sekitar mulut (dermatitis perioral).
- jika anda menghidap jenis penyakit kulit tertentu yang lain seperti tuberkulosis, varicella atau herpes simpleks atau jangkitan virus lain pada kulit.
- pada bahagian kulit yang baru disuntik dengan vaksin.

- Sebelum mula menggunakan

- Untuk kegunaan luar sahaja. Elakkan Medinazole Plus Cream daripada terkena mata atau mulut.
- Hentikan rawatan jika anda mengalami tindak balas yang menandakan hipersensitiviti atau tindak balas kimia.
- Anda hendaklah menghindari daripada menyapu krim ini pada bahagian kulit yang luas atau kulit yang tercedera, menggunakan pembalut yang ketat dan menutupi kulit sepenuhnya serta rawatan yang berpanjangan kerana ini boleh meningkatkan risiko kejadian buruk.
- Rawatan berulang dan/atau berpanjangan dengan kortikosteroid (cth. triamcinolone acetonide) di sekitar mata boleh menyebabkan katarak (penglihatan kabur), peningkatan tekanan di dalam mata atau peningkatan risiko glaukoma (dengan simptom seperti sakit kepala, loya, gangguan visual dan penglihatan pelangi).
- Rawatan luaran yang berpanjangan dengan kortikosteroid (cth. triamcinolone acetonide) juga dikaitkan dengan penipisan kulit dan kulit yang mudah luka, kesan jalur pada kulit (striae), kulit kemerahan dan dipenuhi darah pada hidung atau bahagian lain, keradangan di sekitar mulut, akne, saluran darah halus yang tampak ketara, luka halus pada kulit dan membran mukosa, penambahan bulu badan pada wanita, penyembuhan luka yang lambat dan peningkatan risiko jangkitan kulit.
- Tidak boleh digunakan pada kanak-kanak tanpa preskripsi doktor.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil sebarang ubat.

Mengandung

Terdapat risiko kemudaratan terhadap bayi dalam kandungan. Sentiasa dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakan Medinazole Plus Cream semasa hamil.

Menyusukan anak

Tidak diketahui sama ada Medinazole Plus Cream boleh memudaratkan kanak-kanak. Oleh yang demikian, anda hendaklah mendapatkan nasihat doktor sebelum menggunakan Medinazole Plus Cream semasa menyusui bayi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang menggunakan atau baru-baru ini telah menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi. Adalah amat penting untuk anda memberitahu doktor anda jika anda sedang menggunakan ubat pencair darah (seperti warfarin dan acenocoumarol) pada masa yang sama.

Cara menggunakan Medinazole Plus Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa gunakan Medinazole Plus Cream mengikut arahan doktor anda. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Dos biasa untuk dewasa: sapu satu lapisan nipis dengan berhati-hati pada bahagian kulit yang dijangkiti dengan menggunakan jari anda, pagi dan malam, sehingga kegatalan dan kerengsaan diletakkan.

- Bila perlu digunakan

Medinazole Plus Cream hendaklah digunakan di kawasan yang terjejas tidak lebih daripada dua kali sehari, lebih baik sekali pada waktu pagi dan sekali pada waktu petang.

- Berapa lama perlu digunakan

Tempoh rawatan sepatutnya sehingga kegatalan atau kerengsaan telah berkurang tetapi tidak lebih dari dua minggu.

Selepas dua minggu rawatan dengan Medinazole Plus Cream, teruskan rawatan seperti yang diperlukan dengan produk antikulat sahaja sehingga jangkitan sembuh sepenuhnya.

- Jika terlupa menggunakan

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda mengenai apa yang perlu anda lakukan sekiranya anda terlupa untuk menggunakannya.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda telah menggunakan terlalu banyak ubat, atau jika anak anda telah menggunakan ubat dengan tidak sengaja, hubungi doktor anda atau hospital bagi menjalani penilaian risiko dan mendapatkan nasihat.

MEDINAZOLE PLUS CREAM

Econazole Nitrate / Triamcinolone Acetonide (1%w/w / 0.1%w/w)

Semasa menggunakan Medinazole Plus Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda dengan teliti mengikut arahan doktor anda. Beritahu semua doktor, pakar pergigian dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Medinazole Plus Cream.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan hentikan penggunaan ubat melainkan diarahkan oleh doktor anda.

Jangan ambil sebarang ubat baharu tanpa mendapatkan nasihat daripada doktor anda terlebih dahulu.

Jangan beri Medinazole Plus Cream kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera
Medinazole Plus Cream tidak mempunyai kesan yang diketahui terhadap keupayaan memandu atau melakukan kerja-kerja yang memerlukan kejutuan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Medinazole Plus Cream boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Biasa (berlaku pada lebih 1 dalam 100 pengguna): Rasa kulit terbakar, kerengsaan kulit, kemerahan.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda menyedari sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my (Consumer → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Medinazole Plus Cream

Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Tutupkan penutup dengan ketat.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Medinazole Plus Cream adalah krim putih yang licin dengan bau samar-samar dalam tiub aluminium 15g.

- Bahan-bahan

- Bahan-bahan aktif
Econazole Nitrate 1%w/w
Triamcinolone Acetonide 0.1%w/w

- Bahan-bahan tidak aktif
White Soft Paraffin, Liquid Paraffin, Sodium Acid Phosphate, Disodium Phosphate Anhydrous, Purified Water, Chlorocresol, Cetomacrogol Emulsifying Wax, Hydrogenated Polyisobutene, N-Methyl-2-Pyrrolidone, Isopropyl Myristate, Tuberose Fragrance.

- MAL Number:

MAL00000000AZC

Pengilang

WINWA MEDICAL SDN. BHD.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

WORLD MEDICARE SUPPLIES
SDN BHD
PT 5740(1st Floor), Jalan TS 2/1E,
Taman Semarak 2, 71800 Nilai,
Negeri Sembilan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

21/11/2022

Nombor siri:
NPRA(R2)22/156