MEDICARE ACETYCYSTEINE 600 GRANULES

Acetylcysteine (600 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan MEDICARE ACETYLCYSTEINE
2. Bagaimana MEDICARE ACETYLCYSTEINE berfungsi
3. Sebelum menggunakan MEDICARE ACETYLCYSTEINE
4. Cara menggunakan MEDICARE ACETYLCYSTEINE
5. Semasa menggunakan MEDICARE ACETYLCYSTEINE
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan MEDICARE ACETYLCYSTEINE
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan MEDICARE ACETYLCYSTEINE

MEDICARE ACETYLCYSTEINE digunakan untuk merawat kesukaran bernafas yang disebabkan oleh lender yang berlebihan di paru-paru dan saluran pernafasan atau kahak melekit yang sukar dikeluarkan melalui batuk.

Bagaimana MEDICARE ACETYLCYSTEINE berfungsi

MEDICARE ACETYLCYSTEINE mengandungi bahan aktif *acetylcysteine*. *Acetylcysteine* tergolong dalam kumpulan ubat *mucolytics* yang berfungsi dengan mencairkan lendir (kahak) dan memudahkan kahak keluar semasa batuk.

Sebelum menggunakan MEDICARE ACETYLCYSTEINE

- <u>*Bila tidak boleh menggunakan*</u>
  - Jika anda hipersensitif terhadap *acetylcysteine* atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam MEDICARE ACETYLCYSTEINE.
  - Jika anda menghidapi ulser perut/ usus yang aktif.
  - Jika anda menghidapi *phenylketonuria* (keadaan genetik di mana tubuh anda tidak dapat mengurai bahan *phenylalanine*)
  - Jika anda tidak toleransi terhadap gula fruktosa (disebabkan kandungan pemanis sorbitol)
  - Jika anda tidak toleransi terhadap galaktosa (disebabkan kandungan glukosa dan laktosa)
  - Jangan gunakan ubat ini pada kanak-kanak yang berumur bawah 2 tahun.
  - Jangan gunakan ubat ini pada kanak-kanak yang berumur bawah 12 tahun (dalam kes fibrosis sista: kanak-kanak di bawah 6 tahun)

- <u>*Sebelum mula menggunakan*</u>

  Tanya doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil produk ini sekiranya anda
  - menghidapi asma, kerana anda mungkin perlu dipantau dengan rapi
  - mempunyai sejarah ulser perut/ usus kerana pengambilan *acetylcysteine* secara oral boleh menyebabkan muntah.
  - tidak toleransi terhadap histamin.

  Jika anda sedang menyusukan anak, mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau disyaki mengandung, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat. MEDICARE ACETYLCYSTEINE tidak boleh digunakan semasa menyusu, kecuali betul-betul diperlukan.

- <u>*Jika mengambil ubat-ubat lain*</u>

  Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang menggunakan ubat berikut:
  - antibiotik. Anda harus mengambil MEDICARE ACETYLCYSTEINE sama ada dua jam sebelum atau dua jam selepas mengambil antibiotik anda.
  - *glyceryl trinitrate*, ubat untuk merawat serangan angina (sakit dada)
  - *carbamazepine*, kerana *acetylcysteine* boleh mengurangkan kesannya
  - ubat untuk merawat batuk
  - arang aktif, digunakan untuk merawat keracunan.

Cara menggunakan MEDICARE ACETYLCYSTEINE

- <u>*Berapa banyak harus digunakan*</u>
  - Larutkan kandungan satu uncang ke dalam segelas air sejuk atau suam.
  - Dewasa & remaja berusia lebih 12 tahun: 1 paket 600 mg sehari
  - Rawatan jangka panjang: 400–600mg sehari, dibahagikan kepada satu atau beberapa kali sehari
  - *Mucoviscidosis* (gangguan genetik): Dos yang sama seperti di atas. Namun untuk kanak-kanak berusia 6 tahun ke atas, 200 mg 3 kali sehari atau 600 mg sekali sehari.

- <u>*Bila perlu digunakan*</u>

  Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- <u>*Berapa lama perlu digunakan*</u>

  Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

  Tempoh rawatan jangka panjang maksimum adalah 3 – 6 bulan.

MEDICARE ACETYCYSTEINE 600 GRANULES

Acetylcysteine (600 mg)

- *Jika terlupa menggunakan*
  Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

  Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos tertinggal dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya mengikut jadual.
  Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.
- *Jika menggunakan secara berlebihan (terlebih dos)*
  Terlebih dos boleh mengakibatkan simptom gastrousus seperti loya, muntah dan cirit-birit.
  Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan MEDICARE ACETYLCYSTEINE

- *Perkara yang perlu dilakukan*
  Ambil ubat ini mengikut preskripsi doktor atau nasihat ahli farmasi anda.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*
  Jangan mengambil MEDICARE ACETYLCYSTEINE dengan ubat lain.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*
- Penggunaan acetylcysteine boleh mencairkan lendir dan mendorong pengeluaran lendir, terutamanya pada permulaan rawatan. Jika andamengalami kesukaran mengeluarkan lendir melalui batuk, terapi yang sesuai harus diambil oleh doktor.
  - Penggunaan ubat yang merawat batuk boleh menyebabkan penyumbatan lendir dan mengakibatkan risiko kesukaran bernafas dan jangkitan saluran pernafasan.

Kesan-kesan sampingan

Kesan-kesan sampingan berikut telah dilaporkan:
Sakit kepala;
- Bunyi atau deringan di telinga;
- Kadar denyutan jantung yang pantas;
- Pendarahan;
- Muntah, cirit-birit, keradangan dimulut dan bibir anda, sakit perut,loya, senak;
- Tekanan darah rendah

MEDICARE ACETYLCYSTEINE mungkin akan menyebabkan alahan dan reaksi kulit yang teruk.
Hentikan penggunaan MEDICARE ACETYLCYSTEINE dan dapatkan rawatanperubatan dengan segera jika anda mengalami mana-mana gejala sepertiberikut:

- Alahan teruk: kesukaran bernafas, pening kepala, kulit bengkak atau ruam.
- Reaksi kulit yang teruk: kemerahan kulit, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my *[Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].*

Cara penyimpanan dan pelupusan MEDICARE ACETYLCYSTEINE Granules

- *Penyimpanan*
  Simpan di pek bungkusan di bawah suhu 30°C, dan lindungi dari kelembapan.
  Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.
- *Pelupusan*
  Ubat-ubatan tidak seharusnya dilupuskan melalui sisa air atau sisa isi rumah. Tanya doktor atau ahli farmasi anda cara-cara pelupusan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- *Rupa dan warna produk*

Granul putih dengan rasa manis dan masin dan sedikit bau sulfur

- *Bahan-bahan kandungan*
  Bahan aktif: *Acetylcysteine.*

  Bahan-bahan tidak aktif: *Sorbitol, Aspartame, Orange flavor, Purified Water*

- *Nombor MAL*

Pengilang
Yuan Chou Chemical and Pharmaceutical Co. Ltd.
No. 272, Nangang 3rd Rd, Nantou City, Nantou County 54067, Taiwan.

Pemegang Pendaftaran Produk
World Medicare Supplies Sdn Bhd
PT 5740 (1st Floor) , Jalan TS 2/1E
Taman Semarak 2,71800 Nilai
Negeri Sembilan,Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP
Jun 2026

Nombor Siri
NPRA (R2) 26/111