

PREFER 60mg

Pyridostigmine Bromide Tablet 60mg

Apakah yang terkandung dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan PREFER
2. Bagaimana PREFER berfungsi
3. Sebelum anda menggunakan PREFER
4. Cara menggunakan PREFER
5. Semasa anda menggunakan PREFER
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan PREFER
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor sisi

Apakah kegunaan PREFER

PREFER digunakan untuk merawat *myasthenia gravis*. Ini adalah keadaan apabila anda mengalami kelemahan dan keletihan otot terutamanya apabila digunakan berulang kali.

Bagaimana PREFER berfungsi

PREFER tergolong dalam kumpulan ubat dipanggil cholinergic antimuscarinics. Ia berfungsi oleh mencegah pecahan kimia yang dipanggil acetylcholine. Ini adalah bahan kimia yang diperlukan untuk merangsang pergerakan otot.

Sebelum menggunakan PREFER

- Bila tidak boleh digunakan

Jangan mengambil PREFER jika:

- alergi (hipersensitif) kepada piridostigmina, bromida atau apa-apa ramuan lain PREFER.
- mengalami obstruksi mekanikal (penyumbatan) saluran usus atau kencing.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mula mengambil ubat ini, tanya doktor anda.

- Sebelum menggunakan PREFER

Beritahu doktor anda jika anda mengalami tindak balas luar biasa atau alergi terhadap agen anti-kolinesterase atau bahan lain seperti makanan, pengawet atau pewarna. Gejala bagi tindak balas alergi termasuk sesak nafas, nafas berdehit atau kesukaran bernafas, bengkak pada muka, bibir, lidah atau bahagian tubuh yang lain, ruam rasa gatal atau gelegata pada kulit.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil apa-apa ubat lain, termasuk ubat yang diperoleh tanpa preskripsi.

Sesetengah ubat dan PREFER boleh mengganggu satu sama lain. Ini termasuk:

- *muscle relaxants* (ubat yang mempengaruhi fungsi otot rangka)
- atropin yang terkandung dalam ubat-ubatan untuk perjalanan sakit dan kekejangan perut, atau penggunaan dalam pembedahan (suntikan) atau digunakan sebagai penawar kepada keracunan racun serangga (tablet).

Doktor atau ahli farmasi anda mungkin mempunyai lebih banyak maklumat mengenai ubat untuk berhati-hati atau untuk mengelakkan semasa pengambilan ubat ini.

- Kehamilan dan Penyusuan

Keselamatan PREFER untuk kegunaan semasa hamil belum ditentukan. Oleh itu, ia mesti diambil dengan tepat seperti mengikut yang diarahkan oleh doktor anda. Oleh sebab tidak diketahui sama ada ramuan aktif dalam PREFER memasuki susu ibu, ibu yang menyusukan bayi dinasihatkan supaya menghentikan penyusuan semasa rawatan. Doktor boleh menasihatkan anda tentang risiko dan manfaat mengambil PREFER semasa hamil atau menyusukan bayi. Tanya doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil apa-apa ubat.

Cara menggunakan PREFER

- Berapa banyak harus digunakan

Semasa mengambil PREFER, perlu diingatkan bahawa kesan penuh akan muncul secara perlahan-lahan, biasanya dalam tempoh 15-30 minit. Anda perlu cuba mengambil ubat ini supaya ia boleh berfungsi pada waktu penggunaan otot paling diperlukan, sebagai contoh, selepas bangun tidur atau pada waktu makan.

Telan tablet penuh dengan air. Jika anda mengalami kesukaran menelan, pecahkan tablet kepada beberapa bahagian.

Bilangan tablet yang perlu diambil bergantung pada penyakit dan umur anda. Bagi setiap dos yang diambil sehari, sela masa antara dos hendaklah sekurang-kurangnya 6 jam.

Dewasa: Dos biasa bagi dewasa ialah 1 hingga 3 tablet, 2 hingga 4 kali sehari atau dos yang lebih tinggi jika diperlukan.

Kanak-kanak: Bagi kanak-kanak di bawah 6 tahun, dos biasa ialah setengah tablet (30mg). Bagi kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun, dos awal yang biasa ialah 1 tablet (60mg). Doktor akan menambah dos secara perlahan-lahan sehingga perkembangan maksimum diperhatikan. Bagi kanak-kanak, jumlah dos sehari biasanya 30 hingga 360mg.

- Bila perlu digunakan

PREFER hendaklah diambil kira-kira 30 hingga 60 minit sebelum makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Anda perlu meneruskan pengambilan tablet ini sehingga doktor meminta anda menghentikannya.

PREFER 60mg

Pyridostigmine Bromide Tablet 60mg

- Jika terlupa menggunakan

Jika ada terlupa satu dos, ambil sebaik sahaja anda teringat. Jangan ambil dua dos untuk menggantikan dos yang terlupa diambil. Teruskan seperti sebelumnya.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil terlalu banyak tablet atau orang lain tidak sengaja mengambil ubat anda, hubungi doctor, ahli farmasi atau hospital terdekat dengan segera.

Mengambil terlalu banyak tablet boleh menyebabkan kelemahan otot yang ketara atau kelemahan otot yang lebih teruk, bradikardia (kadar jantung perlahan), takikardia (kadar jantung cepat)

Semasa menggunakan PREFER

- Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda ingin memulakan pengambilan apa-apa ubat baharu, beritahu doktor dan ahli farmasi yang anda sedang mengambil PREFER.

Beritahu mana-mana doktor, doktor gigi dan ahli farmasi lain yang merawat anda yang anda sedang mengambil ubat ini.

Jika anda akan menjalani pembedahan, beritahu pakar bedah atau pakar bius yang anda sedang mengambil ubat ini. Ia boleh menjejaskan ubat lain yang digunakan semasa pembedahan.

Jika anda hamil semasa mengambil ubat ini, beritahu doktor anda dengan segera. Jika anda akan menjalani apa-apa ujian darah, beritahu doktor yang anda sedang mengambil ubat ini. Ia boleh mengganggu keputusan sesetengah ujian.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil PREFER untuk merawat apa-apa penyakit lain kecuali doktor membenarkannya.

Jangan beri ubat anda kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang serupa dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan ambil ubat ini jika pembungkus menunjukkan ia telah diusik atau jika ubat menunjukkan apa-apa tanda kerosakan.

Anda tidak boleh mengambil ubat ini selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan pada pembungkus.

- Memandu dan menggunakan mesin

Kesan PREFER ke atas kemampuan memandu dan mengendalikan mesin belum ditentukan.

PREFER mengandungi laktosa. Oleh itu, jika anda diberitahu oleh doktor yang anda tidak tolerans terhadap sesetengah gula, hubungi doktor anda sebelum mengambil produk ubat ini.

Kesan sampingan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin jika anda rasa tidak sihat semasa mengambil PREFER. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan jika anda mengalami beberapa kesan sampingan..

Jangan bimbang dengan senarai kesan sampingan yang berikut. Anda mungkin tidak akan mengalami mana-mana satu kesan sampingan itu.

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mendapati mana-mana keadaan berikut dan ia merisaukan anda:

- loya dan muntah
- cirit-birit
- kejang atau sakit perut
- air liur yang bertambah
- ruam kulit

Senarai di atas termasuk kesan sampingan yang serius yang memerlukan perhatian perubatan segera. Maklumkan doktor atau ahli farmasi anda jika anda perasan apa-apa lagi yang membuatkan anda merasa

tidak sihat. Kesan sampingan yang lain tidak yang disenaraikan di atas juga boleh berlaku dalam sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my (Consumer → Reporting → Reporting Side Effects to Medicine (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan Pelupusan PREFER

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Simpan dalam bungkusan asal untuk melindungi daripada cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Anda tidak boleh mengambil ubat selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan pada pembungkus. Jika anda memiliki ubat yang belum digunakan, kembalikannya kepada ahli farmasi anda dan dia akan melupuskan ubat itu dengan selamat..

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Putih hingga putih pudar, bulat, tablet muka rata timbul dengan "C60" satu sisi dan quadrisect menjaringkan pada satu bahagian dan kosong di sebelah yang lain.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

- Pyridostigmine Bromide

Bahan tak aktif:

Anhydrous Lactose, Colloidal Silicon Dioxide, Stearic Acid

MAL number:

MALxxxxxxxAZ

PREFER 60mg

Pyridostigmine Bromide Tablet 60mg)

Pengilang

Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
Plot No.4, Hinjewadi Phase II,
International Biotech Park, Pune,
Maharashtra, IN-411057 India

Pemegang Pendaftaran Produk:

Mansa Healthcare Sdn Bhd
B-05-3A, 3 Two Square, No 2, Jalan
19/1, 46300 Petaling Jaya, Selangor,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

1-Mar-2025

Nombor Siri

NPRA (R2) 24/105