

Bifonazole Anti-Fungal Cream 1% w/w

Bifonazole 1%

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream
2. Bagaimana Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream
3. Sebelum mengambil Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream
4. Cara menggunakan Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream
5. Semasa menggunakan Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream

Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream digunakan untuk merawat kaki makan air (kutu air), jangkitan kulat pada tangan, kurap, jangkitan kulat pada lipatan paha, panau, erythrasma (kemerahan kulit) & jangkitan kulat pada kulit.

Bagaimana Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream berfungsi

Bahan aktif dalam Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream ialah *bifonazole*. *Bifonazole* tergolong dalam kumpulan ubat yang dinamakan *imidazole*. Mekanisma tindakan utama *bifonazole* ialah terhadap pembahagian dan pertumbuhan kulat pada dua peringkat berbeza, lantas membezakan *bifonazole* daripada derivatif *azole* lain dan juga daripada ubat antikulat yang bertindak hanya pada satu peringkat. *Bifonazole* mengubah ketelapan dinding sel kulat dan mengekang aktiviti enzim di dalam sel. Secara khususnya, ia mengekang pembentukan *ergosterol* yang diperlukan untuk penghasilan sel membran.

Sebelum mengambil Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream

Bila tidak boleh mengambil

Jika anda alah (*hypersensitive*) kepada *bifonazole* atau sebarang bahan lain. Jika anda pernah mengalami tindak balas alah kepada sebarang produk antikulat. Pesakit dengan terapi warfarin perlu dipantau apabila *bifonazole* digunakan secara serentak. Sesetengah eksipien mungkin mengurangkan keberkesanan produk lateks seperti kondom dan diafragma apabila disapu pada kawasan kemaluan. Kesannya adalah sementara dan hanya berlaku semasa rawatan. *Mengandung dan menyusukan anak* Jangan guna Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream jika anda hamil atau menyusukan anak, melainkan atas nasihat doktor anda. *Sebelum mula mengambil* Jika anda tidak pasti sama ada anda mengalami masalah kaki akan air (kutu air), jangkitan kulat pada tangan, kurap, jangkitan kulat pada lipatan paha, panau & *erythrasma* (kemerahan kulit), dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Jika *bifonazole* digunakan pada pesakit dalam terapi warfarin, mereka harus dipantau dengan sewajarnya.

Cara untuk menggunakan Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream

Berapa banyak harus digunakan

Krim hendaklah disapukan dengan nipis, rata dan digosok perlahan-lahan pada bahagian yang dijangkiti. Jumlah krim yang sedikit lazimnya mencukupi untuk merawat kawasan sebesar tapak tangan.

Bila perlu digunakan

Sekali sehari, sebaik-baiknya pada waktu malam sebelum tidur.

Berapa lama perlu digunakan

Terus menggunakan Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream selagi disyorkan oleh doktor anda.

Indikasi	Tempoh rawatan
Kaki makan air (kutu air)	3 minggu
Kurap, jangkitan kulat pada tangan, jangkitan kulat	2-3 minggu

pada lipatan paha	
Panau	2 minggu
Erythrasma (kemerahan kulit)	2 minggu
Jangkitan kulat pada kulit	2-4 minggu

Jika terlupak menggunakan

Sapu krim secepat mungkin dan kemudian teruskan rawatan seperti biasa.

Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Tiada risiko keracunan akut dilihat kerana ia tidak mungkin dialami selepas penggunaan sekali ke atas kulit dalam dos berlebihan (penggunaan pada permukaan yang luas dalam keadaan yang sesuai untuk penyerapan) atau pengambilan menerusi mulut secara tidak sengaja.

Semasa menggunakan produk

Perkara yang perlu dilakukan

Anda boleh membantu memastikan rawatan berkesan jika anda mengikut petua penjagaan sendiri sebagaimana berikut:

- Jaga kebersihan kulit yang dijangkiti.
- Pastikan kulit sentiasa kering, tetapi elakkan mengesat kulit secara keterlaluan
- Sentiasa basuh tangan anda selepas merawat jangkitan untuk mencegah jangkitan kepada orang lain.
- Basuh stoking dan sarung kaki anda dengan bersih dalam air panas untuk menghilangkan sebarang kulit mati atau spora kulat.
- Tukar kasut anda setiap hari jika boleh.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Untuk neonatus (0 hingga 27 hari), bayi dan kanak-kanak kecil (28 hari hingga 23 bulan), produk ubat hanya boleh digunakan dengan pengawasan perubatan. Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream adalah untuk kegunaan luar sahaja. Jangan masukkan krim ke dalam mulut atau menelannya. Sungguhpun bahagian yang dijangkiti akan terasa gatal, cuba jangan menggaru. Menggaru akan merosakkan permukaan kulit dan menyebabkan jangkitan merebak dengan lebih teruk. Jangan berkongsi tuala, alas kaki, dan sebagainya dengan orang lain kerana

anda boleh menyebarkan jangkitan kepada mereka.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Produk ini mengandungi *cetostearyl alcohol* yang boleh menyebabkan kerengsaan kulit setempat (seperti ruam, kegatalan atau kemerahan).

Kesan-kesan sampingan

- Gangguan secara am dan pada bahagian pentadbiran
- Sakit di bahagian pentadbiran, edema periferik (di bahagian pentadbiran)
- Gangguan kulit dan tisu subkutaneus

Kontak dermatitis, dermatitis alahan, eritema, pruritus, ruam, urtikaria, lepuh, pengelupasan kulit, ekzema, kulit kering, kerengsaan kulit, kulit maserasi, sensasi panas/terbakar bahagian kulit

Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream dan beritahu doktor anda dengan serta-merta atau hubungi Jabatan Kemalangan dan Kecemasan hospital terdekat anda. Tanda tindak balas alahan mungkin termasuk:

- Ruam.
- Masalah untuk menelan atau bernafas.
- Bengkak bibir, muka, tekak atau lidah.
- Rasa lemah, pening atau pitam.
- Loya.

Selepas anda menyapu krim, anda mungkin mengalami gejala berikut:

- Sedikit kerengsaan atau kepedihan.
- Kemerahan kulit.
- Pengelupasan.

Jika anda tidak tahan dengan kesan tersebut, hentikan rawatan dan jumpa doktor secepat mungkin.

Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream juga boleh menyebabkan kerengsaan kulit setempat yang mungkin hampir serupa jangkitan. Jika mana-mana gejala bertambah teruk hentikan rawatan dan jumpa doktor secepat mungkin.

Gejala ini mungkin termasuk:

- Pedih, kesakitan atau kegatalan.
- Ruam, kemerahan, kekeringan.
- Kulit kelihatan lembut atau basah.
- Bengkak, gatal-gatal, lepuh.

Jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan di atas atau memberi tindak balas yang buruk kepada krim dalam sebarang cara lain yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, segera beritahu doktor anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream

Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

Pelupusan

Ubat tidak sepatutnya dilupuskan menerusi air buangan atau sampah sarap rumah. Tanya ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Canespro Once Daily Bifonazole Anti-fungal Cream boleh didapati dalam tiub mengandungi 15g krim putih.

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif : bifonazole 1%.
- Bahan-bahan tidak aktif : sorbitan stearate, polysorbate 60, cetyl palmitate, cetostearyl alcohol, 2-octyldodecanol, benzyl alcohol and purified water

Nombor MAL

MAL18121002AZ

Pengilang

GP Grenzach Produktions GmbH Emil-Barell -Strasse 7
79639 Grenzach-Wyhlen

Pemegang Pendaftaran Produk

Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd.
25-03 & 25-04, Level 25, IMAZIUM, No. 8, Jalan SS21/37, Damansara Uptown,
47400 Petaling Jaya, Selangor

Tarikh kemaskini RiMUP

05/31/2022

No Siri:

NPRA(R2/1)200212/355