

TIGER BALM LOTION

Methyl Salicylate ,Camphor, Menthol (20% w/w , 10% w/w 5% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan *Tiger Balm Lotion*?
2. Bagaimana *Tiger Balm Lotion* berfungsi?
3. Sebelum menggunakan *Tiger Balm Lotion*.
4. Cara menggunakan *Tiger Balm Lotion*.
5. Semasa menggunakan *Tiger Balm Lotion*.
6. Kesan- kesan sampingan.
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan *Tiger Balm Lotion*.
8. Maklumat Lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP.

Apakah kegunaan *Tiger Balm Lotion*?

Melegakan ketegangan leher dan bahu, sakit belakang, lebam, sakit otot dan sendi, terseliuh.

Bagaimana *Tiger Balm Lotion* berfungsi?

Tiger Balm Lotion adalah losyen kuat dan bau yang menyenangkan untuk melegakan kesakitan.

Sebelum menggunakan *Tiger Balm Lotion*:

- Bila tidak boleh menggunakannya?

Pesakit yang diketahui atau disyaki tidak toleransi terhadap mana-mana bahan ubat itu.

- Sebelum mula menggunakannya?

Sebelum menggunakannya, cuba pada permukaan kulit yang lebih kecil terlebih dahulu.

- Jika mengambil ubat-ubat lain?

Produk ini mengandungi methyl salicylate dan apabila disapu pada kulit, akan diserap ke dalam saluran darah. Bagi pesakit yang menggunakan warfarin, penyapuan produk secara berlebihan pada sendi dan otot akan meningkatkan risiko pendarahan.

Cara menggunakan *Tiger Balm Lotion*?

-Berapa banyak harus digunakan?

Gunakan hanya secukupnya dan sapu pada bahagian yang terjejas. Ulangi 2 hingga 3 kali sehari.

-Berapa lama perlu digunakan?

Disyorkan 7 hari mengikut keperluan.

-Jika terlupa menggunakan?

Anda akan terus mengalami simptom kesakitan kesan daripada sakit otot.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)?

Boleh menyebabkan reaksi alergi pada sesetengah individu yang berkulit sensitif. Dapatkan nasihat doktor dengan segera.

Semasa menggunakan *Tiger Balm Lotion*:

-Perkara yang perlu dilakukan:

Sapukan pada bahagian yang sakit perlahan-lahan sehingga diserap sepenuhnya.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan:

Jangan sapukan *Tiger Balm Lotion* pada luka terbuka, kulit yang gatal, berdekatan dengan mata atau membran mukus.

-Perkara yang perlu diberi perhatian:

- Jangan gunakan pada bayi di bawah umur 2 tahun.
- Langkah berhati-hati - hati perlu diambil semasa kanak-kanak, wanita hamil, wanita menyusui, atau pesakit yang alah pada asid salisilik yang sedang dirawat.
- Ia adalah berbahaya kepada kanak-kanak jika ubat mengandungi camphor disapukan ke dalam bahagian hidung. Kandungan yang sedikit boleh menyebabkan pitam.
- Elakkan sentuhan secara langsung dengan mata, membran mucus, kulit yang gatal dan rosak.

Kesan- kesan sampingan:

Boleh menyebabkan tindak balas alergi bagi sesetengah individu yang mempunyai kulit sensitif.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui atau laman web npra.gov.my [Public → Reporting Side Effects to Medicine (ConSERF) or Vaccine (AEFI)]

Cara Penyimpanan dan Pelupusan *Tiger Balm Lotion*:

Penyimpanan:

Disyorkan memperketatkan penutup botol *Tiger Balm Lotion* dan menyimpannya di suhu bilik (bawah 30°C). Jauhi dari sinaran cahaya matahari.

Pelupusan:

Ubat losyen tidak boleh dilupuskan ke saluran air. Sila dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan jika tidak menggunakannya

TIGER BALM LOTION

Methyl Salicylate ,Camphor, Menthol (20% w/w , 10% w/w 5% w/w)

Maklumat Lanjut:

- Rupa dan warna produk?

Cecair jernih yang berciri bau untuk sapuan kulit.

-Bahan-bahan kandungan:

- Bahan aktif
 - Methyl Salicylate
 - Camphor
 - Menthol
- Bahan tidak aktif:
 - Propylene Glycol
 - Fragrance
 - Nonivamide
 - Denatured Ethanol

- Nombor MAL:

MAL17107047X

Pengilang dan Pemegang

Pendaftaran Produk:

Tiger Balm (M) Sdn.Bhd,
No. 53, Jalan I-Park SAC 7,
Taman Perindustrian I-Park,
81400 Senai, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP:

14/03/2025

Nombor Siri

NPRA(R2/1)250312/1432