

RUVENTIN film coated Tablet (Diosmin & Hesperidin)

Diosmin 450mg and Hesperidin 50mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *RUVENTIN*
2. Bagaimana *RUVENTIN* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *RUVENTIN*
4. Cara menggunakan *RUVENTIN*
5. Semasa menggunakan *RUVENTIN*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *RUVENTIN*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan *RUVENTIN*

RUVENTIN digunakan untuk rawatan simptom yang berkaitan dengan kekurangan venalimfatik (kaki berat, sakit, sindrom kaki resah).

RUVENTIN juga digunakan untuk rawatan simptom yang berkaitan dengan serangan buasir akut.

Bagaimana *RUVENTIN* berfungsi

Diosmin dan hesperidin adalah unsur-unsur bioflavonoid yang terdapat pada buah-buahan sitrus. Bioflavonoid menguatkan saluran darah, lalu mengurangkan kelemahannya. Ia juga mengurangkan inflamasi saluran darah dan mengekalkan aliran dalam saluran darah yang kecil.

Sebelum menggunakan *RUVENTIN*

-Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alah kepada diosmin, hesperidin atau bahan-bahan lain dari produk ini.
- Jika anda sedang menyusukan bayi.

-Sebelum menggunakan *RUVENTIN*

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil apa-apa ubat. Sila pastikan anda memahami penjelasan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini. Bercakap kepada doktor / ahli farmasi anda jika anda mempunyai masalah berkaitan

kesihatan yang lain.

Kehamilan dan Laktasi

Kehamilan: Tiada kesan teratogenik telah ditunjukkan dalam beberapa kajian dan tiada kesan buruk telah dilaporkan dalam manusia.

Laktasi: Rawatan harus dielakkan semasa menyusukan bayi.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan *RUVENTIN*

-Berapa banyak harus digunakan

Dos biasa adalah 2 tablet setiap hari dalam dua dos dibahagikan, tengah hari dan petang pada waktu makan. Dos yang disyorkan untuk serangan hemorrhoidal akut ialah 6 tablet sehari untuk 4 hari pertama, kemudian 4 tablet sehari selama 3 hari.

-Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan *RUVENTIN* untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat.

Semasa menggunakan *RUVENTIN*

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor. Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda

sedang menggunakan *RUVENTIN*.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan menyusukan bayi apabila mengambil *RUVENTIN*.

Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan memberi *RUVENTIN* kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Tiada kajian mengenai kesan pecahan flavonoid keupayaan memandu dan menggunakan mesin telah dilakukan. Walau bagaimanapun, berdasarkan profil keselamatan keseluruhan pecahan flavonoid, tablet *Ruventin* tidak mempunyai atau pengaruh yang boleh diabaikan untuk keupayaan memandu & menggunakan mesin

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, *RUVENTIN* boleh memberi kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Kesan sampingan berikut boleh berlaku dengan ubat ini:

- cirit-birit
- dispepsia
- loya
- muntah
- pening
- sakit kepala
- rasa tidak enak badan/lesu
- kolitis
- pruritus
- ruam
- urtikaria

Kesan sampingan yang tidak disenaraikan mungkin berlaku. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami apa-apa kesan sampingan.

RUVENTIN film coated Tablet (Diosmin & Hesperidin)

Diosmin 450mg and Hesperidin 50mg

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (*Consumer -> Reporting -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan RUVENTIN

-Penyimpanan

Simpan pada suhu tidak melebihi 30°C.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet bersalut filem kosong pada kedua-dua sisi yang berwarna coklat, berbentuk bujur dan dwicembung.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Diosmin
Hesperidin
- Bahan tidak aktif
Microcrystalline Cellulose
Povidone (PVPK-30)
Sodium starch glycolate (Type A)
Croscarmellose sodium (Vivasol)
Sodium Lauryl Sulphate
Magnesium Stearate
Hypromellose
PEG 6000 (Macrogol 6000)
Titanium Dioxide
Purified Talc
Colour Iron Oxide Red
Colour Iron Oxide Yellow

-MAL number:

Pengilang

XL Laboratories Pvt. Ltd.
E-1223, Phase-I Extn., (Ghatal)
RIICO Indl. Area, Bhiwadi-301019,
Rajasthan, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

NVS REGULATORY SERVICES SDN BHD,
19G, 7TH FLOOR, BLOCK 2,
WORLDWIDE BUSINESS CENTRE,
JALAN TINJU 13/50
40675 SHAH ALAM
MALAYSIA

Tarikh kemaskini

-30/06/2021

Nombor siri

NPRA (R2) 21/072